

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Accurate	WW,SW,G,T,H	07 09	NT103	F	20 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29 in Sommer- und Wintergetreide gegen Unkräuter.
		WW,WG,WT,WH		NW 5(*/*/*)m NT103	F	30 g	Im Frühjahr von BBCH 30-32 in Wintergetreide gegen Unkräuter.
	Activus SC	WW,WG,WR,WT	09	NW -(-/-/10)m NW705 NT145-1,146,170	F	4,0 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 11-13 gegen Unkräuter außer Kamille-Arten. Tankmischpartner zur Ungrasbekämpfung. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Alliance, Acupro	WW,SW,G,WR,W T	07 09	NW -(15/5/5)m NW701, NT101	F	100 g	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter und Windhalm. Gegen Windhalm sehr früher Einsatz möglichst mit Ergänzungspartner notwendig.
		WW,WG,WR,WT				65 g	Im Herbst im Nachauflauf von BBCH 10-29 gegen Unkräuter. Als Ergänzungspartner zu gräserwirksamen Präparaten geeignet.
	Alliance suPrim = Alliance + Saracen	WW,SW,G,WR, WT	07 09	NW -(15/5/5)m NW701, NT109	F	75 g + 75 ml	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schadereger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Ariane C	WW,SW,G,WR,WT,DI,SH	07 08 09	NT103	F	1,5 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13 bis 30 in Sommergetreide und bis 39 in Wintergetreide gegen Unkräuter und Acker-Kratzdistel.
	Artus	WW,SW,G,WR,T,H	07 09	NW 5(*/*/*)m NT102	F	50 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29, in Hafer nur bis BBCH 25, in WW bis BBCH 32 gegen Unkräuter.
	Aurora	WW,SW,G,WR,WT,SH	09	NT103	F	40 - 50 g	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32, bzw. in WW und WG von BBCH 13-32 gegen Ehrenpreis, Taubnessel und Klettenlabkraut. Geeignet als Ergänzungspartner z.B. mit 25-30 g/ha zu Pointer Plus.
	Biathlon 4D + Dash EC	WW,SW,G,H,R,T,DU,DI	05 07 08 09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	70 g + 1,0 l	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Acker-Winde, Acker-Kratzdistel und Unkräuter. Als Tankmischpartner mit z.B. Atlantis Flex, Axial 50 oder Traxos geeignet.
	Boudha	WW,SW,G,WR,WT,SH	09	NW 5(5/*/*)m NT103	F	20 g	Im Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis-Arten.
	Cleanshot	WW,WG,WR,WT	07 09	NT101	F	95 g	Im Herbst im Nachauflauf von BBCH 10-13 gegen Unkräuter und Ausfallraps, einschließlich Clearfield-Ausfallraps. Als Mischpartner für gräserwirksame Bodenherbizide im frühen Einsatz.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Concert SX	SW,SG,H	09	NW 5(5/*/*)m NW701, NW800, NT108	F	100 g	Im Nachauflauf von BBCH 13-29 gegen Unkräuter außer Ehrenpreis und Klettenlabkraut. Nebenwirkung gegen Distel, Ziest, Minze und Ampfer.
	Connex	WW	09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT102, NW800	F	70 g	Im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Unkräuter, ausgenommen Ehrenpreis und Klettenlabkraut. In Sommergetreide max. 60 g/ha. Kombination mit Ergänzungspartner sinnvoll.
		SW,SG	09	NW 15(10/5/*)m NW706, NT101	F	60 g	
	Croupier OD	WW,SW,G,WR, WT	09	NW 10(5/5/*)m NT109, NW800	F	0,5 - 0,67 l	Im Frühjahr von BBCH 20-39 gegen Unkräuter. In Tankmischung mit gräserwirksamen ALS-Partner 0,5 l/ha ausreichend.
	Diflanil 500 SC	WW, WG	09	NW -(-/20/10)m NW706, NW800, NT108	F	0,25-0,375 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 10-29 gegen Unkräuter. Optimale Wirkung im frühen Nachauflauf bei ausreichender Bodenfeuchte. Geeignet v.a. als Ergänzungspartner mit 0,25 l/ha gegen Stiefmütterchen, Ehrenpreis und Taubnessel. Kein Nachbau von dikotylen Zwischenfrüchten und Winterraps.
	Dirigent SX	WW,SW,G,WR, WT,SH	09	NW 5(*/*/*)m NW701, NT103	F	35 g	Im Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis-Arten.
	Duplosan DP	WW,SW,G,WR,H	05 07	NW 5(*/*/*)m NW701, NT103	F	1,3 l	Im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Duplosan Super	WW,SW,G,R,T,H,DU,DI	05 07 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NG403, NT109	F	2,0 - 2,5 l	Im Frühjahr von BBCH 11-30 gegen Unkräuter. Im Sommergetreide 2,0 l/ha ausreichend.
	Finish SX	WW,SW,G,WH	07 09	NW 5(5/*/*)m NT103	F	75 g	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter. Ergänzung mit Klettenlabkrautpartner sinnvoll. Kombination mit Gräserherbiziden möglich.
	Finyl, ...u.a.	WW,WG,WT,WH	09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	30 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29 in Sommer- bzw. bis BBCH 32 in Wintergetreide gegen Unkräuter. Nebenwirkung gegen Disteln, Ziest, Minze.
		SW,SG,ST,SH				25 g	
	Flame	WW,DU,WG,EM,EK,SG,SR,SW,ST	07 09	NW 5(5/*/*)m NT109, NW706	F	30 g	Im Frühjahr von BBCH 13-49 gegen Vogelmiere, Kornblume, Acker-Senf, Vergissmeinnicht und weitere Unkräuter. Auch in Khorasan-Weizen zugelassen.
Fluroxane, ...u.a.	WW,WG,WR,WT SW,SG,SH	07 08 09	NT103	F	1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 13-29 in Winter- und Sommergetreide gegen Unkräuter sowie Spätbehandlung von BBCH 30-39 in Wintergetreide gegen Klettenlabkraut. Bei günstigen Anwendungsbedingungen Reduzierung auf bis zu 0,6 l/ha möglich.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
Breitblättrige Unkräuter	Fox	WW,WG,WR,WT	09	NW 5(5/*/*)m NW701, NT101	F	1,5 l	Im Frühjahr von BBCH 21-29 gegen Unkräuter. Speziell gegen Stiefmütterchen. Auch bei Grasuntersaaten ab BBCH 13 einsetzbar.	
	Gentis	WW,SW,SH,G,R,T	07 08	NW 5(5/*/*)m NW706, NT102-1	F	1,25 l	Im Frühjahr von BBCH 13-31 gegen Unkräuter.	
	Kinvara	WW,SW,G,H,R,T	07 09	NW 10(5/5/*)m NT108	F	3,0 l	Im Frühjahr von BBCH 24-39 gegen Unkräuter. Zur Spätbehandlung geeignet.	
	Omnera LQM	WW,SW,G,WR,WT	07 09	NW 15(10/5/5)m NW701, NW800, NT109	F	1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 21-39 in Wintergetreide und BBCH 12-39 in Sommergetreide gegen Unkräuter. In Sommergetreide 0,75 l/ha ausreichend.	
	Pixie Pack = Saracen Delta + Duplosan Super	WW,WG	SG	05 07 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NG403, NT109	F	100 ml + 1,0 l	Im Frühjahr im Wintergetreide von BBCH 13-30 und in der Sommergerste von BBCH 21-30 gegen Unkräuter.
		NW 5(5/5/*)m NW705, NG403, NT109						
	Pointer SX	WW,WG,WR,T	SW,SG,H WW,WG,WR,T	07 09	NT103	F	60 g (Frühjahr)	Im Nachauflauf im Herbst und Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Unkräuter außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis. In Wintergetreide zur Spätbehandlung gegen Acker-Kratzdistel zugelassen.
		NT102			45 g			
30 g (Herbst)								
Pointer Plus	WW,SW,G,WR,WT,SH		07 09	NW 5(5/*/*)m NT108	F	50 g	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Unkräuter und Acker-Kratzdistel.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schadereger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Pixxaro EC	WW,SW,G,R,WT,DI,DU	07 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103	F	0,5 l	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-45 gegen Unkräuter.
	Primus Perfect	WW,SW,G,WR,WT,DI, SH,SDU	09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	0,2 l	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-30 in Sommergetreide, bzw. 13-32 in Wintergetreide gegen Unkräuter. In Tankmischungen Reduzierung sinnvoll. Früher Einsatz unter kühlen Bedingungen möglich.
	Saracen	WW,SW,G,WR,WT,SH	09	NT109	F	75 ml (Herbst) 100 ml (Frühjahr)	Im Herbst und Frühjahr im Nachauflauf von BBCH 13-29 gegen Unkräuter. In Tankmischung Reduzierung auf 50-75 ml/ha möglich.
	Saracen Delta	WW,G	09	NW 5(5/5/*)m NW705(Herbst), NW706(Frühjahr), NT108	F	75 - 100 ml	Im Nachauflauf von BBCH 13-32 in Wintergetreide und von BBCH 21-32 in Sommergetreide gegen Unkräuter. In Sommergetreide 75 ml/ha ausreichend. Unterschiedliche Hangaufgabe je nach Anwendungstermin beachten.
	Saracen Max	WW,G,WR,WT,H		NW 5(5/*/*)m NT109	F	20 - 25 g	Im Frühjahr von BBCH 12-39 in Wintergetreide und BBCH 12-32 gegen Unkräuter. In Sommergetreide 20 g/ha ausreichend.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Sempra	WW,WG,WR	09	NW -(-/20/10)m NW706, NW800, NT108	F	0,25 - 0,375 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 10-29 gegen Unkräuter. Optimale Wirkung im frühen Nachauflauf bei ausreichender Bodenfeuchte. Geeignet v.a. als Ergänzungspartner mit 0,25 l/ha gegen Stiefmütterchen, Ehrenpreis und Taubnessel. Kein Nachbau von dikotylen Zwischenfrüchten und Winterraps.
	Starane XL, ...u.a.	WW,SW,G,WR, WT,SH,SD	07 09	NT102	F	1,5 - 1,8 l	Im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter und Kletten-Labkraut. Bei günstigen Anwendungsbedingungen Reduzierung bis auf 0,75 l/hga möglich. In Wintergetreide Spätbehandlung gegen Klettenlabkraut zugelassen.
	Stomp Aqua	WW,WG,WR,WT, DI	07 09	NW -(-/-/5)m NT112, NW705, NT145,146,170	F	2,5 - 3,0 l	Im Nachauflauf-Herbst gegen Unkräuter. Tankmischpartner zur Gräserbekämpfung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schadereger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Tomigan 200, ...u.a.	WW,SW,G,WR, WT,SH,DI	05 07 08 09	NT101 NT108	F	0,5 - 0,9 l	Gegen Unkräuter im Frühjahr in Wintergetreide von BBCH 13-32, in Dinkel von BBCH 21-32, in Sommergetreide von BBCH 13-39. In BBCH 21-32 gilt für alle Getreidearten NT101, davor und danach NT108.
	Tomigan XL, ...u.a.	WW,SW,G,WR, WT,SH	07 09	NW 5(5/*/*)m NT108	F	0,75 - 1,5 l	Im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter und Kletten-Labkraut. In Wintergetreide Spätbehandlung gegen Kletten-Labkraut bis BBCH 39 möglich.
	Tribun	WW,G,WR,WT, SW,SH	09	NW 5(*/*/*)m NW701/705, NT101	F	20 - 40 g 30 g	Gegen Unkräuter, ausgenommen Ehrenpreis und Klettenlabkraut, nach dem Auflaufen von BBCH 13-29/30 im Herbst mit 20 g, im Frühjahr mit 40 g in Wintergetreide oder mit 30 g/ha in Sommergetreide. Unterschiedliche Hangaufgabe in Winter- bzw. Sommergetreide beachten. Spätbehandlung gegen Acker-Kratzdistel in Wintergetreide zugelassen.
	Trimmer WG	WW,WG,WR,WT SW,SG WW,WG,WR,T	07 09	NW 5(*/*/*)m NT108, NW800 NT103	F	60 g (Frühjahr) 30 g 30 g (Herbst)	Im Nachauflauf im Herbst oder Frühjahr von BBCH 13-29 in Wintergetreide und von BBCH 12-39 in Sommergetreide gegen Unkräuter. In Tankmischung Aufwandmengenreduzierung möglich.



**Infos zum Getreide**
***Unkräuter und Ungräser***

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	U 46 M-Fluid, ...u.a.	WW,G,R,WT,Di, DU,SW, SH	05 07 09	NT108	F	1,4 l	Im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Unkräuter. Nebenwirkung gegen Acker-Kratzdistel, Winden und Schachtelhalm. Auch bei Grasuntersaaten ab BBCH 13 einsetzbar. In Rotklee-Untersaaten möglich.
	Zypar	WW,SW,G,R,WT, DU,DI	07 09	NW 10(5/5/*)m NW 5(5/5/*)m NW706, NT102	F	1,0 l (Frühjahr) 0,75 l (Herbst)	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-45 mit 1,0 l/ha und im Herbst von BBCH 11-29 mit 0,75 l/ha gegen Unkräuter. Unterschiedliche Aufwandmenge und Auflagen im Herbst und Frühjahr beachten.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Agolin Forte Pack = Agolin + Cadou SC	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW706, NW800 NT145,146,170	F	1,5 + 0,24 l	Im frühen Nachauflauf Herbst von BBCH 11-13 gegen Windhalm, Jährige Rispel und Unkräuter. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter) vermeiden.
	Attribut	WW,WR,WT	09	NW 5(5/*/*)m NT102 NW701, NW800	F	60 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Windhalm. Früher Einsatz und Ergänzung gegen Unkräuter notwendig.
	Avoxa	WW,WR,WT	07 08 09	NW 5(5/5/*)m NT109	F	1,35 l	Im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Windhalm, Weidelgras und Unkräuter. Gegen breite dikotyle Verunkrautung Mischpartner notwendig. Aufgrund der Kombination der beiden Wirkmechanismen ACCase-Hemmer und ALS-Hemmer wird der Einsatz als kritisch hinsichtlich des Resistenzmanagements gesehen.
	Axial Komplett	WW,SW,G,WR,WT,SDU	07 09	NT102	F	1,0 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr in BBCH 13-29 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter. Auch Herbsteinsatz ab BBCH 13 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Unkräuter möglich.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Battle Delta	WW,WG,WR,WT	08 09	NW -(-/-/10)m NW706, NT101	F	0,425 l	Im Herbst vom Voraufbau bis BBCH 24 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Früher Einsatz bis BBCH 13 sinnvoll.
	BeFlex	WW,WG,WR,WT	09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	0,5 l	Im Herbst ab dem Auflaufen von BBCH 09-25. Optimal im sehr frühen Einsatz. Tankmischung mit z.B. 2,5 l/ha Boxer empfehlenswert.
	Boxer, ... u.a.	WW,WG,WR,DI	07 08 09	NT145,146,170	F	3,0 - 5,0 l	Im Herbst vom Voraufbau bis BBCH 12 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Als Tankmischkomponente zur Gräserbekämpfung geeignet. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Broadcast	WW,WG,WR,WT, DI	07 09	NW -(-/-/15)m NW706 NT103	F	0,6 l	Im Herbst im Nachaufbau von BBCH 10-13 gegen Windhalm, Jährige Rispe, Klettenlabkraut, Vogelmiere und Kamille. Ackerfuchsschwanz wird mit erfasst. Gegen Windhalm im frühen Nachaufbau 0,4 l/ha ausreichend.
WW,WG,WR,WT				NW -(-/15/5)m NW706,800 NT102		0,3 l	Im Herbst im Voraufbau mit 0,3 l/ha gegen Windhalm und Unkräuter.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Broadcast Duo Pack = Broadcast + Trimmer WG	WW,WG,WR,WT	07 09	NW -(-/-/15)m NW706 NT103	F	0,4 l + 20 g	Im Herbst im Nachauflauf im BBCH 13 gegen Windhalm und Unkräuter.
	Broadway	WW,WR,WT, DU,DI,EM	07 09	NT101	F	130 g + 0,6 l FHS	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 12-32 gegen Windhalm und Unkräuter.
	Broadway Plus	WW,WR,WT, WDU,DI	07 09	NW -(15/10/5)m NW706 NT108	F	62,5 g + 1,0 l Netzmittel	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Windhalm und Unkräuter. In der Regel 50 g/ha + 0,8 l/ha Netzmittel ausreichend.
	Carmina 640	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NG404,405,414, NG337, NT103	F	2,5 l	Im Herbst von BBCH 10-29 gegen Windhalm und Unkräuter. Früher Einsatz bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit notwendig. Sortenverträglichkeit bei Weizen beachten! Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Carmina Complett = Carmina 640 + Alliance	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW 20(10/5/5)m NW701, NG404,405,414, NG337,NT103	F	1,5 l + 65 g	Im Herbst von BBCH 10-29 gegen Windhalm und Unkräuter. Früher Einsatz sinnvoll. Sortenverträglichkeit bei Weizen i.d.R. unproblematisch. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schadereger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Carpatus SC	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(-/15/5)m NW706,NW800 NT102	F	0,3 l	Im Herbst vor dem Auflaufen gegen Windhalm und Unkräuter.	
		WW,WG,WR,WT, DI		NW -(-/15)m NW706,NT103		0,6 l	Im Herbst von BBCH 11-13 auf mittleren bis schweren Böden gegen Windhalm, Jährige Rispe, Klettenlabkraut, Vogelmiere und Kamille.	
	Concert SX	WW,WR,T	09	NW 5(5/5/*)m NW706,NW800 NT108	F	150 g	Im Nachauflauf von BBCH 13-29 gegen Windhalm und Unkräuter, außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis. Nebenwirkung gegen Distel, Ziest, Minze und Ampfer.	
	Chrome	WW,WG,WR,WT	08 09	NW 15(10/5/5)m NW706,NT101, NG405	F	1,2 l	Im Herbst vom Vorauf bis BBCH 29 gegen Windhalm und Unkräuter.	
	Husar Plus + Mero	SW,SG,SDU	WW,WR,WT,DI	05 09	NW 5(*/*/*)m NT103, NW800	F	0,2 + 1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Windhalm, Jährige Rispe, Weidelgras-Arten, und Unkräuter.
					NW 5(5/*/*)m NT108		0,15 + 0,75 l	Nach dem Auflaufen von BBCH 13-30 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Jura	WW,WG,WR,WT	05 07 08 09	NW -(-/-/5)m NT145,146,170 NW706, NW800	F	3,5 - 4,0 l	Im Herbst von Voraufbau bis BBCH 13 gegen Windhalm, Rispe und Unkräuter. Unter normalen Bedingungen 3,5 l/ha ausreichend. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Lentipur 700, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	08 09	NW 10(5/5/*)m NG404, NG405, NG414, NG337, NT103	F	3,0 l	Vor dem Auflaufen in WW,WR und WG; nach dem Auflaufen im Herbst in WW,WG und WT (BBCH 11-29) gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter; im Frühjahr in WW und WG bis BBCH 29. Bevorzugt als Herbstbehandlung. Die Ungräser sollten nicht mehr als 2 Blätter haben. Sortenverträglichkeit bei Weizen beachten! Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Mateno Forte Set = Mateno Duo + Cadou SC	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(20/10/5)m NW701, NT109	F	0,35 + 0,25 l	Im Herbst von Voraufbau bis frühen Nachaufbau BBCH 13 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Bei Reduzierung von Cadou SC auf 0,24 l/ha entfällt die NW701.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Niantic	WW	05 07 09	NT103	F	0,15 kg + 0,3 l FHS	Im Herbst ab BBCH 11 und im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Windhalm. Ergänzung gegen dikotyle Unkräuter notwendig.
	Pontos	WW,WG,WR,WT, EM,EK	07 08 09	NW -(10/5/5)m NT102, nur im VA: NW705	F	0,5 l	Im Herbst von Voraufbau bis BBCH 29 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Einsatz im frühen Nachaufbau bis BBCH 12/13 empfehlenswert.
	Saracen Delta Pack = Franzi + Saracen Delta	WW,WG	07 08 09	NW 5(5/5/*)m NW705, NT108	F	0,25 l + 75 ml	Im Herbst im frühen Nachaufbau von BBCH 12-22 gegen Windhalm und Unkräuter.
	Sumimax	WW	08	NW 10(5/5/*)m	F	60 g	Im Herbst im Voraufbau bis frühen Nachaufbau von BBCH 09-14 gegen Windhalm und Unkräuter. Sehr früher Einsatz wird empfohlen.
	Trinity	WW,WG,WR,WT, WDU	08 09	NW -(-/-/5)m NT145,146,170 NW706,800, NG337	F	2,0 l	Im Herbst im frühen Nachaufbau von BBCH 10-13 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Viper Compact	WW,WG,WR,WT, WDU, EM, EK	09	NW -(-/15/10)m NW706,800, NT103	F	1,0 l	Im Herbst im frühen Nachauflauf von BBCH 10-23 gegen Windhalm und Unkräuter. Aufgrund hohen ALS-Resistenzrisikos bei Windhalm Anwendungshäufigkeit minimieren und Anwendung in Mischung mit Flufenacet- oder CTU-haltigen Präparaten bevorzugen, sowie keine Nachbehandlung mit Sulfonylharnstoff-Präparaten im Frühjahr gegen Windhalm vornehmen!
	Viper Compact Sunfire Pack	WW,WG,WR,WT, WDU	07 08 09	NW -(-/15/10)m NW706,800, NT103	F	0,25 + 0,75 l	Im Herbst von BBCH 10-23 gegen Windhalm, Jährige Risse und Unkräuter.



**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Atlantis Flex	WW,WT,WR, WDU,DI	07 09	NW 5(*/*/*)m NW800, NT102	F	0,2 kg + 0,6 l Biopower	Im Nachauflauf im Frühjahr bis BBCH 32 gegen Acker-Fuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter.
		WW,WT,WDU		NW 5(5/*/*)m NW701,800, NT103		0,33 kg + 1,0 l Biopower	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Acker-Fuchsschwanz, Flughafer, Trespens, Weidelgras und Unkräuter.
	Atlantis Komplett = Atlantis OD + Husar OD	WW,T	07 09	NW 5(*/*/*)m NT103 NW800	F	1,0 l + 80 ml	Im Frühjahr bis BBCH 32 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Weidelgras, Rispen, Ackerkratzdistel und Unkräuter.
	Attribut	WW	09	NW 5(5/5/*)m NT103 NW706, NW800	F	100 g	Im Nachauflauf Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Ackerfuchsschwanz auf mittleren bis schweren Böden. Kein Nachbau von dikotylen Zwischenfrüchten und Winterraps möglich!
	Avoxa	WW,WR,WT	07 08 09	NW 5(5/5/*)m NT109	F	1,8 l	Im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Ackerfuchsschwanz, Trespens und Unkräuter. Gegen breite dikotyle Verunkrautung Mischpartner notwendig. Aufgrund der Kombination der beiden Wirkmechanismen ACCase-Hemmer und ALS-Hemmer wird der Einsatz als kritisch hinsichtlich des Resistenzmanagements gesehen.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Axial Komplett	WW,WG,WR,WT	07 09	NT102	F	1,0 - 1,3 l	Nach dem Auflaufen in BBCH 13-29 im Herbst mit 1,0 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Unkräuter, im Frühjahr mit 1,3 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Weidelgras und Unkräuter.
	Boxer Cadou SC Pack = Boxer + Cadou SC	WW,WG,WR	07 08 09	NW701, NT101,145,146, NT170	F	2,0 - 2,5 l + 0,4 - 0,5 l	Im Herbst von Voraufbau bis BBCH 12 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Gegen Windhalm und Jährige Rispe 0,25 l/ha Cadou SC ausreichend. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Broadcast	WW,WG,WR,WT	07 09	NW -(-/-/15)m NW706,800 NT103	F	0,6 l	Im Herbst im Voraufbau gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Unkräuter.
	Broadway	WW,WR,WT, DU,DI,EM	07 09	NT102	F	220 - 275 g + 1,0-1,25 l FHS	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 12-30 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe, Weidelgräser und Unkräuter. Gute Nebenwirkung gegen Trespen.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Cadou Pro Pack = Cadou SC + Agolin	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW706, NW800 NT145,146,170	F	0,5 + 1,5 l	Im frühen Nachauflauf Herbst von BBCH 11-13 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter) vermeiden.
	Carpatus SC	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(-/-/15)m NW706,NW800, NT103	F	0,6 l	Im Herbst vor dem Auflaufen gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Unkräuter.
	Fence, ...u.a.	WW, WG	07 08 09		F	0,5 l	Im Herbst vom Voraufbau bis BBCH 23 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Jährige Rispe. Früher Einsatz bis BBCH 10 empfehlenswert. Gegen dikotyle Unkräuter Ergänzung notwendig. Gegen Windhalm und Jährige Rispe 0,25 l/ha ausreichend.
	Herold SC	WW,WG,WR,T,DI	07 08 09	NW -(15/10/5)m NW706 NT102	F	0,4 - 0,6 l	Im Herbst vom Voraufbau bis BBCH 13 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. In Triticale nur im NA mit 0,5 l/ha. Früher Einsatz bis BBCH 11 empfehlenswert. Leichte Böden max. 0,5 l/ha. Gegen Windhalm und Jährige Rispe 0,4 l/ha ausreichend.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Incelo Komplett = Incelo + Biopower + Husar OD	WW, WDU, T	07 09	NW 5(5//5/*)m NW706, NW800 NT101	F	0,3 kg + 1,0 l + 0,1 l	Im Frühjahr ab BBCH 20 bis BBCH 32 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe, Weidelgras- und Trespen Arten, Flughafer und Unkräuter.
	Malibu	WW, WG, WR, WDU, T, EK, EM	07 08 09	NW -( -/ -/5)m NW701 NT112, 145, 146, NT170	F	3,0 - 4,0 l	Im Herbst im frühen Nachauflauf gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter, optimal von BBCH 11-12. Gegen Windhalm und Jährige Rispe 3,0 l/ha ausreichend. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Mateno Forte Set = Mateno Duo + Cadou SC	WW, WT	07 08 09	NW -( -/20/10)m NW706, NT109	F	0,7 + 0,5 l	Im Herbst von Voraufbau gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter.
		WW, WG, WR, WT					NW -(20/10/5)m NW701, NT109
	Mertil	WW, WG, WR, WT	07 08 09	NW -(15/10/5)m NW706 NT102	F	0,6 l	Im Herbst von BBCH 11-13 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Gegen Windhalm und Jährige Rispe 0,4 l/ha ausreichend.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Niantic	WW	05	NT108	F	0,3 kg	Im Herbst ab BCHH 11 mit 0,3 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz und Rispen Arten sowie mit 0,4 kg/ha gegen starken Ackerfuchsschwanz-Besatz und Taube Trespe.
			07	NW800		+ 0,6 l FHS	
			09	NT109		0,4 kg	Im Frühjahr von BBCH 13-32 mit 0,3 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Rispen, Kamille und Vogelmiere; von BBCH 13-30 mit 0,4 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Weidelgras, Flughafer und Unkräuter, mit 0,5 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz und Taube Trespe. Tankmischung mit Biathlon 4D oder AHL zur Wirkungsunterstützung empfehlenswert.
				NW800		+ 0,8 l FHS	
				NT109		0,5 kg	
				NW701,800		+ 1,0 l FHS	
	Quirinus Forte Set = Quirinus + Pontos	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(10/5/5)m NT102, nur im VA: NW705	F	0,5 + 0,5	Von Voraufbau bis BBCH 29 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Weidelgras-Arten, Jährige Risppe und Unkräuter. Einsatz im Voraufbau bis sehr frühen Nachaufbau BBCH 10/11 empfehlenswert.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz und weitere Ungräser	Altivate 6 WG	WW,WR,WT	07 09	NW 5(*/*/*)m NW 701	F	0,15 kg + 0,6 l FHS  0,25 kg + 1,0 l FHS	Nach dem Auflaufen im Frühjahr in BBCH 20-32 mit 0,15 kg/ha gegen Windhalm und jährige Rispe. Mit 0,25 kg/ha nur in Winterweizen gegen Ackerfuchsschwanz, Flughafer und Weidelgras. Dikotyle Ergänzung erforderlich.
	Axial 50	WW,SW,G,WR, WT,DI,DU	07 09	NT101	F	0,9 l  1,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst in BBCH 13-29 mit 0,9 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Weidelgräser. Im Frühjahr in BBCH 13-39 mit 0,9 l/ha gegen Windhalm und Flughafer oder mit 1,2 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz und Weidelgräser. Kulturspezifische Indikationen beachten.
	Sword 240 EC	WW,WR,WT, WDU	07 08 09		F	0,25 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 11-29 oder im Frühjahr von BBCH 21-31(39) gegen Ackerfuchsschwanz, Flughafer und Weidelgras in BBCH 13-15. Ergänzung mit geeigneten Zusatzstoff, wie z.B. Hasten oder Kantor, empfehlenswert. Alternativer Wirkmechanismus zu Sulfonylharnstoff-präparaten im Resistenzmanagement.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz und weitere Ungräser	Traxos	WW,WR,WT	07 09		F	1,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst und Frühjahr von BBCH 13-31 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Weidelgras-Arten. Alternativer Wirkmechanismus zu Sulfonylharnstoffpräparaten im Resistenzmanagement.
Flughafer	Axial Komplett	SW,SG,SDU	07 09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	1,0 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter.
	Husar Plus + Mero	SW,SG,SDU	05 09	NW 5(5/*/*)m NT108	F	0,15 l + 0,75 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter.
	Broadway Plus	SW,SDU	07 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT103	F	40 g + 0,6 l Netzmittel	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Flughafer, Stiefmütterchen, Winden- und Vogel-Knöterich.
	Buguis	WW, WDU	07 08 09		F	0,6 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr bis BBCH 39 gegen Flughafer. Alternativer Wirkmechanismus zu Sulfonylharnstoff-Präparaten.
Taube Trespe, Gemeine Quecke	Attribut	WR,WT,DI	09	NW 5(5/*/*)m NT102 NW701, NW800	F	60 g	Im Nachauflauf Frühjahr von BBCH 13-29 zur Niederhaltung von Quecke und Tauber Trespe. Zusatz von Mero verbessert die Wirkung.
		WW		NW 5(5/*/*)m NT103 NW701, NW800		100 g	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Trespe-Arten, Weidelgras-Arten und Flug-Hafer	Atlantis Flex	WW,WT,WDU	07 09	NW 5(5/*/*)m NW701,800, NT103	F	0,33 kg + 1,0 l FHS	Im Frühjahr nach dem Auflaufen von BBCH 21-32. Möglichst frühzeitige Anwendung gegen Trespens und Weidelgräser. Bei Flughafer kompletten Auflauf abwarten.
Taubes Trespe, Flughafer und Weidelgras-Arten	Niantic	WW	05 07 09	NT109 NW800	F	0,4 kg + 0,8 l FHS	Im Herbst ab BBCH 11 mit 0,4 kg/ha gegen Taube Trespe. Im Frühjahr von BBCH 13-30 mit 0,4 kg/ha gegen Flughafer und Weidelgras-Arten, mit 0,5 kg/ha gegen Taube Trespe. Tankmischung mit Biathlon 4D oder AHL zur Wirkungsunterstützung empfehlenswert.
				NT109 NW701,800		0,5 kg + 1,0 l FHS	



**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<b>Spät- und Stoppelbehandlungen gegen Problemunkräuter</b>							
Acker-Kratzdistel	Ariane C	WW,WG,WR,WT, DI	07 08 09	NT103	F	1,5 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr bis BBCH 39 gegen Acker-Kratzdistel und Samenunkräuter. Breite Wirkung. Nebenwirkung gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.
	Dirigent SX	WW,WG,WR,WT	09	NW 5(*/*/*)m NW701, NT103	F	35 g	Im Frühjahr von BBCH 30-37 gegen Acker-Kratzdistel.
	Pointer Plus	WW,SW,G,WR, WT,SH	07 09	NW 5(5/*/*)m NT108	F	50 g	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Acker-Kratzdistel, Klettenlabkraut und Unkräuter.
	Pointer SX, Trimmer SX	WW,WG,WR,T	07 09	NT102	F	37,5 g	Im Frühjahr in Wintergetreide in der Schossphase von BBCH 30-37 gegen Acker-Kratzdistel. Ampfer wird mit erfasst.
	Tribun	WW,WG,WR,T	09	NT101	F	25 g	
	U 46 M-Fluid	WW,SW,G,R,WT, DI,DU,SH	05 07 09	NT108	F	1,4 l	Im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Acker-Kratzdistel und Unkräuter. Einsatz im Knospenstadium der Distel bei wüchsigem Wetter fördert die Wirkung.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Acker-Kratzdistel, Acker-Winde	Biathlon 4D + Dash EC	WW,SW,G,R,T, DI,DU,H	05 07 08 09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	70 g + 1,0 l	Spätbehandlung bis BBCH 39 gegen Acker-Winde, Acker-Kratzdistel und Unkräuter.
	U 46 M-Fluid	DI,DU	05 07 09	NT108, nur für DI: NG412	F	1,4 l	Nach dem Auflaufen von BBCH 13-39 gegen Acker-Kratzdistel und Acker-Winde. Ausreichende Blattmasse der Unkräuter und wüchsige Witterung beachten.
Klettenlabkraut	Fluroxane, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	05 07 08 09	NT103	F	0,6 - 1,0 l	In der Schossphase bis BBCH 39 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung auch gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.
	Lodin, ...u.a.	WW,WG,WR,WT, WH	07 08 09	NW 20(10/5/5)m NT103	F	1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Klettenlabkraut und Vogelmiere.
		SW,SG,SH		NW 15(10/5)m NT102		0,75 l	
	Starane XL, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	07 09	NT102	F	1,0 - 1,5 l	Im Schossen bis kurz vor dem Ährenschieben BBCH 30-45 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung auch gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.
Tomigan 200, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	05 07 08 09	NT108	F	0,5 - 0,9 l	In der Schossphase bis BBCH 45 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung auch gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Klettenlabkraut	Tomigan XL, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	07 09	NW 20(10/5/5)m NT108	F	1,0 - 1,5 l	Im Schossen bis Ligula-Stadium BBCH 30-39 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung auch gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.
Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Flughafer	Axial 50	WW,SW,G,WR, WT,DI,DU	07 09	> 0,9 l/ha: NT101	F	0,9 - 1,2 l	Spätbehandlung bis BBCH 39, gegen Windhalm und Flughafer 0,9 l/ha, gegen Ackerfuchsschwanz 1,2 l/ha. Weidelgräser werden mit erfasst.
Flughafer	Buguis	WW, WDU	07 08 09		F	0,6 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr bis BBCH 39 gegen Flughafer. Wirkt auch gegen Ackerfuchsschwanz. Alternativer Wirkmechanismus zu Sulfonylharnstoffpräparaten.
Zaunwinde	Starane XL, ...u.a.	Getreidestoppel	07 09	NT102	F	1,8 l	Stoppelbehandlung nach der Ernte gegen Zaunwinde. Winden müssen ausreichende neue Blattmasse (20-30 cm Trieb länge) gebildet haben. Wirkungszeit von 4-6 Wochen einhalten.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ausfallgetreide und Gemeine Quecke	Taifun forte, ...u.a. #)	Getreidestoppel		NG352, NT102	F	3,0 - 5,0 l	Nach der Ernte gegen Ausfallgetreide und Quecke. Queckenaustrieb abwarten, min. 3 neue Blätter bzw. 15-25 cm Bestandeshöhe. Wirkungsperiode (1 - 10 Tage) vor Beginn der Bodenbearbeitung bzw. Saatbettbereitung ist vom jeweils eingesetzten Glyphosat-Präparat abhängig. Spritzbrühekonzentration von min. 1-1,5 % einhalten. Zusatz von Netzmittel oder SSA kann die Wirkung unterstützen. Tankmischung mit Starane XL zur Windenbekämpfung möglich. Einsatz auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen! Abdrift zuverlässig vermeiden.
	Kyleo #)	Getreidestoppel	07 09	NW 5(5/*/*) m NW706, NG352-1,405, NT109	F	5,0 l	Nach der Ernte gegen Ungräser und Unkräuter. Aufwandmenge je nach Zielunkraut. Zur Regulierung von Winden und Acker-Schachtelhalm geeignet. Einsatz auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen! Abdrift zuverlässig vermeiden.

\*) Landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!

#) Bei alternativen Glyphosat-Präparaten sind ggf. veränderte Anwendungsbestimmungen zu beachten. Generelle Anwendungsverbote auf Basis von privatrechtlichen Vereinbarungen (Pacht-, Lieferverträge) und besondere Anwendungsbestimmungen nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten.