

Herbizide im Getreide

Behandlungsansprüche im Frühjahr

Präparat	Wirkstoff	Termin: BBCH-Stadium	Wirkung über:		Behandlungsansprüche:						Regen- beständigkeit (h)
			Boden (%)	Blatt (%)	Boden- feuchtig- keit	Wachs- schicht	Unkraut- größe	Tempe- ratur	Strahlung	Luffeuch- tigkeit	
Alliance	Metsulfuron + Diflufenican	13 - 29	60	40	☐	☐	☐	☐	○	☐	1
Altivate	Mesosulfuron	20 - 32	10	90	○	☐	☐	☐	○	●	5
Ariane C	Fluroxypyr + Florasulam + Clopyralid	13 - 29(39)	5	95	○	☐	☐	☐	○	☐	1
Artus	Carfentrazone + Metsulfuron	13 - 29(32)	30	70	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
Atlantis Flex	Mesosulfuron + Propoxycarbazone	21 - 32	30	70	☐	☐	☐	☐	○	●	2
Attribut	Propoxycarbazone	13 - 29	70	30	☐	☐	●	○	○	☐	2
Aurora	Carfentrazone	13 - 32	0	100	○	☐	☐	○	☐	☐	2
Avoxa	Pinoxaden + Pyroxsulam	13 - 32	5	95	○	☐	☐	☐	○	☐	1
Axial 50	Pinoxaden	13 - 39	0	100	○	☐	☐	○	○	☐	1
Axial Komplett	Pinoxaden + Florasulam	13 - 29	5	95	○	☐	☐	☐	○	☐	1
Biathlon 4D	Tritosulfuron + Florasulam	13 - 39	5	95	○	☐	☐	☐	○	☐	2
Broadway	Pyroxsulam + Florasulam	12 - 30(32)	10	90	○	☐	●	☐	○	●	1
Broadway Plus	Pyroxsulam + Florasulam + Halauxifen-methyl	21 - 32	5	95	○	☐	●	☐	○	●	1
Concert SX, Connex	Metsulfuron + Thifensulfuron	13 - 29	40	60	☐	☐	☐	☐	○	☐	1
Croupier OD	Fluroxypyr + Metsulfuron	20 - 39	10	90	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1

Herbizide im Getreide

Behandlungsansprüche im Frühjahr

Präparat	Wirkstoff	Termin: BBCH-Stadium	Wirkung über:		Behandlungsansprüche:						Regen- beständigkeit (h)
			Boden (%)	Blatt (%)	Boden- feuchtig- keit	Wachs- schicht	Unkraut- größe	Tempe- ratur	Strahlung	Luffeuch- tigkeit	
CTU 700, ...u.a.	Chlortoluron	13 - 29	70	30	◐	◐	●	○	○	◐	2
Dirigent SX, ...u.a.	Metsulfuron + Tribenuron	13 - 30	30	70	◐	◐	◐	◐	○	◐	1
Duplosan DP	Dichlorprop-P	21 - 29	5	95	○	◐	◐	●	○	●	4 - 5
Duplosan Super	Dichlorprop-P + MCPA + Mecoprop-P	11 - 30	5	95	○	◐	◐	●	○	●	4 - 5
Finy, ...u.a.	Metsulfuron	13 - 32	50	50	◐	◐	◐	◐	◐	◐	1
Fox	Bifenox	13 - 29	10	90	○	◐	●	◐	◐	◐	2
Gentis	2,4-D + Fluroxypyr	13 - 31	5	95	○	◐	◐	◐	○	●	4 - 5
Husar OD	Iodosulfuron	13-29(32)	10	90	○	◐	◐	◐	○	●	2
Husar Plus	Iodosulfuron + Mesosulfuron	13-30(32)	10	90	○	◐	◐	◐	○	●	2
Incelo	Mesosulfuron + Iodosulfuron + Thien-carbazone	20 - 30(32)	30	70	◐	◐	◐	◐	○	◐	2
Niantic	Mesosulfuron + Iodosulfuron	13-30(32)	10	90	○	◐	◐	◐	○	●	5
Omnera LQM	Fluroxypyr + Thifensulfuron + Metsulfuron	12(21) - 39	30	70	◐	◐	◐	◐	○	◐	0,5
Pixxaro EC	Halauxyfen-methyl + Fluroxypyr	13 - 45	5	95	○	◐	◐	◐	○	◐	1
Pointer SX, ...u.a.	Tribenuron	13 - 30(37)	20	80	◐	◐	◐	◐	○	◐	1
Pointer Plus	Tribenuron + Metsulfuron + Florasulam	12 - 39	30	70	◐	◐	◐	◐	○	◐	1

Herbizide im Getreide

Behandlungsansprüche im Frühjahr

Präparat	Wirkstoff	Termin: BBCH-Stadium	Wirkung über:		Behandlungsansprüche:						Regen- beständigkeit (h)
			Boden (%)	Blatt (%)	Boden- feuchtig- keit	Wachs- schicht	Unkraut- größe	Tempe- ratur	Strahlung	Luftfeuch- tigkeit	
Primus Perfect	Clopyralid + Florasulam	13 - 32	5	95	○	○	◐	◑	○	◑	0,5
Saracen, ...u.a.	Florasulam	13 - 39	5	95	○	○	◐	◑	○	◑	1
Saracen Delta	Florasulam + Diflufenican	13-32 / 21-32	20	80	◐	◑	◐	◑	○	◑	1
Saracen Max	Florasulam + Tribenuron	12-39 / 12-32	10	90	◑	◑	◐	◑	○	◑	1
Sword 240 EC	Clodinafop	13 - 31	0	100	○	◑	◑	◐	◑	◐	2
Tomigan XL, ...u.a.	Fluroxypyr + Florasulam	13 - 29(45)	5	95	○	◑	◑	◑	○	◑	1
Tomigan 200, ...u.a.	Fluroxypyr	13 - 39	5	95	○	◑	◑	◑	○	◑	1
Traxos	Clodinafop + Pinoxaden	13 - 31	0	100	○	◑	◑	○	◑	◐	2
U 46 M-Fluid	MCPA	13 - 29	5	95	○	◐	◑	●	○	●	4 - 5
Zypar	Halauxyfen-methyl + Florasulam	13 - 45	5	95	○	○	◑	◑	○	◑	1

Symbolerklärung: ○ kein bis ● sehr hoher Anspruch