

**Infos zu Kartoffeln**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Centium 36 CS, Clomazone 360 CS	09	NT102,127,149	F	0,25 l	Im Voraufbau bis 5 Tage vor dem Durchstoßen auf abgesetzte Dämme gegen Klettenlabkraut und Vogelmiere. Metribuzinfreie Tankmischung mit Bandur (3,0 l/ha) empfehlenswert. Kein Einsatz in Pflanzkartoffeln möglich.
	Citation	07 09	NW 5(5/5/*)m NW706,NG405, NT108	60	0,5 kg	Im Voraufbau bis kurz vor dem Durchstoßen gegen Unkräuter. Spritzfolge im Voraufbau und sehr frühen Nachaufbau (BBCH 11) gegen Unkräuter. Keine Anwendung auf leichten, durchlässigen oder humusarmen Böden sowie Böden, die zur Staunässe neigen.
			NW 5(5/*/*)m NW706, NG405, NT107		0,33 / 0,2 kg	
	Sinopia	07 09	NW 5(*/*/*)m NW705,800, NT109,127,149	F	3,0 l	Im Voraufbau bis 5 Tage vor dem Durchstoßen auf abgesetzte Dämme gegen Unkräuter und Jährige Rispel. Kein Einsatz in Pflanzkartoffeln.
	Upstage	07 09	NT102,127,149	F	0,25 l	Im Voraufbau bis 7 Tage nach dem Pflanzen gegen Unkräuter. Kein Einsatz in Pflanzkartoffeln.
	Quickdown	05 07 08	NW 5(5/5/*)m NT108	F	0,4 l + 1,0 l Toil	Im Voraufbau bis kurz vor dem Durchstoßen gegen bereits aufgelaufene Unkräuter. Unterstützung von Bodenherbiziden.

**Infos zu Kartoffeln**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Jährige Risppe und Unkräuter	Bandur	08 09	NW -(15/10/5)m NW701,800, NT108	F	3,5 - 4,0 l	Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Risppe und Unkräuter. Im VA auf abgesetzte Dämme. Auf leichten Böden 3,5 l/ha ausreichend. Tankmischung mit Sencor Liquid in reduzierter Aufwandmenge (3,0 l/ha + 0,3-0,5 l/ha) sinnvoll. Keine Anwendung in sehr frühen Sorten.
	Boxer, ...u.a.	07 08 09	NT145,146,170	F	4,5 - 5,0 l	Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Risppe und Unkräuter. Im VA bis kurz vor dem Durchstoßen der Kartoffeln. Gegen Kamillearten, Gänsefuß und Knöterich Tankmischung mit Sencor Liquid 0,3-0,5 l/ha. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Boxer Sencor Liquid Pack	07 08 09	NW 5(5/*/*)m NW706 NT103,145,146,170	42	3,0 - 5,0 l + 0,3 - 0,5 l	Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Risppe und Unkräuter. Als Tankmischung im VA bis kurz vor dem Durchstoßen der Kartoffeln. Anwendung auf leichten Böden mit niedrigerer Aufwandmenge möglich. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

**Infos zu Kartoffeln**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Jährige Rispe und Unkräuter	Sencor Liquid	09	NW 5(5/**)m NW706, NT103	42	0,9 l	Gegen Jährige Rispe und Unkräuter. Nach dem letzten Häufeln, kurz vor dem Durchstoßen.
	Mistral	09	NW 5(5/**)m NW706, NT103	F	0,75 kg	
	Sencor Liquid	09	NW 5(**/**)m NW701, NT102	42	0,4 - 0,6 l	Gegen Unkräuter. Besonders auf humosen Böden im Nachauflauf bei 5 bis max. 10 cm Kartoffelhöhe. Nicht gegen Klettenlabkraut. Sortenempfindlichkeit beachten!
	Mistral	09	NW 5(**/**)m NW701, NT102	F	0,3 - 0,5 kg	
	Novitron DamTec	07 08 09	NW -(20/15/5)m NW701, NT108,127,149	F	2,4 kg	
Hirsens, Jährige Rispe und Unkräuter	Arcade	09	NW -(-/-/5)m NW706, NT112,145,146,170, NG405	F	4,0 - 5,0 l	Im Vorauf bis zum Durchstoßen und im Nachauflauf bis BBCH 15 gegen Unkräuter, Jährige Rispe und Hühnerhirse. ANwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, Rüben, ...) vermeiden.
	Artist	07	NW 5(**/**)m	F	2,0 kg	Im Vorauf bis kurz vor dem Durchstoßen gegen Hirsens, Jährige Rispe und Unkräuter. Auf leichten Böden bis 2,0 kg/ha, auf mittleren bis schweren Böden bis 2,5 kg/ha. Einsatz auf sehr humosen Böden nicht sinnvoll. Sortenverträglichkeit beachten.
		08 09	NW 5(5/**)m NW706, NT103	F	2,5 kg	
	Proman	08 09	NW 5(**/**)m NG404, NT102	F	2,0 - 3,0 l	Im Vorauf bis kurz vor dem Durchstoßen gegen Hühnerhirse, Jährige Rispe und Unkräuter. Bei starkem Unkrautdruck Tankmischung mit 2-2,5 l/ha Proman + z.B. Bandur 2-2,5 l/ha oder Novitron 2,0 kg/ha sinnvoll.

**Infos zu Kartoffeln**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ungräser und Ausfallgetreide, ausgenommen Jährige Rispe	Agil-S	07 08 09		F	0,5 - 1,0 l	Nach dem Auflaufen gegen Ungräser. Im 2-4-Blattstadium gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Hirsen und Ausfallgetreide.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT101	56	1,0 - 1,5 l + 1,0 l	Aufwandmenge kann entsprechend der Ungras-Art angepasst werden.
	Fusilade MAX	07 08 09	NT101	90	1,0 l	Höhere Aufwandmenge gegen bestockte Ungräser, Trespens und Weidelgrasdurchwuchs.
	Targa Super	05 07 08 09	NT101	49	0,75 - 1,25 l	
Ungräser und Ausfallgetreide	Select 240 EC + Radimix	07 08 09	NT108	60	0,75 + 1,0 l	Nach dem Auflaufen ab BBCH 12 bis zum Reihenschluss gegen Ungräser und Ausfallgetreide von BBCH 12 bis 29. Jährige Rispe wird mit erfasst.

**Infos zu Kartoffeln**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Quecke, Ungräser und Unkräuter	Cato, Plaza	05 07 09	NW 5(5/**)m	F	50 g + FHS	Gegen Quecke, Ackerfuchsschwanz, Jährige Rispel, Flughafel, Hirsen und Unkräuter. Spritzfolge bei 5-20 cm Wuchshöhe im Abstand von 8-10 Tagen empfehlenswert. Nicht in Pflanzkartoffeln und sehr frühen oder frühen Sorten.
			NW 5(**/**)m NT103		30 g + 0,2 l 20 g + 0,2 l	
Quecke	Agil-S	07 08 09	NW 5(**/**)m	30	1,5 l, oder 2x 0,75 l	Nach dem Auflaufen gegen Quecken mit 15-20 cm Wuchshöhe. Wüchsiges Wetter begünstigt die Wirkung.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT102	56	2,5 + 1,0 l	Bei Agil-S auch Splitting-Applikation im Abstand von 14-28 Tagen möglich.
	Fusilade MAX	07 08 09	NT103	90	2,0 l	
	Select 240 EC + Radiamix	07 08 09	NT109	60	1,0 + 1,0 l	Select 240 EC erfasst auch Rispen-Arten.
	Targa Super	05 07 08 09	NT102	49	2,0 l	

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!