

Infos zur Grassamenproduktion
**Unkräuter, Ungräser, Krankheiten,
Schädlinge und Wachstumsregler**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Ariane C	07 08 09	NT103	N	1,5 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter und Acker-Kratzdistel.
	Duplosan DP	05 07 09	NW 5(*/*/*)m NW701,NT103	28	1,3 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Unkräuter.
	Fox	09	Herbst: NW 10(5/5/*) NW706 Frühj. NW 5(5/*/*)m NT101,NW701	N	1,0 - 1,5 l	Nach dem Auflaufen im Herbst oder Frühjahr von BBCH 13-29 in Kulturgräsern gegen Taubnessel-Arten und Acker-Stiefmütterchen. Aufwandmenge bis 1,0 l/ha im Herbst und 1,5 l/ha im Frühjahr.
	Oblix	09	NW -(/*/*/*)m NT102 Herbst: NG403,412	N	2,0 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 13-29, oder im Frühjahr von BBCH 12-29 in Kulturgräsern, ausgenommen Poa-Arten, gegen Ungräser und Unkräuter.
	Primus Perfect	09	NW 5(*/*/*)m NT103	N	0,2 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr in BBCH 13-37 gegen Unkräuter außer Ehrenpreis, Stiefmütterchen, Taubnessel, Gänsefuß.
	Saracen	09	NT109	F	0,075 - 0,1 l	Nach dem Auflaufen im Spätsommer bis Herbst mit 0,075 l/ha und im Frühjahr mit 0,1 l/ha in BBCH 13-29 gegen Ausfallraps, Kamille, Klettenlabkraut und Klatsch-Mohn.

Infos zur Grassamenproduktion
**Unkräuter, Ungräser, Krankheiten,
Schädlinge und Wachstumsregler**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Stomp Aqua	07 08 09	NW -(-/-/5)m NT112,145,146,170 VV207	F	2,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 12-21 der Kultur. Kombination mit Ergänzungspräparat empfehlenswert. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	U 46 M-Fluid	05 07 09	NT109	F	1,4 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-49 gegen Distel-Arten, Acker-Winde, Ausfallraps, Gänsefuß-Arten und Kornblume.
				F	0,28 l / 10 l Wasser max. 1,4 l/ha	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-49 gegen Distel-Arten als Horst- und Einzelpflanzenbehandlung zur Ausbringung mit speziellem Streichgerät.
	Zypar	07 09	NW 10(5/5/*)m NW 5(5/5/*)m NW706, NT102	F	1,0 l 0,75 l	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 12-45 mit 1,0 l/ha und im Herbst von BBCH 12-29 mit 0,75 l/ha gegen Unkräuter.
Ampfer-Arten	Ranger, Garlon	07 08 09	NW 5(*/*/*)m NT103	N	2,0 l	Nach dem Auflaufen während der Vegetationsperiode vom Frühjahr bis zum Herbst in BBCH 13-49 der Gräser gegen Ampfer-Arten ab dem 3-Blatt-Stadium. Anwendung als Flächenbehandlung oder zur Horst- und Einzelpflanzenbehandlung mit Einzeldüse oder Streichgerät.

Infos zur Grassamenproduktion
**Unkräuter, Ungräser, Krankheiten,
Schädlinge und Wachstumsregler**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und Unkräuter	Addition	09	NW -(-/-/20)m NW706, NG405, NT145,146,170	N	2,5 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 12-31 in Gräsern, ausgenommen Rispen-Arten gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Picono	08	NW -(-/-/5)m NT112, NT145,146,170	F	2,5 - 3,0 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 11-13 in Gräsern, ausgenommen Straussgras-Arten gegen Windhalm und Unkräuter. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

Infos zur Grassamenproduktion
**Unkräuter, Ungräser, Krankheiten,
Schädlinge und Wachstumsregler**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ungräser, Ausfallgetreide und Quecke, außer Jährige Rispe	Fusilade MAX	07 08 09	NT101, bzw. NT103 VV211	N	0,75 - 2,0 l	Nur in Rot- und Schafschwingel , als Untersaat nach dem Räumen der Deckfrucht. Aufwand je nach Art der Ungräser. NT-Auflage je nach Aufwandmenge. Kulturschäden bei ungünstigen Anwendungsbedingungen möglich!
Ungräser und Ausfallgetreide	Agil-S	07 08 09		N	0,25 l	Nur in Rohr-, Schaf- und Wiesenschwingel, Wiesenlieschgras und Deutschen Weidelgras gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Ausfallgetreide. Anwendung von BBCH 21-29 im Spätherbst ab der Vegetationsruhe bis zum Frühjahr vor Vegetationsbeginn. Resistenzmanagement notwendig.
					0,2 l	Nur in Wiesenrispengras gegen Windhalm, Gemeine Rispe und Ausfallgetreide. Anwendung von BBCH 21-29 im Spätherbst ab der Vegetationsruhe bis zum Frühjahr vor Vegetationsbeginn. Resistenzmanagement notwendig.
	Select 240 EC + Radiamix	07 08 09	NT108, VV207	F	0,5 + 1,0 l	Nur in Rot- und Schafschwingel im Nachauflauf ab BBCH 13 gegen Ungräser von BBCH 12-29. Kulturschäden bei ungünstigen Anwendungsbedingungen möglich!

Infos zur Grassamenproduktion
**Unkräuter, Ungräser, Krankheiten,
Schädlinge und Wachstumsregler**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	Roundup Powerflex #)	09	NG352	14	33 %ige Streichlösung	Anwendung als gezielte Einzelpflanzenbehandlung mit Dochtstreichgerät. Bereinigung von Fremdbesatz oder Problemunkräutern. Abtropfen der Streichlösung auf die Kulturpflanzen muss vermieden werden. Maximaler Mittelaufwand pro Jahr 3,75 l/ha. Anwendung auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen!
Halmfestigung	Countdown NT	07	VV207	F	0,4 - 0,8 l max. 1x	In der Schossphase BBCH 31-37. Aufwandmenge je nach Grasart und standortspezifischen Bedarf. Anwendung in der frühen Schoßphase empfehlenswert.
	Medax Top	07		N	0,5 - 1,0 l max. 1x	
	Moddus	02 07 08	VV207	N	0,4 - 0,8 l max. 1x	
	Moxa	02 07 08 09		N	0,4 - 0,8 l max. 1x	

Infos zur Grassamenproduktion
**Unkräuter, Ungräser, Krankheiten,
Schädlinge und Wachstumsregler**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Pilzliche Blattfleckenerreger und Rostpilze	Folicur	05 07 08 09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	Ab dem Frühjahr gegen Rostpilze und pilzliche Blattfleckenerreger bei Befallsbeginn bzw. nach Auftreten erster Krankheitssymptome bis spätestens zum Beginn der Blüte.
	Ortiva	07 09	NW 5(*/*/*)m, NW701	F	1,0 l	
	Revytrex	05 07 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
Saugende und beißende Insekten, Fritfliege	Kaiso Sorbie	07 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108, VV212	N	150 g max. 1x	Nach dem Auflaufen bis zum Ende der Blüte nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufwurf. Einsatz möglichst erst in den Abendstunden nach dem Bienenflug. Erntegut nicht verfüttern.
	Karate Zeon	07 08 09	NB6623, NN410, NW -(10/5/5)m NT108, VV207	F	75 ml max. 2x	

*) Landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!

#) bei alternativen Glyphosat-Präparaten sind ggf. veränderte Anwendungsbestimmungen zu beachten. Generelle Anwendungsverbote auf Basis von
privatrechtlichen Vereinbarungen (Pacht-, Lieferverträge) und besondere Anwendungsbestimmungen nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten.