

### Zugelassene Herbizide in Johannis- und Stachelbeeren (Stand Februar 2024)

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwandmenge	Anwendungs- zeitpunkt	Wartezeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienenschutz	Johannisbeeren	Stachelbeeren	Zulassung bis
Beloukha (Pelargonsäure) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einj. einkeimblättrige Unkräuter einj. zweikeimblättrige Unkräuter	16 l/ha	während der Vegetationsperiode max. 2 Anw.pro Kultur und Jahr	F	NW 468 NW 642-1 SE110 SS110-1 SS2101	B 4	X	X	15.12.25
	Abtöten von Ruten	16 l/ha	während der Vegetationsperiode max. 2 Anw.pro Kultur und Jahr	F	NW 468 NW 642-1 SE110 SS110-1 SS2101		X	X	
Flexidor (Isoxaben) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter	0,5 l/ha	ab Pflanzjahr bis Blühbeginn auf unkrautfreien Boden max. 1 Anw. pro Jahr	F	NG 403, NW 468, NT 102, NW 605 (50% : 5m, 75% *, 90% *) NW 606: 5m NW 706	B 4	X	X	31.12.24
Fusilade MAX (Fluazifop-P) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausg. einjähriges Rispengras)	1 l/ha	vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. je Kultur und Jahr	F	NT 101 NW 470 NW 642-1	B 4	X	X	31.12.24
	Gemeine Quecke	2 l/ha	vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. je Kultur und Jahr	F	NT 103 NW 470 NW 642-1		X	X	
Kerb Flo, GROOVE (Propyzamid)	einkeimblättrige Unkräuter Vogel-Sternmiere	6,25 l/ha	ab 1. Standjahr Winter (in der Vegetationsruhe) max. 1 Anw. pro Jahr	F	NT 103 NW 468 NW 705 NW 642	B 4	X	X	31.01.25
MON 79991 (Glyphosat)	einkeimblättrige Unkräuter zweikeimblättrige Unkräuter	2,5 kg/ha	ab Pflanzjahr während der Vegetationsperiode Reihenbehandlung max. 1 Anw. pro Jahr	42 Tage	NG 352 NW 470 NG 404 NW 642-1	B 4	X	X	15.12.24
MON 79991-SG Roundup REKORD (Glyphosat)	einkeimblättrige Unkräuter zweikeimblättrige Unkräuter	2,5 kg/ha	ab Pflanzjahr während der Vegetationsperiode Reihenbehandlung max. 1 Anw. pro Jahr	42 Tage	NG 352 NW 468 NG 402, NT 103 NW 642-1	B 4	X	X	31.12.24

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwandmenge	Anwendungs- zeitpunkt	Wartezeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienenschutz	Johannisbeeren	Stachelbeeren	Zulassung bis
Phantom (Fluazifop-P) nur für rote und schwarze Johannisbeeren und Stachelbeeren	einjährige einkeimblättrige Unkräuter ausgenommen: einjähriges Rispen- gras	1 l/ha	nach dem Auflaufen der Unkräuter vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	90 Tage	NG720 NT101 NW470, NW 642-1 SE110 SF275-EEOS SS110-1 SS2101, SS610	B 4	X	X	31.12.24
Quickdown + Toil (Pyraflufen + Rapsöl- Methylester) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Abtötung von Stockaustrieb	0,8 l/ha + 2,0 l/ha	bei Beginn des Triebwachstums bei 5-10 cm Neu- trieb oder bis 15 cm Trieblänge max. 1 Anw. pro Jahr in Mischung mit Toil 2 l/ha	F	NW 468 NW 642-1 SE110 SS110-1 SS2101	B 4	X	X	31.01.25
Roundup Power Flex (Glyphosat)	einkeimblättrige Unkräuter zweikeimblättrige Unkräuter	3,75 l/ha	ab Pflanzjahr Frühjahr bis Sommer max. 1 Anw. pro Jahr	42 Tage	NG 352 NW 468 NG 402, NT 103 NW 642-1 SF275-28OS	B 4	X	X	15.12.24
Select 240 EC (Clethodim) (in Mischung mit Radiamax 1 l/ha) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	einjähriges Rispengras	0,75 l/ha	vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NT 108, NW 468 NW 642-1	B 4	X	X	31.12.24
Spectrum (Dimethenamid-P) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	gegen einjähriges Rispengras, Schadhirsen, Franzosenkraut- Arten, Amarant- Arten, Kamille- Arten, Kleine Brennessel, Gemeines Kreuz- kraut	1,4 l/ha	bis Beginn der Blüte: etwa 10 % der Blüten geöffnet in Ertrags- u. Jung- anlagen, ab 1. Standjahr, nicht im Pflanzjahr spritzen als Reihen- behandlung mit Abschirmung max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 470, NW 642 SF143, SF 275-EEOS SF 276-7OS SS110-1, SS120-1 SS122 SS2101, SS522, SS530, SS 610, ST 1122, VA271	B 4	X	X	30.04.25
Stomp Aqua Stomp Raps (Pendimethalin) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einj.zweikeim- blättrige Unkräuter ausgenommen: Acker-Hundskamille Kletten-Labkraut Kamille-Arten Gemeines Kreuzkraut Franzosenkraut-Arten	3,5 l/ha	Winter (Vegetationsruhe) bis Traubenachse beginnt sich zu strecken max. 1 Anw. pro Jahr nicht im Pflanzjahr ab 1. Standjahr	F	NT 145, NT 146,NT 170 NW 468 NW 705 NW 641 (nur mit Verwendung eines Spritzschirmes) NW 642-1 SE110 SS110-1 SS2101 SS610	B 4	X	X	30.06.24

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwandmenge	Anwendungs- zeitpunkt	Wartezeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienenschutz	Johannisbeeren	Stachelbeeren	Zulassung bis
Vorox F (Flumioxazin) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	einj. einkeimblättrige Unkräuter einj. zweikeimblättrige Unkräuter	600 g/ha	ab Pflanzjahr vor der Blüte oder nach der Ernte Reihenbehandlung mit Abschirmung vor der Blüte max. 1 Anw. pro Jahr, nach der Ernte max. 1 Anw.pro Jahr pro Kultur und Jahr max. 2 Anw.	F	NW 470 NW 706 NW 642-1 SS110-1 SS120-1 SS2101	B 4	X	X	30.06.24