

Zugelassene Herbizide in Erdbeeren (Stand März 2024)

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Beloukha (Pelargonsäure) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Abtötung von Ausläufern	16 l/ha	bis 14 Tage vor der Ernte und nach der Ernte max. 2 Anw. pro Jahr im Abstand von 14 Tagen	F	NT 101 NW 468 NW 642-1 SE110, SS110-1, SS2101	B 4	15.12.25
Betasana SC Betosip SC (Phenmedipham) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter	6 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen nicht im Ertragsjahr max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 604 NW 607(75%:20m, 90%:10m)	B 4	15.02.26
		2 x 3 l/ha	(Splitting der Aufwand- menge in bis zu 3 Teilgaben möglich, Abstand der Behandlungen zwischen 5-7 Tagen)				
			im Pflanzjahr nach dem Pflanzen nicht im Ertragsjahr max. 2 Anw. pro Jahr		NW 468 NW 604 NW 607(50%:20m, 75%:10m,90%:5m)		
	3 x 2 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen nicht im Ertragsjahr max. 3 Anw. pro Jahr	NW 468 NW 604 NW 607(50%:15m, 75%:10m,90%:5m)				
	einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter	6 l/ha	im Ertragsjahr vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr		NW 468 NW 604 NW 607(75%:20m, 90%:10m)		
		2 x 3 l/ha	(Splitting der Aufwand- menge in bis zu 3 Teilgaben möglich, Abstand der Behandlungen zwischen 5-7 Tagen)				
im Ertragsjahr vor der Blüte oder nach der Ernte max. 2 Anw. pro Jahr			NW 468 NW 604 NW 607(50%:20m, 75%:10m,90%:5m)				
3 x 2 l/ha	im Ertragsjahr vor der Blüte oder nach der Ernte max. 3 Anw. pro Jahr	NW 468 NW 604 NW 607(50%:15m, 75%:10m,90%:5m)					

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit	Anwendungsbestimmungen/Auflagen	Bienenschutz	Zulassung bis
Cadou SC (Flufenacet) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjähriges Rispengras	0,3 l/ha	nach dem Pflanzen nicht im Ertragsjahr max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 642 NW 705	B 4	31.10.24
	einjähriges Rispengras	0,3 l/ha	vor der Blüte nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 642 NW 705		
Finalsan (Pelargonsäure) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	zweikeimblättrige Unkräuter, einkeimblättrige Unkräuter)	62,5 l/ha	vor dem Reihenschluss max. 6 Anw.pro Kultur und Jahr, zeitlicher Abstand der Behandlungen mind. 3 Tage	F	NW 468 NW 642-1 SE110 spritzen ist nur über Einzelpflanzenbehandlung mit optischer Unkrautererkennung mit dem speziellen Gerät (Kilter AX-1) genehmigt.	B 4	15.12.25
Flexidor (Isoxaben) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ausgenommen zur Pflanzguterzeugung	0,4 l/ha	nach der Ernte vor dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Jahr	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609: 5m, NW 706, VV 600	B 4	31.12.24
	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ausgenommen zur Pflanzguterzeugung	0,4 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen vor dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Jahr	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609: 5m, NW 706, VV 600		
	Gem. Kreuzkraut Gem. Hirtentäschel Acker-Senf Vogel-Sternmiere	0,2 l/ha	bei Vegetationsbeginn vor dem Auflaufen der Unkräuter nicht im Pflanzjahr in dieser Anw. max. 1, pro Jahr max. 2 Anw.	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609-1: 5m, NW 706		
	Gem. Kreuzkraut Gem. Hirtentäschel Acker-Senf Vogel-Sternmiere	0,2 l/ha	nach der Ernte vor dem Auflaufen der Unkräuter in dieser Anw. max. 1, pro Jahr max. 2 Anw.	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609-1: 5m, NW 706		
	Gem. Kreuzkraut Gem. Hirtentäschel Acker-Senf Vogel-Sternmiere ausgenommen zur Pflanzguterzeugung	0,4 l/ha	bei Vegetationsbeginn vor dem Auflaufen der Unkräuter nicht im Pflanzjahr max. 1 Anw. pro Jahr	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609-1: 5m, NW 706		
	Gem. Kreuzkraut Gem. Hirtentäschel Acker-Senf Vogel-Sternmiere	0,2 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen bis Schieben des ersten Laubblattes vor dem Auflaufen der Unkräuter in dieser Anw. max. 1, pro Jahr max. 2 Anw.	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609-1: 5m, NW 706		
			max. Mittelaufwand pro Kultur pro Jahr 0,4 l/ha				
			max. Mittelaufwand pro Kultur pro Jahr 0,4 l/ha				

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Focus Ultra (Cycloxydim) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einj.einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide (ausg. einjähriges Rispengras)	2,5 l/ha	nach dem Auflaufen der Unkräuter bis Blütenboden Erdbeere deutlich aufgewölbt max. 1 Anw.pro Kultur und Jahr	14 Tage	NT 101, NW 468 NW 642-1 SE110, SS110-1, SS2101, SS610	B 4	31.12.25
	Gemeine Quecke	5 l/ha	nach dem Auflaufen der Unkräuter bei Unkrauthöhe bis 25 cm bis Blütenboden Erdbeere deutlich aufgewölbt max. 1 Anw.pro Kultur und Jahr	14 Tage	NT 102, NW 468 NW 642-1 SE110, SS110-1, SS2101, SS610		
Fusilade MAX (Fluazifop-P)	einj.einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide (ausg. einjähriges Rispengras)	1 l/ha	vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	42 Tage F	NT 101, NW 470 NW 642-1	B 4	31.12.24
Goltix Gold (Metamitron) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjährige Risppe einj. zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Klettenlab- kraut u. Knöterich- Arten)	2 l/ha	nach der Ernte Spätsommer bis Herbst max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468, NG 402 NW 642	B 4	31.08.26
Kerb Flo, GROOVE (Propyzamid)	Vogel-Sternmiere einjährige einkeimblättrige Unkräuter	1,25 l/ha	Winter (in der Vegetations- ruhe) max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468, NW 642 WP 775	B 4	31.01.25
Lontrel 720 SG (Clopyralid)	Acker-Kratzdistel Kamille-Arten Acker-Hundskamille	167 g/ha	Frühjahr vor der Blüte max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 101 NW 468 NW 642-1	B 4	31.12.24
	Acker-Kratzdistel Kamille-Arten Acker-Hundskamille	167 g/ha	Sommer nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NG 316 (keine Anwendung nach dem 15. September) NT 101, NW 468 NW 642-1		
Vivendi 100 (Clopyralid)	Acker-Kratzdistel Kamille-Arten Acker-Hundskamille	1,2 l/ha	Frühjahr vor der Blüte max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 101 NW 468 NW 642-1	B 4	31.12.24
	Acker-Kratzdistel Kamille-Arten Acker-Hundskamille	1,2 l/ha	Sommer nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NG 316 (keine Anwendung nach dem 15. September) NT 101, NW 468 NW 642-1		
Quickdown + Toil (Pyraflufen + Rapsöl- Methylester) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Abtötung von Ausläufern	0,8 l/ha + 2,0 l/ha	nach der Ernte max. 2 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 642-1 SE110, SS110-1, SS2101	B 4	31.01.25

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Select 240 EC (Clethodim) (in Mischung mit Radiumix 1 l/ha)	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	0,75 l/ha	Pflanzjahr nach dem Pflanzen max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 108, NW 468, NW 642-1	B 4	31.12.24
	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	0,75 l/ha	im Ertragsjahr nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 108, NW 468, NW 642-1		
	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter in Beständen zur Pflanzguterzeugung	0,75 l/ha	nach Austrieb oder nach dem Pflanzen max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 108, NW 468, NW 642-1		
Spectrum (Dimethenamid-P) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjähriges Rispen- gras, Schadhirsens, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	1,4 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NT 101, NW 470 NW 605 (50%: 10m, 75%:5m 90%:5m) NW 606: 20 m SF143 SS110-1, SS120-1 SS2101, SS530, SS610, VA 271	B 4	30.04.25
	einjähriges Rispen- gras, Schadhirsens, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	1,4 l/ha	im Pflanzjahr vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NT 101, NW 470 NW 605 (50%: 5m, 75%:5m 90%:*) NW 606: 10 m NW 706 SF143 SS110-1, SS120-1 SS2101, SS530, SS610, VA 271		
	einjähriges Rispen- gras, Schadhirsens, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	1,4 l/ha	im Ertragsjahr vor der Blüte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NT 101, NW 470 NW 605 (50%: 5m, 75%:5m 90%:*) NW 606: 10 m NW 706 SF143 SS110-1, SS120-1 SS2101, SS530, SS610, VA 271		
	einjähriges Rispen- gras, Schadhirsens, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	1,4 l/ha	im Ertragsjahr nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NT 101, NW 470 NW 605 (50%: 10m, 75%:5m 90%:5m) NW 606: 20 m SF143 SS110-1, SS120-1 SS2101, SS530, SS610, VA 271		
Stomp Aqua Stomp Raps (Pendimethalin) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	Acker-Fuchsschwanz Gemeiner Windhalm einj.zweikeimblättrige Unkräuter ausgenommen: Acker-Hundskamille Kletten-Labkraut Kamille-Arten Gemeines Kreuzkraut	3,5 l/ha	während der Vegetationsruhe Spätherbst bis Winter max. 1 Anw. pro Jahr auf unkrautfreien Boden	F	NT 112, NT 145, NT 146, NT 170, NW 468, NW 605-1: (90 % 5m) SE110 SS110-1,SS2101, SS610	B 4	30.06.24

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Target SC (Metamitron) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter einjährige einkeim- blättrige Unkräuter Jungpflanzenanzucht	0,5 l/ha	nach dem Pflanzen max. 3 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NW 470 NW 642-1 SB1904 SS110-1, SS 120-1, SS2101	B 4	31.08.26
Venzar 500SC (Lenacil) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter (nicht im Ertrag stehende Anlagen)	0,5 l/ha	im Pflanzjahr und nach dem Pflanzen von Auflaufen bis 3.Laubblatt entfaltet max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 360, NW 468, NW 605-1 (50%: 5m, 75%:5m, 90%:*), NW 606: 5m, NW 706,NW 800, SS110-1, SS2101, SS 610 SF275-14BE	B 4	31.12.24
	einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter in Ertragsanlagen	0,5 l/ha	nach der Ernte und zum Abschluss des vegetativen Wachs- tums im Sommer, von Auflaufen bis 3.Laubblatt entfaltet max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 360, NW 468, NW 605-1 (50%: 5m, 75%:5m, 90%:*), NW 606: 5m, NW 706,NW 800, SS110-1, SS2101, SS 610 SF275-14BE		
	einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter Vermehrungsgut	0,5 l/ha	nach dem Pflanzen von Auflaufen bis 3.Laubblatt entfaltet max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 360, NW 468, NW 605-1 (50%: 5m, 75%:5m, 90%:*), NW 606: 5m, NW 706,NW 800, SS110-1, SS2101, SS 610 SF275-14BE		
Zetrola, AGIL-S (Propaquizafop) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter ausgenommen: einj. Rispengras Gemeine Quecke	0,75 l/ha	nach der Ernte max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	35 Tage	NW 468 NW 642-1 WP 733	B 4	30.11.24
	Gemeine Quecke	1,5 l/ha	nach dem Austrieb April bis August bei 15-20 cm Unkrauthöhe max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	35 Tage	NW 468 NW 642-1 SF275-28BE		