

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Bekämpfungszeitraum Ende der Bestockung bis Spitzen des Fahnenblattes nach der Hauptinfektionsperiode. Infektionsgefahr bei längeren feuchtkühlen Witterungsperioden. Warndiensthinweise beachten. Ausbringung in Kombination mit Wachstumsreglern ist möglich. Die aufgeführten Präparate wirken zugleich gegen zahlreiche Blattkrankheitserreger.
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Fandango	W,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 08,	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,25 l	
Flexity	W,G,R,T	07		F	0,5 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l		
	Input Classic	W,G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l		
	Input Triple	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706,NW800	F	1,25 l		
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W,R	05, 07, 08, 09	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Proline, Curbatur	W,R	07, 08, 09	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 08, 09	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,T	07, 08, 09	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Tokyo, Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Unix	W,G,R,T	09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	1,0 kg	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU,G,R, WT	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Verben	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Im Frühjahr zu Epidemiebeginn bis spätestens zur Getreideblüte.
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ascra Xpro	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU, G,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NT101, VA271	F	1,5 l	
	Fandango	W,G,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
Flexity	W,G,R,T	07		F	0,5 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	Reine Schwefel-Präparate. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide. Reines Schwefel-Präparat. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide.
	Input Classic	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Jordi	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Kayak	G		NW 10(5/5/*)m NW706	49	1,5 l	
	Kumulus WG, Netzschwefel Stulln, Thiovit Jet	W,G,R			35	6 kg	
	Microthiol WG	W,G,R,T,H			35	7,5 kg	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pronto Plus	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar	W,G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revystar + Flexity	W,G,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Siltra Xpro	W,G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	Reines Schwefel-Präparat in einer SC-Formulierung. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide.
		DI,R,T,H	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	
	Skyway Xpro	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Talius	W,G,R,T	05, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,25 l	
	Thiopron	W,G,R,T	07		F	7,5 l	
	Tokyo, Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
G		07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Traciafin	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich)
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,T	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU, WT	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Vegas Plus	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW 20(15/10/10)m VA271	F	0,8 l	
	Verben	W,G,WT	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Abran	WW,SW,DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Bei warmer Witterung schnelle Vermehrung möglich, daher in der Ährenphase auf langanhaltenden Fungizidschutz achten.
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Alonty	W,G,R,T	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	
	Ambarac	W,G	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Amistar Gold	W,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Ascra Xpro	W,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G,H	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW,DU,WR,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Azbany	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	W,R,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	W,G,R	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Comet	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU,G,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NT101, VA271	F	1,5 l	
	Domark 10 EC	W	05, 07, 08, 09		F	1,25 l	
	Elatus Era	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42 G: F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 1,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Pro = Elatus Era + Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT850, NW800	42 G: 35	1,0 + 0,2 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Elatus Era Sympara	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	42 G: F	1,0 + 0,33 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Elatus Plus	W,G,R,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,75 l	
	Fandango	W,G,R,T	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Fezan	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Folicur	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l W: 1,0 l	
	Greteg	W,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	R	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706,NW800	F	1,25 l	
	Jordi	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	LS Azoxy	W,G,R,T	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	
		H	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51). Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Orius	W,G,R,T	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l W: 1,25 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,R	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pioli	W,G,R,T	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Priaxor	W,G,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
Prosaro, Sympara	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Revystar	W,G,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revystar + Flexity	W,G,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
		R,T	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l	
	Revytrex + Comet	W,G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
		R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,1 + 0,35 l	
	Siltra Xpro	W,G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,R,T,H	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Sinstar	WW,SW,G	09	NW 10(5/5/*)m	35	1,0 l	
	Skyway Xpro	W,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	
	Tebucur 250 EW	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Tokyo, Pecari 250 EC	WW,SW,DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW,DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,R	05,07,09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l R: 1,5 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Abran	WW,SW, DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Bei feuchtkühler Witterung und anfälliger Sorte schnelle Vermehrung möglich, daher bei Befallsbeginn sofort handeln.
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Alonty	W,T	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	
	Ambarac	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Amistar Gold	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Balaya	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	W	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	W	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Comet	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NT101, VA271	F	1,5 l	
	Domark 10 EC	W	05, 07, 08, 09		F	1,25 l	
	Elatus Era	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Pro = Elatus Era + Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU,G,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT850, NW800	35	1,0 + 0,2 l	
	Elatus Era Sympara	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,75 l	
	Fandango	W,T	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Greteg	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Input Classic	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
LS Azoxy	W	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Priaxor	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revystar + Flexity	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
	Siltra Xpro	W,DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Sinstar	W	09	NW 10(5/5/*)m	35	1,0 l	
	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Tebucur 250 EW	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Tokyo, Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,T	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
Verben	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium- Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Abran	WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Längere Nässeperioden fördern die Krankheitsausbreitung. Fungizideinsatz ab BBCH 31 je nach Temperatur 7 - 14 Tage nach Infektionsbeginn.
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Alonty	G,R	07, 09	NW 5(*/*)m	35	1,5 l	
	Ambarac	G,R	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WR,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
Azbany	G,R,T	09	NW 5(5/*)m	F	1,0 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Balaya	G,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	G,R	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Comet	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Delaro Forte	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NT101, VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	G,R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Pro = Elatus Era + Pecari 250 EC	G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT850, NW800	35	1,0 + 0,2 l	
	Elatus Era Sympara	G,R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	G,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,75 l	
	Fandango	G,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Folicur	G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l	
	Hint	G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Input Classic	G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706,NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	LS Azoxy	G,R,T	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	
	Orius	G,R	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	G,R,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pioli	G,R	07, 08, 09		F	2,0 l	Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
Priaxor	G,R	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Proline, Curbatur	R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revystar + Flexity	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
		R	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l	
	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
		R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,1 + 0,35 l	
	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Sinstar	G	09	NW 10(5/5/*)m	35	1,0 l	
	Skyway Xpro	R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Tokyo, Pecari 250 EC	R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	R	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	G	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben	G,WR	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Abran	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Zu Beginn der Befallsausbreitung bis Ende des Ährenschiebens. Ausbreitung durch feuchtwarme Witterung begünstigt.
	Alonty	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	
	Ambarac	G	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Azbany	G	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	G	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	G	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Comet	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Delaro Forte	G	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NT101, VA271	F	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Elatus Era	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Pro = Elatus Era + Pecari 250 EC	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT850, NW800	35	1,0 + 0,2 l	
	Elatus Era Sympara	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,75 l	
	Fandango	G	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,25 l	
	Folicur	G	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l	
	Hint	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706,NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
Kayak	G		NW 10(5/5/*)m NW706	49	1,5 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	LS Azoxy	G	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Orius	G	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pioli	G,R	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Priaxor	G	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar + Flexity	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Sinstar	G	09	NW 10(5/5/*)m	35	1,0 l	
	Skyway Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Tokyo, Pecari 250 EC	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	G	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben	G	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	Abran	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Die Ausbreitung wird begünstigt durch warme, wechselfeuchte Witterungsabschnitte mit hoher Luftfeuchte. Besonders hohe Gefährdung bei Weizenvorfrucht mit Minimalbodenbestellung und anfälligen Sorten.
	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Comet	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NT101, VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era Pro = Elatus Era + Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT850, NW800	35	1,0 + 0,2 l	
	Fandango	W	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Hint	WW,SW, DU	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
Input Triple	W	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706,NW800	F	1,25 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	Jordi	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Priaxor	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	Tokyo, Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Traciafin	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
	Univoq	W	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l	
	Vastimo	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Abran	WW,SW,DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Feuchtwarme Witterung begünstigt Infektionen durch <i>Septoria nodorum</i> , feuchtkühle die durch <i>Septoria tritici</i> . Folpan 500 SC ist ein reines Kontaktfungizid und hat nur eine vorbeugende Wirkung. Systemische Fungizide besitzen auch eine heilende Wirkung, d.h. sie erfassen auch noch wenige Tage alte <i>Septoria</i> -Infektionen. Azbany, Chamane, LS Azoxy und Sinstar sind in Weizen nur gegen <i>Septoria nodorum</i> zugelassen. Strobilurin-Solo-Präparate wie Azbany, Chamane, Comet, LS Azoxy oder Sinstar besitzen aufgrund weitverbreiteter Resistenz keine ausreichende Wirkung gegen <i>Septoria tritici</i> .
	Alonty	W,T	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	
	Ambarac	W,T	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Amistar Gold	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Ascra Xpro	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW,DU,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Azbany	W	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	W	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
Delaro Forte	WW,SW,DI,DU,T	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NT101, VA271	F	1,5 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Elatus Era	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Pro = Elatus Era + Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT850, NW800	35	1,0 + 0,2 l	
	Elatus Era Sympara	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,75 l	
	Fandango	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Folpan 500 SC	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	42	1,5 l	
	Greteg	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Hint	WW,SW, DU,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	W,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706,NW800	F	1,25 l	
	Jordi	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	LS Azoxy	W	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51). Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Orius	T	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
		T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pioli	W,T	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Priaxor	W,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar + Flexity	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)		T	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
		T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,1 + 0,35 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Sinstar	W	09	NW 10(5/5/*)m	35	1,0 l	
	Skyway Xpro	W,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
	Tokyo, Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,T	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
Verben	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Abran	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Hohe Infektionsgefahr nach Vorfrucht Mais, nicht-wendender Bodenbearbeitung, anfälligen Sorten und warmer Witterung mit einzelnen gewittrigen Niederschlägen Mitte des Ährenschiebens bis Ende der Blüte. Elatus Era, Pioli oder Skyway Xpro sollten zur Resistenzvermeidung in Spritzfolgen nur bei Vorbehandlung ohne Carboxamidpräparate (z.B. Alonty, Elatus Era, Elatus Plus, Pioli, Priaxor, Revytrex, Vastimo, Xpro-Produkte) eingesetzt werden.
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ambarac	W	02, 05, 07, 08,	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60,	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU,SG	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NT101, VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 l	
	Elatus Era Pro = Elatus Era + Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT850, NW800	35	1,0 + 0,2 l	
	Elatus Era Sympara	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	42	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	W	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Fezan	W (ohne DU)	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Folicur	W (ohne DU)	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,0 l	VextaSil ist ein empfohlener Zusatzstoff
	Hint	WW,SW, DU,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	W,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW701	F	1,25 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m NT850	35	0,65 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Sirena Pro Pack = Sirena EC + Protendo Forte + VextaSil	WW,SW, DU	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT850	35	1,0 + 0,5 + 0,2 l	
	Siltra Xpro	W,DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l		
	Tebucur 250 EW	W,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,25 l W: 1,0 l		
	Tokyo, Pecari 250 EC	WW,SW, DI,DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l		
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l		
	Traciafin	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l		
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l		
	Univoq	W	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l		Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ramularia-Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo-cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Alonty	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	Die typischen Sprenkelnekrosen erscheinen meist erst nach dem Ährenschieben, oft nach einem Witterungsumschwung von bewölkt und regnerisch (strahlungsarm) auf sonnig mit starkem Anstieg der Temperatur und der Globalstrahlung. Fungizide mindern den Schadensverlauf, wenn sie in den empfindlichen Entwicklungsstadien zwischen Fahnenblattstadium (BBCH 39) und Beginn der Blüte (BBCH 61) möglichst kurz vor oder kurz nach einem Witterungsumschwung zu einer Hochstrahlungsphase eingesetzt werden. Folpan 500 SC ist ein reines Kontaktfungizid zur Befallsminderung. Da <i>Ramularia collo-cygni</i> mittlerweile in ganz Bayern eine zunehmende Resistenz gegen wichtige Fungizidwirkstoffe zeigt, kann die Ergänzung von Folpan 500 SC die Wirkung gegen die Sprenkelkrankheit verbessern und zugleich die Ausbreitung der Resistenzen verzögern. Empfohlen wird eine Kombination mit Gerstenfungiziden, welche die Wirkstoffe Mefentrifluconazol oder Prothioconazol enthalten.
	Ascra Xpro	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Balaya	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Delaro Forte	G	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NT101, VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Pro = Elatus Era + Pecari 250 EC	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT850, NW800	35	1,0 + 0,2 l	
	Elatus Era Sympara	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Folpan 500 SC	G	07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,5 l	
	Input Classic	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ramularia-Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo-cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Revystar	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revystar + Flexity	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Vastimo	G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!