























































## Wirkungsspektren Fungizide in Kartoffeln

## Pilzkrankheiten

Präparat	Wirkstoff Wirkstoffgehalt (g/E)	Aufwand- menge (l, kg / ha)	MoA	Wirkung gegen Blattbefall	Wirkung gegen Stängelbefall	Schutz des Neuzuwachs	Alternaria- wirkung	Wirkungs- dauer	Kurativ- wirkung
<b>Kontaktfungizide gegen Krautfäule (<i>Phytophthora infestans</i>)</b>									
<b>Polyram WG</b>	Metiram 700	1,8	M						
<b>Gachinko, Leimay</b>	Amisulbrom 200	0,5	C4						
<b>Ranman Top</b>	Cyazofamid 160 <sup>1)</sup>	0,5	C4						
<b>Carneol, Nando, Ohayo, Shirilan, Terminus</b>	Fluazinam 500 <sup>1)</sup>	0,4	C5						
<b>Translaminare und systemische Fungizide gegen Krautfäule (<i>Phytophthora infestans</i>)</b>									
<b>Banjo forte</b>	Dimethomorph 200 + Fluazinam 200 <sup>1)</sup>	1,0	H5 C5						
<b>Carial Flex</b>	Mandipropamid 250 + Cymoxanil 180	0,6	H5 U						
<b>Curzate 60WG</b>	Cymoxanil 600	0,2	U						
<b>Infinito</b>	Propamocarb 625 + Fluopicolide 62,5	1,6	F4 B5						
<b>Terminus Extra</b>	Fluazinam 300 <sup>1)</sup> + Cymoxanil 200	0,6	C5 U						

## Wirkungsspektren Fungizide in Kartoffeln

## Pilzkrankheiten

Präparat	Wirkstoff Wirkstoffgehalt (g/E)	Aufwand- menge (l, kg / ha)	MoA	Wirkung gegen Blattbefall	Wirkung gegen Stängelbefall	Schutz des Neuzuwachs	Alternaria- wirkung	Wirkungs- dauer	Kurativ- wirkung
<b>Presidium</b>	Dimethomorph 180 + Zoxamide 180	1,0	H5 B3	◐	◐	○	◐	◐	◐
<b>Reboot</b>	Cymoxanil 330 + Zoxamide 330	0,45	U B3	◐	◐	○	◐	◐	◐
<b>Revus</b>	Mandipropamid 250	0,6	H5	◐	◐	○	○	●	◐
<b>Revus Top</b>	Mandipropamid 250 + Difenconazol 250	0,6	H5 G1	◐	◐	○	◐	●	◐
<b>Simpro</b>	Propamocarb 400 + Cymoxanil 50	2,5	F4 U	◐	◐	◐	○	◐	◐
<b>Voyager</b>	Valifenalate 150 + Fluazinam 200 <sup>1)</sup>	1,0	H5 C5	◐	◐	○	◐	●	◐
<b>Zorvec Entecta</b>	Oxathiapiprolin 48 + Amisulbrom 240	0,25	F9 C4	●	◐	◐	○	●	◐
<b>Spezialfungizide gegen Dürfleckenkrankheit (Alternaria solani)</b>									
<b>Belanty</b>	Mefentrifluconazole 75	1,25	G1	○	○	○	◐	◐	○
<b>Narita</b>	Difenconazol 250	0,5	G1	○	○	○	◐	◐	○
<b>Ortiva</b>	Azoxystrobin 250	0,5	C3	○	○	○	◐		○

## Wirkungsspektren Fungizide in Kartoffeln

## Pilzkrankheiten

Präparat	Wirkstoff Wirkstoffgehalt (g/E)	Aufwand- menge (l, kg / ha)	MoA	Wirkung gegen Blattbefall	Wirkung gegen Stängelbefall	Schutz des Neuzuwachs	Alternaria- wirkung	Wirkungs- dauer	Kurativ- wirkung
<b>Propulse</b>	Prothioconazol 125 + Fluopyram 125	0,5	G1 C2	○	○	○	◐	●	○
<b>Signum</b>	Pyraclostrobin 67 + Boscalid 267	0,25	C3 C2	○	○	○	◐		○

Bewertung: ○ = keine Wirkung; ◐ = geringe Wirkung; ◑ = mittlere Wirkung; ◒ = gute Wirkung; ● = sehr gute Wirkung

1) Bei der Einstufung wird von einer gegen Fluazinam oder Cyazofamid sensitiven Phytophthora-Population ausgegangen.