

Infos zu Leguminosen
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Botrytis</i> , Falscher Mehltau, Brennflecken an Ackerbohnen	Ortiva	07 09	NW 5(5/*/*)m NW701	35	1,0 l max. 2x	Bei Befallsbeginn behandeln.
Echte Mehltaupilze an Ackerbohnen	Folicur	05 07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT101, NW701	F	1,0 l max. 2x	
Rost (<i>Uromyces viciae fabae</i>) an Ackerbohnen	Azbany	09	NW 5(5/*/*)m NW706, NW800	35	1,0 l max. 2x	
	Chamane	09	NW 5(5/*/*)m NW706, NW800	35	1,0 l max. 1x	
	Folicur	05 07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT101, NW701	F	1,0 l max. 2x	
Schokoladenflecken (<i>Botrytis fabae</i>) an Ackerbohnen	Folicur	05 07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT101, NW701	F	1,0 l max. 2x	
<i>Colletotrichum</i> an Lupine-Arten	Folicur	05 07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT101, NW701	F	1,0 l max. 2x	
	Ortiva	07 09	NW 5(5/*/*)m NW701	35	1,0 l max. 2x	

Infos zu Leguminosen
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Botrytis cinerea</i> an Futtererbsen	Chamane	09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l max. 2x	Bei Befallsbeginn behandeln.
Erbsenrost (<i>Uromyces pisi</i>) an Futtererbsen	Folicur	05 07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT101, NW701	F	1,0 l max. 2x	
Brennflecken (<i>Ascochyta pisi</i>) an Futtererbsen	Chamane	09	NW 5(5/*/*)m NW705	F	1,0 l max. 2x	
	Ortiva	07 09	NW 5(5/*/*)m NW705	35	1,0 l max. 2x	

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!