

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Schnecken	Ironmax Pro		NT116, NT870	F	7 kg max. 4x	Schneckenkorn auf Basis von Eisen III Phosphat. Breitflächiges Streuen vom Auflaufen bis zur Ernte möglich.
Beißende und saugende Insekten	Karate Zeon	08 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108	35	75 ml max. 2x	Ab Blütenanlagen bzw. -knospen sichtbar. Zeitlicher Abstand der Behandlungen mindestens 10 Tage.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Diaporthe phaseolorum</i>	Propulse	08 09	NW 5(5/*/*)m	28	1 l max. 2x	Zeitlicher Abstand der Behandlungen mindestens 14 Tage.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , Braunfleckenkrankheit, Falscher Mehltau	Cantus Ultra	07 09	NW -(20/10/5)m	F	0,8 l max. 1x	
Unkräuter	Centium 36 CS	09	NT102,127,149	F	0,25 l	Im Voraufbau, bis 5 Tage nach der Saat, gegen Unkräuter. Nicht in Beständen zur Saatguterzeugung.
	Clearfield Clentiga + Dash	05 07 08 09	NT108, NG343,354	F	1,0 + 1,0 l	Gegen Unkräuter im Nachaufbau bis BBCH 25 der Sojabohne.
	Harmony SX	09	NT101	F	2x 7,5 g	Gegen Amaranth, Hohlzahn, Kamille, Vogelmilch. Nach dem Auflaufen im Splitting-Verfahren in BBCH 12 und 14. Nebenwirkung gegen Ampfer. Anwendung in Mischung mit einem geeigneten Netzmittel empfohlen.

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Sencor Liquid	09	NW 5(*/*/*)m, NT101, NW701	F	0,3 - 0,4 l	Im Voraufbau bis BBCH 07. Ergänzung mit weiteren Bodenherbiziden sinnvoll. Sortenverträglichkeit gegenüber Metribuzin beachten.
	Stomp Aqua	07 08 09	NW -(-/-/5)m NT112 NT145,146,170	F	1,5 - 2,0 l	Im Voraufbau gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut. Aufwandmenge je nach Bodenart und Niederschlagsverhältnissen. Tankmischung mit Ergänzungspartner, wie z.B. 0,75 l/ha Spectrum, notwendig. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
Unkräuter und Ungräser	Artist	07 08 09	NW 5(*/*/*)m NW706, NT103	F	2,0 kg	Im Voraufbau gegen Unkräuter, Jährige Rispe und Schadhirs. Sortenverträglichkeit beachten.
	Quantum	05 07 08 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NG405, NT101	F	2,0 l	Im Voraufbau gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Kombination mit Ergänzungspräparat sinnvoll.
	Spectrum		07 09	NW 5(5/5/*)m NT101, NW701	F	0,8 l
NW 10(5/5/*)m NT101, NW706				F	1,4 l	

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	Spectrum Plus	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW706, NG405, NT112,145,146,170	F	2,5 - 3,5 l	Im Voraufbau gegen Hirsen, Jährige Rispe und Unkräuter, außer Klettenlabkraut. Gute Bodenfeuchtigkeit notwendig. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
Samenungräser, außer Jährige Rispe	Fusilade MAX	07 08 09	NT101	F	0,75 - 1,0 l	Gegen Ungräser und Ausfallgetreide im Nachaufbau bis BBCH 51. Zielpflanzen sollten im Stadium BBCH 11 bis spätestens BBCH 21 sein.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT101	F	1,0 - 1,5 l + 1,0 l	Gegen Ungräser und Ausfallgetreide im Nachaufbau von BBCH 11-51. Zielpflanzen sollten im Stadium BBCH 12 bis spätestens BBCH 19 sein.
	Targa Super	05 07 08 09	NT101	90	1,5 l	Gegen Ungräser im frühen Nachaufbau von BBCH 12-29 oder als Spätbehandlung von BBCH 49-59. Ausfallgetreide wird mit erfasst.

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Quecke, ausgenommen Jährige Rispe	Fusilade MAX	07 08 09	NT103	F	2,0 l	Gegen Quecke im Nachauflauf bis BBCH 51. Quecken sollten 2-4 Blätter entwickelt haben.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT102	F	2,5 l + 1,0 l	Gegen Quecke im Nachauflauf von BBCH 11-51 bei einer Wuchshöhe der Quecke von 25 cm.
	Targa Super	05 07 08 09	NT102	90	2,5 l	Gegen Quecke bei 15-20 cm Wuchshöhe im frühen Nachauflauf von BBCH 12-29 oder als Spätbehandlung von BBCH 49-59. Ausfallgetreide wird mit erfasst.

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!