

**Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen
ausgewählter Maisherbizide für die Frühjahrsbehandlung 2024**

Präparat	Hang- auflage ¹⁾	Gewässerabstand [m]				Nicht-Zielflächen-Abstand ²⁾ [m]								Sonstige Auflagen ³⁾
		Abdriftminderungskategorie je nach Düsentechnik				Abdriftminderungskategorie je nach Düsentechnik								
		0 %	50 %	75 %	90 %	Anteil an Kleinstrukturen ausreichend ?								
Pufferzone [m]	Abstand [m]				NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA		
Effigo	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Harmony SX, Lupus SX	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Lontrel 600, ...u.a.	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Tomigan 200	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Arrat	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Mais-Banvel WG, Delion	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Valentia	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Task	-	*	*	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	
Daneva, 0,75 l/ha	-	*	*	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	
Daneva, 1,0 l/ha, 2x 0,75 l/ha	-	*	*	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	
Callisto	-	*	*	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	
Botiga, 2x 0,5 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Botiga, 1,0 l/ha	-	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Casper	-	5	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Peak	10	5	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
(Gardo Gold)	10	5	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	NG300, NG301-1, NG362
Adengo, NA	10	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Adengo, VA	20	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Calaris	10	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG362
(Dual Gold)	10	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG300, NG301-1
Temsa SC	-	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Kideka	5	5	*	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	
Iseran	-	5	*	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	
Laudis	-	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Elumis	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327
Ikanos, ...u.a.	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327
Motivell Forte, ...u.a.	20	5	5	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	NG326-1, NG327
Cato, 30/20 g/ha Splittingbehandlung	-	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Cato, 50 g/ha Einmalbehandlung	5	5	5	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	
Principal Plus	20	5	5	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	NG326-1, NG327
Arigo	20	5	5	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	NG326-1, NG327
Diniro	-	5	5	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	NG326-1, NG327
MaisTer power, bis 1,0 l/ha	20	5	5	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	
MaisTer power, bis 1,5 l/ha	20	10	5	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	
Quantum, Successor 600	20	10	5	5	*	0	0	0	0	0	0	0	0	NG405
Aspect	10	10	5	5	*	20	0	20	0	0	0	0	0	NG362
Principal	20	10	5	5	*	20	0	20	0	0	0	0	0	NG326-1, NG327
Zingis	5	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Successor T	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG362
Spectrum Gold, bis 2,0 l/ha	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG362
Spectrum Gold, bis 3,0 l/ha	20	15	10	5	5	20	0	20	0	20	0	0	0	NG362, NG405
Spectrum	-	20	10	5	5	20	0	0	0	0	0	0	0	
Lodin	-	20	10	5	5	20	0	20	0	20	0	0	0	
Stomp Aqua, bis 3,5 l/ha	5				5							5-0 #	0	NT145, 146, 170
Spectrum Plus	20				5							5-0 #	0	NT145, 146, 170
Activus SC, NA	5				10							0	0	NT145, 146, 170
Onyx, 2 x 0,75 l/ha					10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Onyx, 1x 1,5 l/ha	-				20	20	0	0	0	0	0	0	0	NG405

= keine Anwendung möglich.

*) landesspezifische Regelungen und Vorgaben der Pflanzenschutz-
anwendungsverordnung zum Gewässerabstand beachten!

#) verringert Abstand zu Hecken auf ehemals
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten
Flächen.

(...) = Zulassung abgelaufen, letzter Einsatz 2024!

1) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen
vorhanden sein, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat.

2) Abstände sind nicht erforderlich:

- bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
- bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3 m breit sind, oder
- bei der Anwendungen mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten.
- in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulisse siehe 'www.julius-kuehn.de'.

3) NG300: Verbot der Anwendung in Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten und sonstigen Grundwasserschutzgebieten.

NG301-1: Keine Anwendung in vom BVL ausgewiesenen Wasserschutzgebieten und Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen.

NG326, NG326-1: es dürfen max. 45 g/ha Nicosulfuron auf derselben Fläche ausgebracht werden.

NG327: Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Nicosulfuron.

NG362: auf derselben Fläche darf innerhalb von drei Jahren nur eine Behandlung mit einem Terbutylazin-haltigen Mittel mit max. 850 g/ha Terbutylazin erfolgen.

NG405: Keine Anwendung auf drainierten Flächen.

NT145: Ausbringung mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha und 90 % Abdriftminderung.

NT146: Ausbringung mit höchstens 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit.

NT170: Ausbringung bei Windgeschwindigkeit von höchstens 3 m/s.



LfL

Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt, für Vollständigkeit und Richtigkeit
kann keine Gewähr übernommen werden. Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!

Herbologie / © K. Gehring, S. Thyssen
Stand: März 2024