

**Infos zu Rüben**
**Pilz- und Mangelkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Cercospora- und Ramularia-Blattflecken, Echter Mehltau	Amistar Gold	07 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l max. 2x	<p>Bekämpfungsschwellen für Blattkrankheiten:            Erstbehandlung bis 31. Juli: 5 von 100 zufällig entnommene Blätter aus dem mittleren Blattapparat sind befallen.            Zweitbehandlung bis 31. Juli: 15 von 100 zufällig entnommene Blätter aus dem mittleren Blattapparat sind befallen.            Erstbehandlung ab 1. August bis 15. August: 15 von 100 zufällig entnommene Blätter sind befallen. Folgebehandlung bis 15. August: 15 von 100 Blätter zeigen Befall.            Erst- und Folgebehandlung ab 16. August: 45 von 100 Blättern zeigen Befall. Zweitbehandlungen sind frühestens zwei Wochen nach einer Erstbehandlung zweckmäßig. Bei einer Erstbehandlung ab 16. August ist in der Regel keine Folgebehandlung erforderlich.            Schwellenwerte gelten für die Summe an Cercospora-, Ramularia-Blattflecken, Mehltau und Rost.            Warndienst beachten!            Hinweis: In Bayern wurde verbreitet Fungizidresistenz gegenüber Cercospora-Blattflecken nachgewiesen. Bei allen aufgeführten Präparaten muss mit einer Minderwirkung gegen Cercospora-Blattflecken gerechnet werden! Deshalb auf Hinweise des amtlichen Pflanzenschutzdienstes achten, ob für die Saison 2024 alternative Präparate bzw. Mischungspartner kurzfristig zur Verfügung stehen.</p>
	Diadem	07 09	NW 5(*/*/*)m	28	1,0 l max. 2x	
	Domark 10 EC	05 07 08 09		28	1,0 l max. 2x	
	Score	07 08 09	NW 10(5/5/*)m	28	0,4 l max. 2x	

**Infos zu Rüben**
**Pilz- und Mangelkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Cercospora</i> - Blattflecken	Serenade ASO			F	4,0 l max. 4x	Biologisches Pflanzenschutzmittel ( <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Stamm QST 713) zur Stärkung der pflanzeigenen Abwehrkräfte. Die Anwendung ist ab Beginn Bestandesschluß insgesamt 4x im Abstand von 5 Tagen möglich. Wirkung stark schwankend bzw. wetterabhängig. Präparat ist deshalb nur zur Befallsminderung bei schwachem Befallsdruck geeignet!
Echter Mehltau	Thiopron	07		F	7,5 l max. 2x	Nur zur Befallsminderung bei schwachen Mehлтаudruck!
Rhizoctonia (Späte Rübenfäule)	Amistar Gold	07 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l max: 1x	Auf Befallsflächen vor Bestandesschluss spritzen (BBCH 31-39). Nur zur Befallsminderung!
Herz- und Trockenfäule	Bor-haltige Dünger				lt. Firmen- angabe	Bei höheren Aufwandmengen ist eine Splittinganwendung sinnvoll.
Manganmangel	Mn-haltige chelatisierte Blattdünger				lt. Firmen- angabe	Besonders auf anmoorigen Böden. Bei Bedarf wiederholen.
Magnesiummangel	Mg-haltige chelatisierte Blattdünger				lt. Firmen- angabe	

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!