

















Wirkungsspektren Fungizide in Rüben
Pilzkrankheiten

| Präparat | Wirkstoff Wirkstoffgehalt (g/E) | Aufwandmenge (l, kg / ha) | MoA | Cercospora- Blattflecken* | Mehltau | Ramularia- Blattflecken | Rost |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Amistar Gold | Azoxystrobin 125 + Difenoconazol 125 | 1,0 | C3 G1 |  |  |  |  |
| Diadem | Mefentrifluconazole 100 + Fluxapyroxad 50 | 1,0 | C2 |  |  |  |  |
| Domark 10 EC | Tetraconazol 100 | 1,0 | G1 |  |  |  |  |
| Score | Difenoconazol 250 | 0,4 | G1 |  |  |  |  |

○ = keine Wirkung; ◐ = geringe Wirkung; ◑ = mittlere Wirkung; ◒ = gute Wirkung; ◓ = sehr gute Wirkung

*Aufgrund von Resistenzbildung kann die Wirkung aller aufgeführten Fungizide gegen den Erreger der Cercospora-Blattflecken deutlich reduziert sein bis hin zur Unwirksamkeit!