

Zulassung Basamid Granulat im Beerenobst und Erdbeeren (Stand Februar 2024)

Basamid Granulat (Wirkstoff: Dazomet), B 3, Zulassung bis 31.05.2024

Kulturen	Krankheit	Aufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit	Bienenschutz	Anwendungsbestimmungen
Erdbeeren	Bodenpilze Insekten Wurzelgallenälchen wandernde Wurzelnematoden (Freiland und Gewächshaus)	500 kg/ha	vor dem Pflanzen max. 1 Anw. Pro Jahr	F	B3	NW 467, SE1201, SF499, SF535, SF536, SF537, SF539, SF553: Grundsätzlich ist ein Sicherheitsabstand von 25 m von der Grenze des behandelten Gewächshauses bzw. Feldes zu Bereichen in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten einzuhalten. Für die Dauer von 14 Tagen ab Beginn der Behandlung ist eine Sperrzone von 5 m um das Gewächshaus bzw. das Feld einzurichten, die mit Warnschildern zu kennzeichnen sind. SF 554: Es dürfen nur Einzelflächen bis 1,1 ha behandelt werden. Zwischen behandelten Flächen in ein Mindestabstand von 50 m einzuhalten.
Erdbeeren	einj.einkeimblättrige Unkräuter, einj. zweikeimblättrige Unkräuter, (Freiland und Gewächshaus)	300 kg/ha	vor dem Pflanzen max. 1 Anw. Pro Jahr	F		SS1201-1, SS2204, ST227, ST340, VA310, VA311, VA312
Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere Weiße Johannisbeere Stachelbeere Himbeere Brombeere Heidelbeer-Arten	Bodenpilze Insekten Wurzelgallenälchen wandernde Wurzelnematoden (Freiland)	500 kg/ha	vor dem Pflanzen max. 1 Anw. Pro Jahr	F	B3	NW 467, SE1201, SF499, SF535, SF536, SF537, SF539, SF553: Grundsätzlich ist ein Sicherheitsabstand von 25 m von der Grenze des behandelten Gewächshauses bzw. Feldes zu Bereichen in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten einzuhalten. Für die Dauer von 14 Tagen ab Beginn der Behandlung ist eine Sperrzone von 5 m um das Gewächshaus bzw. das Feld einzurichten, die mit Warnschildern zu kennzeichnen sind.
	einj.einkeimblättrige Unkräuter, einj. zweikeimblättrige Unkräuter, (Freiland)	300 kg/ha	vor dem Pflanzen max. 1 Anw. Pro Jahr	F		SF 554: Es dürfen nur Einzelflächen bis 1,1 ha behandelt werden. Zwischen behandelten Flächen in ein Mindestabstand von 50 m einzuhalten. SS1201-1, SS2204, ST227, ST340, VA310, VA311, VA312

Kulturen	Krankheit	Aufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit	Bienenschutz	Anwendungsbestimmungen
Obstkulturen Anzucht- und Topferde	Bodenpilze Insekten Wurzelgallenälchen wandernde Wurzelnematoden	0,25 kg/m ³	vor Kulturbeginn max. 1 Anw. pro Jahr	F	B3	NW 467, SE1201, SF499, SF535, SF536, SF537, SF539, SF553: Grundsätzlich ist ein Sicherheitsabstand von 25 m von der Grenze des behandelten Gewächshauses bzw. Feldes zu Bereichen in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten einzuhalten. Für die Dauer von 14 Tagen ab Beginn der Behandlung ist eine Sperrzone von 5 m um das Gewächshaus bzw. das Feld einzurichten, die mit Warnschildern zu kennzeichnen sind. SF 554, SS1201-1, SS2204, ST227, ST340, VA310, VA311, VA312
Obstkulturen Anzucht- und Topferde	einj.einkeimblättrige Unkräuter, einj. zweikeimblättrige Unkräuter,	0,3 kg/m ³	vor Kulturbeginn max. 1 Anw. pro Jahr	F		
		Anwendungstechnik: streuen sofortige Einarbeitung, anschließend mind. 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken				
		Anwendungstechnik: streuen sofortige Einarbeitung, anschließend mind. 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken				