

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Narben- dichte ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1), 2)}	Eignung für weidelgrasun- sichere Lagen ³⁾	D ⁴⁾	E ⁴⁾	Anbauggebiete					gelistet in den BQSM ⁵⁾
			Gesamt	1. Schnitt/e	weitere						6	7	8	10	11	
Arvicola	(T) FREU	04	(+)	(-)	+	0	(+)	++	D	E	■	■	■	■	■	✓
Ivana	BAYP	02	(+)	0	0	(+)	(-)	+++	D		■	□	■	■	■	✓
Lacerta	(T) EGB	98	(+)	(-)	+	(-)	+	+			■	■	■	■	■	✓
Lipresso	EGB	99	(+)	-	++	0	(-)	+ ⁹⁾			■	■	■	■	■	✓
Picaro	EGB	01	(+)	(+)	0	(+)	0	+			■	■	■	■	■	✓
Pionero	(T) EGB	02	(+)	0	(+)	0	(+)	++			□	□	■	■	■	✓
Salamandra	(T) INSE	06	(+)	(-)	+	0	+	(+) ⁹⁾		E	■	■	■	■	■	✓

[Anbauggebiete \(Karte\)](#)

- AG 6: sommertrockene Lagen
- AG 7: günstige Übergangslagen
- AG 8: Hügelländer
- AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
- AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

[Details zur Skala \(- - - bis + + +\)](#)

[Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen](#)

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
- Feldfutterbaumischungen
- Grünland- und Feldfutterbaumischungen
- keine Eignung
- D besonders auswinterungsgefährdete Lagen
- E günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Narben-dichte ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1), 2)}	Eignung für weidelgrasun-sichere Lagen ³⁾	D ⁴⁾	E ⁴⁾	Anbauggebiete					gelistet in den BQSM ⁵⁾
			Gesamt	1. Schnitt/e	weiter						6	7	8	10	11	
Alligator (T)	EGB	01	+	+	(+)	0	0	+	D	E	■	■	■	■	■	✓
Arabella	BAYP	94	(+)	(+)	(+)	0	(+)	(+)			□	□	□	□	□	✓
Bargala (T)	BAHO	01	(+)	(+)	(+)	0	(+)	(+)			□	□	■	□	■	✓
Barnauta (T)	BAHO	04	+	0	(+)	0	(+)	(+)			■	■	■	■	■	✓
Bree	INSE	00	(+)	(+)	(+)	(+)	0	+			□	□	■	■	■	✓
Missouri (T)	DLF	93	+	(+)	(+)	0	(+)	(+)			■	□	■	■	■	✓
Niata	INSE	02	(+)	(+)	(+)	(+)	0	+	D		□	□	■	■	■	✓
Premium	INSE	97	(+)	(+)	(+)	(+)	0	(+)			□	■	■	■	■	✓
Respect	INSE	93	(+)	(+)	(+)	0	0	(+)			□	□	□	□	□	✓
Trintella (T)	DLF	06	+	+	(+)	0	+	(+)		E	□	□	□	□	□	✓
Trivos (T)	EGB	05	+	(+)	+	0	+	(+)			□	□	□	□	□	✓

[Anbauggebiete \(Karte\)](#)

- AG 6: sommertrockene Lagen
- AG 7: günstige Übergangslagen
- AG 8: Hügelländer
- AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
- AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

[Details zur Skala \(- - - bis + + +\)](#)

[Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen](#)

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
- Feldfutterbaumischungen
- Grünland- und Feldfutterbaumischungen
- keine Eignung
- D besonders auswinterungsgefährdete Lagen
- E günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Narben- dichte ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1), 2)}	Eignung für weidelgrasun- sichere Lagen ³⁾	D ⁴⁾	E ⁴⁾	Anbauggebiete					gelistet in den BQSM ⁵⁾
			Gesamt	1. Schnitt/e	weitere						6	7	8	10	11	
Aberavon	STEI	05	+	+	0	0	(+)	(+)			■	■	■	■	■	✓
Akurat	(T) FREU	05	+	+	0	0	(+)	+			■	■	■	■	■	✓
Arusi	(T) INSE	05	(+)	0	+	0	+	(+)			■	■	■	■	■	✓
Barélan	(T) BAHO	05	+	+	(+)	0	+	+			■	■	■	■	■	✓
Barmaxima	(T) BAHO	06	+	(+)	(+)	0	(+)	(+)			■	■	■	■	■	✓
Elgon	(T) DLF	96	(+)	+	(+)	(-)	(+)	+			■	■	■	■	■	✓
Feeder	INSE	91	(+)	+	0	0	(-)	+			■	■	■	■	■	✓
Forza	(T) DLF	03	(+)	(+)	(+)	0	0	(+)			■	■	■	■	■	✓
Foxtrot	DLF	96	(+)	+	0	0	(+)	+			■	■	■	■	■	✓
Herbal	(T) RAGD	03	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)			■	■	■	■	■	✓
Herbie	DLF	95	(+)	+	0	0	0	+			■	■	■	■	■	✓
Kabota	INSE	98	(+)	0	(+)	(+)	0	+	D		■	■	■	■	■	✓
Montando	(T) DLF	95	(+)	0	(+)	0	0	+			■	■	■	■	■	✓
Montova	(T) DLF	06	+	(+)	+	0	(+)	(+)		E	■	■	■	■	■	✓
Navarra	(T) DLF	97	(+)	(+)	0	(+)	(+)	++	D		■	■	■	■	■	✓
Recolta	INSE	92	(+)	0	(+)	(+)	(-)	+			■	■	■	■	■	✓
Sponsor	INSE	97	(+)	(+)	0	0	0	+			■	■	■	■	■	✓
Stratos	INSE	93	(+)	(+)	0	(+)	(-)	+			■	■	■	■	■	✓
Twymax	(T) NPZ	05	+	+	0	0	(+)	0			■	■	■	■	■	✓
Vesuve	(T) GRLO	05	+	++	0	0	(+)	(+)		E	■	■	■	■	■	✓

[Anbaugebiete \(Karte\)](#)

- AG 6: sommertrockene Lagen
- AG 7: günstige Übergangslagen
- AG 8: Hügelländer
- AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
- AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

[Details zur Skala \(- - - bis + + +\)](#)

[Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen](#)

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
- Feldfutterbaumischungen
- Grünland- und Feldfutterbaumischungen
- keine Eignung
- D** besonders auswinterungsgefährdete Lagen
- E** günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial


Anmerkungen zu den Tabellen

- 1) Einstufung nach "Beschreibender Sortenliste - Futtergräser, Esparsette, Klee, Luzerne" Ausgabe 2009; Hrsg: Bundes-sortenamt; erstellt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der Länder
 - 2) Gegenläufig zu Anfälligkeit gegen.....
 - 3) Maß für die regionale Ausdauer und Winterhärteleistung in Bayern
 - 4) Mit **D** wird jeweils die diploide bzw. tetraploide Sorte eines Reifegruppensegmentes mit der höchsten Ausdauer gekennzeichnet (besonders im Grünland wichtig), mit **E** gekennzeichnete Sorten hingegen überdurchschnittliche Ertragsleistung (wichtig z.B. im Feldfutterbau)
 - 5) Bayerische Qualitätssaatgutmischungen
 - 6) Geringere Anfälligkeit für Bakterienwelke als vergleichbare zugelassene Sorten
 - 7) Unter kontrollierten Bedingungen geringerer Befall mit Stängelnematoden (*Ditylenchus dipsaci*) als bei vergleichbaren mitgeprüften Sorten
 - 8) begrenzt auf Wiesenmischungen
 - 9) vorläufige Empfehlung
- (T) tetraploide Sorte

verwendete „Kreuzchen-Skala“ und die Bedeutung ihrer Abstufungen

- | | |
|----------|--|
| +++ | sehr gut, sehr spät, sehr stark, sehr lang |
| ++ | gut bis sehr gut, spät bis sehr spät, stark bis sehr stark, lang bis sehr lang |
| + | gut, spät, stark, lang |
| (+) | mittel bis gut, mittel bis spät, mittel bis stark, mittel bis lang |
| 0 | mittel |
| (-) | mittel bis schlecht, früh bis mittel, gering bis mittel, kurz bis mittel |
| - | schlecht, früh, gering, kurz |
| -- | schlecht bis sehr schlecht, sehr früh bis früh, sehr gering bis gering, sehr kurz bis kurz |
| --- | sehr schlecht, sehr früh, fehlend bis sehr gering, sehr kurz |
| * | keine oder zu wenig Daten vorhanden |

Karte der Anbaubereiche



Bezeichnung Anbaubereiche

- ⊖ 6: sommertrockene Lage
- 7: günstige Übergangslagen
- ⊕ 8: Hügelländer
- ⊗ 9: Mittelgebirgslagen West
- 10: Mittelgebirgslagen Ost
- 11: Voralpengebiet
- ⊗ 12: Alpengebiet

Züchterabkürzungen mit Namen

Abkürzung	Züchter	Land
ANDR	= Andrae Georg GmbH, Nürnberg	D
BAHO	= Barenbrug Holding B.V., Oosterhout	NL
BAYP	= Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft, München	D
BayWa	= BayWa Aktiengesellschaft, München	D
DLF	= Dansk Planteforaedling A/S, Store Heddinge	DK
EGB	= Euro Grass Breeding GmbH & Co.KG, Lippstadt	D
FL.DES.	= Florimond Desprez, Cappelle en Pévèle	F
FREU	= Feldsaaten Freudenberger GmbH, Krefeld	D
GRLO	= Graines Loras, La Tour de Salvagny	F
ILVO	= ILVO-Plant-Toegepaste Genetica in Veredeling	B
INRA	= Agri Obtentions S.A., Guyancourt Cedex	F
INSE	= Innoseeds, Auestraße 5, Adelheidsdorf	D
NPZ	= Norddeutsche Pflanzenzucht KG, Holtsee	D
PETR	= Petersen Asmus, Lundsgaard	D
RAGD	= Dr. Thomas Mellinger in Fa (RAGT) Saaten Deutschland GmbH	F
RUD	= Rudloff, Bad Schwartau	D
R2n	= R2n S.A.S	F
RZG	= Raiffeisen Zentralgenossenschaft eG, Karlsruhe	D
SCHM	= Schmidt-Gambazza Hedwig, Miremont	F
STEI	= Saatzucht Steinach, Steinach	D