Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Zugelassene Fungizide in Erdbeeren (Stand März 2024)

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwand-menge	Anwendungs-zeitpunkt	Warte-zeit	Anwendungs-bestimmungen/ Auflagen	Bienen-schutz	Zulassung bis
Bigalo (Boscalid + Pyraclostrobin)	Botrytis cinerea (Freiland und Gewächshaus)	1,8 kg/ha	ab erste Blüten im Ballonstadium max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr im Abstand von 7-10 Tagen	3 Tage	NW 470,NW 605-1: (50% 5m, 75% 5m, 90% 5m) NW 606: 5m SF276-EE SF278-56 BE SS110-1 VA264, VA279 WW7091, WW 750	B 4	31.07.24
	Colletotrichum Echter Mehltau (Freiland und Gewächshaus)	1,8 kg/ha	bei Infektionsgefahr max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr im Abstand von 7-10 Tagen	3 Tage	NW 470,NW 605-1: (50% 5m, 75% 5m, 90% 5m) NW 606: 5m SF276-EE SF278-56 BE SS110-1 VA264, VA279 WW7091, WW 750		
Botector (Aureobasidium pullulans) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Botrytis cinerea (Freiland und Gewächshaus)	1 kg/ha	ab erste Blüten- anlagen sichtbar bis zweite Pflücke max. 6 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 642-1	B 4	31.12.25
Cobalt (Boscalid + Pyraclostrobin)	Botrytis cinerea Colletotrichum Echter Mehltau (Freiland und Gewächshaus)	1,8 kg/ha	ab Beginn Blüte max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 470 NW 608-1: 5 m SF276-EEBE SF278-35BE SS110-1 WW7091, WW750	B 4	31.07.24
Kenja (Isofetamid)	Botrytis cinerea (Freiland)	1,2 l/ha	von erste Blüte offen bis Hauptpflücke max. 2 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 470 SS110-1,SS2101, SF275-EEBE, NW 642-1 WW7091, WW 750	B 4	15.09.27
	Botrytis cinerea (Gewächshaus)	1,2 l/ha	von erste Blüte offen bis Hauptpflücke max. 2 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 470 SS110-1,SS2101, SS2202 SF275-EEBE, WW7091, WW 750		
Luna Sensation (Fluopyram + Trifloxystrobin)	Botrytis cinerea (Freiland)	0,8 l/ha	Beginn Blüte bis abgehende Blüte max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 608-1: 10 m SF1891, SS110-1, SS2101, SS2202 WW7091, WW 750	B 4	31.12.24
	Colletotrichum nur zur Befallsminderung (Freiland)	0,8 l/ha	Beginn Blüte bis abgehende Blüte max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 608-1: 10 m SF1891, SS110-1, SS2101, SS2202 WW7091, WW 750		

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwand-menge	Anwendungs-zeitpunkt	Warte-zeit	Anwendungs-bestimmungen/ Auflagen	Bienen-schutz	Zulassung bis
Luna Sensation (Fluopyram + Trifloxystrobin)	Echter Mehltau (Freiland)	0,8 l/ha	Beginn Blüte bis abgehende Blüte max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 608-1: 10 m SF1891, SS110-1, SS2101, SS2202 WW7091, WW 750	B 4	31.12.24
Malvin WG (Captan) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Colletotrichum Botrytis cinerea (Freiland)	1,8 kg/ha	von erste Blüte offen bis zur Vollblüte max. 2 Anw. pro Jahr	14 Tage	NW 468, NW 604 NW 608-1: 5 m	B 4	15.11.25
	Colletotrichum Botrytis cinerea (Gewächshaus)	1,5 kg/ha	von erste Blüte offen bis zur Vollblüte max. 2 Anw. pro Jahr	21 Tage	NW 468, NW 604 NZ 113, SF276-EEOS SF277-VEOS WW704, WW750		
PIRIM (Pyrimethanil)	Botrytis cinerea (Freiland)	2 l/ha	ab erste Blüten im Ballonstadium max. 2 Anw. pro Jahr	3 Tage	NG412, NW470 NW 609-1: 5m SF276-7BE SS110-1, SS2101	B 4	30.04.24
Prolectus (Fenpyrazamine)	Botrytis cinerea (Gewächshaus)	1,2 kg/ha	von Beginn der Blüte bis Hauptpflücke max. 3 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 468 WW7091, WW 750	B 4	31.12.26
Pyrus (Pyrimethanil)	Botrytis cinerea (Freiland und Gewächshaus)	2,5 l/ha	ab erste Blüten offen max. 1 Anw. pro Jahr	3 Tage	NW 468 NW 608-1: 5 m WW7091, WW 750	B 4	30.04.24
Romeo (Cerevisane)	Botrytis cinerea (Gewächshaus)	0,75 kg/ha	von 2. Laubblatt ist entfaltet bis Zweite Pflücke max. 8 Anw. pro Jahr	1 Tag	ST1102	B 4	23.04.31
(Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Botrytis cinerea (Freiland)	0,75 kg/ha	von 2. Laubblatt ist entfaltet bis Zweite Pflücke max. 8 Anw. pro Jahr	1 Tag	NT140, NW 642-1 ST1102		
Scala (Pyrimethanil)	Botrytis cinerea (Freiland)	2,5 l/ha	Beginn, Mitte oder Ende Blüte max. 1 Anw. pro Jahr	7 Tage	NW 468, NW 604, NG 402 NW 608:5 m WW 704, WW750	B 4	15.03.26
Serenade ASO (Bacillus amyloliquefaciens)	Botrytis cinerea (Freiland) nur zur Befallsminderung und bei schwachem Befallsdruck	8 l/ha	von erste Blüten-anlagen am Rosettengrund sichtbar bis zweite Pflücke max. 6 Anw. pro Jahr im Abstand von 5 Tagen	F	NW 642-1 SS110-1,SS2101,	B 4	15.08.25
	Botrytis cinerea (Gewächshaus) nur zur Befallsminderung und bei schwachem Befallsdruck	8 l/ha	ab erste Blüte offen bis zweite Pflücke max. 6 Anw. pro Jahr im Abstand von 5 Tagen	F	SS110-1,SS2101, WW 764		

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwand-menge	Anwendungs-zeitpunkt	Warte-zeit	Anwendungs-bestimmungen/ Auflagen	Bienen-schutz	Zulassung bis
Serifel (Bacillus amyloliquefaciens)	Botrytis cinerea (Gewächshaus) nur zur Befallsminderung und bei schwachem Befallsdruck	0,5 kg/ha	von erste Blüten-anlagen am Rosettengrund sichtbar bis zweite Pflücke max. 6 Anw. pro Jahr im Abstand von 5 Tagen	1 Tag	SS110-1,SS2101, ST1102	B 4	16.09.27
Signum (Pyraclostrobin + Boscalid)	Botrytis cinerea (Freiland)	1,8 kg/ha	vor der Blüte bis Blühbeginn max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 604 NW 608: 5m, WW7091, WW 750	B 4	15.09.26
(Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18a)	Botrytis cinerea (Gewächshaus)	1,8 kg/ha	ab Blüte frühes Ballonstadium (BBCH 58) max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 604 WW7091, WW 750		
(Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18a)	Gnomonia fructicola (Freiland und Gewächshaus)	1,8 kg/ha	ab Achse des Blütenstandes beginnt sich zu strecken (BBCH 56) max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 604 NW 608: 5m, WW7091, WW 750		
(Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18a)	Rot- und Weiß-fleckenkrankheit (Freiland und Gewächshaus)	1,8 kg/ha	ab 3.Laubblatt ist entfaltet (BBCH 13) max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 604 NW 608: 5m, WW7091, WW 750		
Switch (Fludioxonil+Cyprodinil)	Botrytis cinerea (Freiland und Gewächshaus)	1 kg/ha	Beginn, Mitte und Ende der Blüte max. 3 Anw. pro Jahr	7 Tage	NT 101, NW 468, NW608-1: 5m NW 701 WW7091, WW 750	B 4	31.12.26
TAEGRO (Bacillus amyloliquefaciens)	Botrytis cinerea (Freiland) nur zur Befallsminderung	0,37 kg/ha	von Schieben des ersten Laubblattes bis Absterben der alten Laubblätter max. 10 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 642-1 SS1101-1 SS2101 ST1102	B 4	01.06.33
	Botrytis cinerea (Gewächshaus) nur zur Befallsminderung	370 g/ha	von erstes Laub-blatt aus der Koleoptile ausge-treten bis Blattfall max. 12 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	SS1101-1 SS2101 ST1102		
Teldor (Fenhexamid) Neuzulassung Zulassungs-Nr: 00B035-00	Botrytis cinerea (Freiland)	1,5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von erste Blüte offen bis zweite Pflücke max. 4 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 470 NW 642-1 SF275-EEBE SF276-14BE SS110-1, SS2101 WW7091, WW750	B 4	31.12.31
	Botrytis cinerea (Gewächshaus)	1,5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von erste Blüte offen bis zweite Pflücke max. 4 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 470 SF275-EEBE SF276-14BE SS110-1, SS2101 WW7091, WW750		

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwand-menge	Anwendungs-zeitpunkt	Warte-zeit	Anwendungs-bestimmungen/ Auflagen	Bienen-schutz	Zulassung bis
VitiSan (Kaliumhydrogen-carbonat) Neuzulassung Zulassungs-Nr: 027593-00	Botrytis cinerea (Freiland) nur zur Befalls-minderung	5 kg/ha	von abgehende Blüte bis zweite Pflücke max. 4 Anw.pro Jahr, max 6 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 642-1 SS206	B 4	31.10.37
VitiSan (Kaliumhydrogen-carbonat) Zulassungs-Nr: 007593-00*	*Botrytis cinerea (Freiland) nur zur Befalls-minderung*	*5 kg/ha*	*von abgehende Blüte bis zweite Pflücke max. 4 Anw.pro Jahr, max 6 Anw. pro Kultur und Jahr*	*1 Tag*	*NW 642-1* SS206	*B 4*	*30.09.23*
VitiSan (Kaliumhydrogen-carbonat) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51) Neuzulassung Zulassungs-Nr: 027593-00	Botrytis cinerea (Freiland) nur zur Befalls-minderung	5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von Blüte Ballon-stadium bis zweite Pflücke max. 6 Anw. max. 6 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 642-1 SS206	B 4	31.10.37
VitiSan (Kaliumhydrogen-carbonat) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51) Zulassungs-Nr: 007593-00*	*Botrytis cinerea (Freiland und Gewächshaus)*	*5 kg/ha*	*bei Infektionsgefahr von Blüte Ballon-stadium bis zweite Pflücke max. 6 Anw. max. 6 Anw. pro Kultur und Jahr*	*1 Tag*	*NW 642-1* SS206	*B 4*	*30.09.23*
Ortiva (Azoxystrobin) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18a)	Colletotrichum Fruchtfäule (Freiland und Gewächshaus)	1 l/ha	ab Vorblüte bis abgehende Blüte max. 2 Anw. pro Jahr	3 Tage	NW 468, NW 604 NW 608: 5 m NW 701 WW 750	B 4	30.06.24
Azofin Plus (Azoxystrobin)	Colletotrichum Echter Mehltau (Gewächshaus)	1 l/ha	von erste Blüten-anlagen am Rosettengrund sichtbar bis zweite Pflücke max. 3 Anw. pro Jahr	3 Tage	NW 470 SS110-1, SS2101, WW 750, WW764	B 4	31.12.25
Screen, LS AZOXY (Azoxystrobin)	Colletotrichum Echter Mehltau (Freiland und Gewächshaus)	1 l/ha	von erste Blüten-anlagen am Rosettengrund sichtbar bis zweite Pflücke max. 3 Anw. pro Jahr	3 Tage	NW 468, NW 605-1: (50% 5 m, 75% 5 m, 90% *), NW 606:5m, NW706, NW800 WW 750, WW764 SS110,SS206, SS2101,	B 4	31.12.25
Zeus (Azoxystrobin)	Colletotrichum Echter Mehltau (Freiland und Gewächshaus)	1 l/ha	von erste Blüten-anlagen am Rosettengrund sichtbar bis zweite Pflücke max. 3 Anw. pro Jahr	3 Tage	NW470 NW 605-1: (50% 5 m, 75% 5 m, 90% *) NW 606: 5m. NW706, NW800 SS110-1, SS2101, WW750	B 4	31.12.25

*Die alte Zulassung von Vitisan (Zulassungs-Nr. 007593-00) endete am 30.09.2023 .Die Abverkaufsfrist endet am 30.03.2024.
Für Restmengen gilt eine Aufbrauchfrist bis zum 30.03.2025.

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwand-menge	Anwendungs-zeitpunkt	Warte-zeit	Anwendungs-bestimmungen/ Auflagen	Bienen-schutz	Zulassung bis
AQ 10 WG (Ampelomyces quisqualis)	Echter Mehltau (Gewächshaus) nur zur Befalls-minderung	70 g/ha	bei Befallsbeginn Reihenbehandlung max. 12 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	SS110-1, SS2101, WH 915	B 4	01.08.34
Dagonis (Difenoconazol + Fluxapyroxad)	Echter Mehltau (Freiland und Gewächshaus)	0,6 l/ha	bei Befallsbeginn von erste Blüte offen bis Zweite Pflücke max. 3 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 468, SS110-1, SS2101, SS530, SS610 NW 642-1, WW7091, WW762	B 4	31.12.24
Flint (Trifloxystrobin) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18a)	Echter Mehltau (Freiland)	0,3 kg/ha	bei Befallsbeginn max. 3 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 604 NW 608: 5 m WW 7091	B 4	30.06.24
	Echter Mehltau (Gewächshaus)	0,3 kg/ha	bei Befallsbeginn max. 3 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 604		
	Rot- und Weiß-fleckenkrankheit (Freiland)	0,3 kg/ha	bei Befallsbeginn max. 3 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 604 NW 608: 5 m WW 7091		
	Rot- und Weiß-fleckenkrankheit (Gewächshaus)	0,3 kg/ha	bei Befallsbeginn max. 3 Anw. pro Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NW 604		
Fyto Save (COS-OGA) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Echter Mehltau (Freiland)	2,5 l/ha	bei Infektionsgefahr max. 8 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 642-1	B 4	22.04.31
	Echter Mehltau (Gewächshaus)	2,5 l/ha	bei Infektionsgefahr max. 8 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag			
Kumar (Kaliumhydrogen-carbonat) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18a)	Echter Mehltau (Freiland und Gewächshaus)	3 kg/ha	bei Infektionsgefahr von Schieben des ersten Laubblattes bis Absterben der alten Laubblätter max. 8 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 642-1	B 4	31.08.24
Kumulus WG, (Schwefel) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Echter Mehltau (Freiland und Gewächshaus)	5 kg/ha	bis kurz vor der Blüte und nach der Ernte max. 6 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 642-1	B 4	31.12.24
Limocide (Orangenöl)	Echter Mehltau (Gewächshaus)	3 l/ha	bei Infektionsgefahr von 2.Laubblatt ist entfaltet bis Zweite Pflücke max. 6 Anw. je Kultur und Jahr	1 Tag	NW470, SE110 SF275-EEBE SF276-14BE SS110-1, SS2101	B 4	31.07.25
Nimrod EC (Bupirimat)	Echter Mehltau (Freiland und Gewächshaus) GWH: nur für Kulturverfahren auf versiegelten Flächen als Substratkultur	1 l/ha	bei Befallsbeginn max. 4 Anw. je Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468 NW 642-1 SE110. SS110-1, SS2101, SS610 WW762, WW764	B 4	31.05.25

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwand-menge	Anwendungs-zeitpunkt	Warte-zeit	Anwendungs-bestimmungen/ Auflagen	Bienen-schutz	Zulassung bis
ROUBAIX (Azoxystrobin)	Echter Mehltau (Freiland)	1 l/ha	bei Infektionsgefahr von erste Blüten-anlagen am Rosettengrund sichtbar bis zweite Pflücke max. 3 Anw. je Kultur und Jahr	3 Tage	NW470 NW 605-1: (50% 5 m, 75% 5 m, 90% *) NW 606: 5m. NW706, NW800 SS110-1, SS2101, WW750, WW764	B 4	31.05.25
	Echter Mehltau (Gewächshaus)	1 l/ha	bei Infektionsgefahr von erste Blüten-anlagen am Rosettengrund sichtbar bis zweite Pflücke max. 3 Anw. je Kultur und Jahr	3 Tage	NW470 SS110-1, SS2101, WW750, WW764		
Talius, Talendo (Proquinazid) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Echter Mehltau (Freiland)	0,375 l/ha	vor der Ernte bei Befallsbeginn max. 2 Anw. je Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468 NW 608-1: 5 m	B 4	31.07.24
	Echter Mehltau (Freiland)	0,375 l/ha	nach der Ernte bei Befallsbeginn max. 2 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 468 NW 608-1: 5 m		
	Echter Mehltau (Gewächshaus)	0,375 l/ha	bis Früchte beginnen sich sortentypisch auszufärben max. 2 Anw. je Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468 SF275-21BE		
	Echter Mehltau (Gewächshaus)	0,375 l/ha	nach der Ernte bei Befallsbeginn max. 2 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 468 SF275-21BE		
Topas (Penconazol) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	Echter Mehltau (Freiland)	0,5 l/ha	bei Befallsbeginn max. 4 Anw. je Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468 NW 642-1	B 4	31.12.26
	Echter Mehltau (Gewächshaus)	0,5 l/ha	bei Befallsbeginn max. 4 Anw. je Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468		
VitiSan (Kaliumhydrogen-carbonat) Neuzulassung Zulassungs-Nr: 027593-00	Echter Mehltau (Freiland) nur zur Befallsminderung	5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von Schieben des ersten Laubblattes bis Früchte beginnen sich sortentypisch auszufärben max. 6 Anw. je Kultur und Jahr	1 Tag	NW 642-1 SS206	B 4	31.10.37
VitiSan (Kaliumhydrogen-carbonat) Zulassungs-Nr: 007593-00*	*Echter Mehltau (Freiland) nur zur Befallsminderung*	*5 kg/ha*	*bei Infektionsgefahr von Schieben des ersten Laubblattes bis Früchte beginnen sich sortentypisch auszufärben max. 6 Anw. je Kultur und Jahr*	*1 Tag*	*NW 642-1* SS206	*B 4*	*30.09.23*

*Die alte Zulassung von Vitisan (Zulassungs-Nr. 007593-00) endete am 30.09.2023 .Die Abverkaufsfrist endet am 30.03.2024.
Für Restmengen gilt eine Aufbrauchfrist bis zum 30.03.2025.

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwand-menge	Anwendungs-zeitpunkt	Warte-zeit	Anwendungs-bestimmungen/ Auflagen	Bienen-schutz	Zulassung bis
Aliette WG (Fosetyl)	Rhizomfäule (Phytophthora cactorum) (Freiland)	5 kg in 1000 l Wasser	bei Befallsgefahr vor dem Pflanzen tauchen max. 1 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 468, NW 604	B 4	15.03.26
	Rote Wurzelfäule (Phytophthora fragariae) (Freiland)	50 kg/ha in 5000 l Wasser	bei Befallsgefahr ab Ende September mit Dreidüsengabel spritzen max. 1 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 468, NW 604 NT 112 NW 608: 5 m		
Beltanol (8-Hydroxychinolin)	bakterielle und pilzliche Schaderreger bodenbürtiger Befall (Gewächshaus)	4 l/ha	nach dem Pflanzen und vor der Blüte max. 2 Anw. pro Jahr Anwendung: Tröpfchenbewässerung	F	NW 468, SE110, SF184, SS1201-1, SS2101, SS610 WW760 NZ113	B 3	31.12.24
Flowbrix (Kupferoxychlorid) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Colletrotichum Weißfleckenkrankheit (Freiland)	2,6 l/ha	von 3. Laubblatt ist entfaltet bis Früchte beginnen sich sortentypisch auszufärben max. 3 Anw. je Kultur und Jahr	3 Tage	NW 468, NT 620-2, NW 608-1: 5 m, SF276-EEBE, SS110-1, SS2101, SS2202	B 4	30.06.24
Polyversum (Pythium oligandrum M1) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Rhizomfäule (Phytophthora cactorum) Rote Wurzelfäule (Phytophthora fragariae)	0,2 kg/ha	vor dem Pflanzen gießen in dieser Anw. max. 1 Anw., max. 1 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 642-1	B 4	30.04.24
	nur zur Befallsminderung Jungpflanzenanzucht (Freiland)	0,2 kg/ha	nach dem Pflanzen gießen in dieser Anw. max. 2 Anw., max. 2 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 642-1		
Score, MAVITA 250 EC (Difenoconazol) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Gnomonia fructicola (Freiland)	0,4 l/ha	bei Befallsbeginn ab Strecken des Blütenstandes in dieser Anw. max. 1 Anw., max. 2 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 468, NW 604 NW 608: 5m WW7091, WW750 SE110, SS110-1, SS2101, SS610	B 4	31.12.24
	Rot- und Weiß-fleckenkrankheit (Freiland)	0,4 l/ha	bei Befallsbeginn nach der Ernte ab BBCH 91 (Bildung von Seitentrieben) max. 2 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 468, NW 604 NW 608: 5m SE110, SS110-1, SS2101, SS610 Auflage:VV 600 (Erntegut nicht verzehren)		
	Rot- und Weiß-fleckenkrankheit im Pflanzjahr (Freiland)	0,4 l/ha	bei Befallsbeginn ab BBCH 91 (Bildung von Seitentrieben) max. 2 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 468, NW 604 NW 608: 5m SE110, SS110-1, SS2101, SS610 Auflage:VV 600 WW7091, WW750		
	Rot- und Weiß-fleckenkrankheit in Beständen zur Pflanzguterzeugung (Freiland)	0,4 l/ha	bei Befallsbeginn ab BBCH 91 (Bildung von Seitentrieben) max. 2 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 468, NW 604 NW 608: 5m SE110, SS110-1, SS2101, SS610 Auflage:VV 600 WW7091, WW750		