

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	(Arrat) + FHS	07 09	NT102	F	0,2 kg + 1,0 l Dash EC	Nach dem Auflaufen des Maises gegen Unkräuter. Als Ergänzungspartner für Gräserherbizide geeignet.
	[Aspect]	08 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT102 NG362	F	1,5 l	Nach dem Auflaufen des Maises von BBCH 11-15 gegen Unkräuter ausgenommen Winden-Knöterich und Schwarzer Nachtschatten. Nebenwirkung gegen Hirse-Arten und Jährige Rispe. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Callisto, ...u.a.	07 08 09	NT108	F	1,0 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-18 gegen Unkräuter.
	Callisto P Pack = Callisto + Peak	07 09	NW 5(*/*/*)m NW701, NT108	60	1,0 l + 20 g	Im Nachauflauf von BBCH 12-17 gegen Unkräuter.
	Callisto P Flexx Pack = Callisto + Merlin Flexx + Peak	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT108, NG368	60	0,75 l + 0,3 l + 18 g	Im Nachauflauf von BBCH 11-13 gegen Unkräuter.
	Casper		NW 5(*/*/*)m NT102	F	0,3 kg	Im Nachauflauf von BBCH 12-18 gegen Unkräuter und Winden-Arten. Ergänzung mit Netzmittel, z.B. Adigor, fördert die Wirkung.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Diniro + Adigor	07 09	NW 5(5/*/*)m NT109, NW800, NG326-1,327	F	0,4 kg + 1,2 l	In Nachauflauf BBCH 12-18 gegen Jährige Rispe und Unkräuter. Ackerfuchsschwanz und Schadhirsen werden mit erfasst. Tankmischung mit Bodenpartner möglich.
	Effigo		NT101	F	0,35 l	Nach dem Auflaufen ab BBCH 11 gegen Kamille-Arten, Schwarzer Nachtschatten und Franzosenkraut. Nebenwirkung gegen Topinambur, Huflattich und Durchwuchskartoffeln.
	Harmony SX, Lupus SX	09	NT101	F	15 g	Im Nachauflauf bis BBCH 16 gegen Unkräuter. Gegen Ampferarten im Rosettenstadium einsetzen. Tankmischungshinweise und Sortenliste beachten. Anwendung in Mischung mit einem geeigneten Netzmittel empfohlen.
	Merlin Flexx	08	NW 10(5/5/*)m NT103-1, NG368	F	0,4 l	Im Nachauflauf von BBCH 11-13 gegen Unkräuter bis zum zweiten Laubblattpaar.
	Merlin Duo	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT102-1, VA277, NG362,368,404	F	1,5 l	Im Nachauflauf von BBCH 11-13 gegen Unkräuter. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Onyx	02	NW -(-/-/20)m	F	1,5 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-18 gegen Unkräuter. Kombination mit Triketon-Präparaten empfehlenswert.
		07	NG405, NT101			
	08					
	09	NW -(-/-/10)m		2x 0,75 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-18 als Splittingbehandlung im Abstand von 7 Tagen gegen Unkräuter. Kombination mit Triketon-Präparaten empfehlenswert.	
	Peak		NW 5(*/*/*)m NW701, NT102	60	20 g	Im Nachauflauf von BBCH 12-17 gegen Unkräuter. Speziell als Ergänzungspartner gegen Winden, Ampfer und Knöteriche geeignet.
Spectrum Gold		07 09	NW 10(5/5/*) NW706, NT103 NG362	F	2,0 l	Im Nachauflauf gegen Unkräuter. Nebenwirkung gegen Hirse-Arten und Jährige Rispe. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
Stardust Pack = Starship 100 SC + Tandus		07 08 09	NT102	F	1,0 + 0,33 l	Im Nachauflauf von BBCH 13-17 gegen Unkräuter. Als Tankmischpartner zu gräseraktiven Behandlungen geeignet, Terbutylazin-frei.
Starship 100 SC		08		F	1,0 l	Im Nachauflauf von BBCH 11-18 gegen Unkräuter. Als Tankmischpartner zu gräseraktiven Behandlungen geeignet.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Stomp Aqua, ...u.a.	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW705 NT112,145,146,170	60	3,5 l	Im Nachauflaufen des Mais gegen Unkräuter, außer Kamille-Arten und Klettenlabkraut. Tankmischkomponente. Auch in Zuckermais zugelassen. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Tandus, ...u.a.	07 08 09	NT102	F	1,0 l	Im Nachauflauf von BBCH 13-17 gegen Unkräuter.
	Valentia	09	NT103	F	1,8 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-16 gegen Unkräuter. Als Tankmischpartner in reduzierter Aufwandmenge geeignet.
Winden-Arten	Mais Banvel WG		NT103	60	0,35 - 0,5 kg	Im Nachauflauf des Maises bis zum 6-Blattstadium gegen Winden-Arten, Gänsefuß-Arten und Winden-Knöterich. Möglichst keine Anwendungen unter 10 °C. Splitting (2x 0,25 kg/ha) sinnvoll, möglichst ab 4-Blattstadium der Unkräuter im Abstand von 10 Tagen. Nebenwirkung gegen Wurzelunkräuter wie Ampfer, Landwasserknöterich.
	Tomigan 200	05 07 08 09	NT101	F	0,9 l	Im Nachauflauf des Maises gegen Winden-Arten. Spätbehandlung ab BBCH 17 als Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Distel-Arten	Effigo		NT101	F	0,35 l	Nach dem Auflaufen ab BBCH 11 gegen Ackerkratz- und Gänsedistel.
	Lontrel 600, ...u.a.		NT101	F	0,2 l	Nach dem Auflaufen gegen Acker-Kratzdistel bei 15-25 cm Unkrauthöhe.
Unkräuter und Ungräser	Adengo	08 09	NW 5(*/*/*)m im VA: NW706, im NA: NW701, NT103	F	0,33 l	Vom Voraufbau bis frühen Nachaufbau in BBCH 13 gegen Samenungräser und -unkräuter. Hangaufgabe je nach Einsatztermin. Breitbandherbizid für den sehr frühen Einsatz. Als Solo-Behandlung oft ausreichend. Für TBA-freie Anwendung und als Anti-Resistenzbaustein geeignet. Kein Einsatz auf sehr humosen oder auch humusarmen Standorten.
	Arigo	07 08 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT109, NG200,326-1,327 VA275	F	0,25 kg + 0,3 l FHS	Im Nachaufbau BBCH 12-18 gegen Ungräser und Unkräuter. Überwiegende Blattwirkung. Sortenverträglichkeit beachten. Maximal 45 g/ha Nicosulfuron und keine Anwendung eines Nicosulfuron-haltigen Herbizides auf derselben Fläche im Folgejahr. Kein Einsatz auf an Gewässer angrenzende Flächen!
	Botiga	05 07 08 09	NW 5(*/*/*)m NW800, NT103	F	1,0 l	Im Nachaufbau von BBCH 12-18 gegen Hühnerhirse und Unkräuter. Bei Bedarf Kombination mit Bodenpartner empfehlenswert. Kein Nachbau von Rüben.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	Calaris	07 08 09	NW 5(*/*/*)m NW701, NG362 NT103, VA276	F	1,5 l	Im Nachauflauf BBCH 12-16 gegen Hühnerhirse, Fingerhirse und Unkräuter. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbuthylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Elumis P Pack = Elumis + Peak	07 08 09	NW 5(5/*/*)m NG200,326-1,327, NW706, NT103	F	1,25 l + 20 g	Im Nachauflauf BBCH 12-17 gegen Ungräser und Unkräuter. Überwiegende Blattwirkung. Maximal 45 g/ha Nicosulfuron und keine Anwendung eines Nicosulfuron-haltigen Herbizides auf derselben Fläche im Folgejahr. Kein Einsatz auf an Gewässer angrenzende Flächen!
	Elumis Triumph Pack = Elumis + Successor T	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103, NG362	F	1,25 l + 2,5 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-14 gegen Unkräuter und Ungräser. Keine Anwendung eines Nicosulfuron-haltigen Herbizides auf derselben Fläche im Folgejahr. Kein Einsatz auf an Gewässer angrenzende Flächen!
	Iseran	07 08 09	NW 5(*/*/*)m NT109-1,127,149	F	0,66 l	Im Nachauflauf von BBCH 10-14 des Maises gegen Hühnerhirse und Unkräuter. Zur Verbesserung der Wirkungssicherheit Tankmischung mit Rimsulfuron (z.B. Plaza) sinnvoll.
	Kideka	05 07 08 09	NW 5(*/*/*)m NW705, NT108	F	1,5 l	In Nachauflauf BBCH 12-18 gegen Hühnerhirse und Unkräuter. Ergänzung mit Bodenherbizid sinnvoll. Auch in Zuckermais zugelassen.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	Laudis	07 08 09	NW 5(5/*/*)m NT103	F	2,25 l	Im Nachauflauf BBCH 12-18 gegen Ungräser und Unkräuter. Geeignet zur Kombination mit Bodenherbiziden.
	Laudis Aspect Pack = Laudis + [Aspect]	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT103 NG362	F	2,0 + 1,5 l	Im Nachauflauf BBCH 12-15 gegen Ungräser und Unkräuter. Blatt- und Bodenwirkung. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Laudis Plus Pack = Laudis + Delion	07 08 09	NW 5(5/*/*)m NT103	F	2,0 + 0,4 l	Im Nachauflauf BBCH 12-16 gegen Ungräser und Unkräuter. Zusatzwirkung gegen Wurzelunkräuter. Einsatzbedingungen von Dicamba beachten.
	MaisTer power	05 08 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NW800, NT109	F	1,0 l	Im Nachauflauf BBCH 12-16 gegen Ungräser und Unkräuter. Sortenverträglichkeit beachten. Kombination mit Bodenherbizid sinnvoll.
	MaisTer power Aspect Pack = MaisTer power + [Aspect]	05 08 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT109 NG362	F	1,0 + 1,0 l	Im Nachauflauf BBCH 12-15 gegen Ungräser und Unkräuter. Sortenverträglichkeit beachten. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	MaisTer power flexx = MaisTer power + Merlin Flexx	05 08 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103-1, NT109, NG368	F	1,0 - 1,5 l + 0,2 - 0,3 l	Im Nachauflauf BBCH 12-13 gegen Ungräser und Unkräuter.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	Merlin Flexx	08	NW 10(5/5/*)m NT103-1, NG368	F	0,4 l	Nach der Saat bis zum Auflaufen von BBCH 00-09 gegen Hühnerhirse und Unkräuter. Unkräuter sollten BBCH 12 nicht überschritten haben.
	Merlin Duo	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT103-1, VA277, NG362,368,404	F	2,0 l	Im Nachauflauf BBCH 11-13 gegen Unkräuter und Hühnerhirse. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbuthylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Merlin Duo Pack = Merlin Duo + Fluva 100	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT103-1, VA277,320, NG362,368,404	F	2,0 l + 0,66 l	Im Nachauflauf von BBCH 11-13 gegen Unkräuter. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbuthylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Nicogan, ...u.a.	07 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT103 NG200,326,327	F	1,0 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-18 gegen Samenunkräuter und -ungräser. Sortenliste beachten. Maximal 45 g/ha Nicosulfuron und keine Anwendung mit Nicosulfuron auf derselben Fläche im Folgejahr. Kein Einsatz auf an Gewässer angrenzende Flächen!

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	Principal S Pack = Principal + Successor T	05 07 08 09	NW 10(5/5/*)m NG200,326-1,327 NW706, NT103 NG362	F	60 - 85 g + 0,2-0,3 l FHS + 2,0 - 2,8 l	Im Nachauflauf BBCH 12-14 gegen Ungräser und Unkräuter. Sortenliste beachten. Aufwandmenge je nach Ungrasspektrum und Entwicklungsstadium. Maximal 45 g/ha Nicosulfuron und keine Anwendung mit Nicosulfuron auf derselben Fläche im Folgejahr. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten und auf an Gewässer angrenzende Flächen!
	Principal Plus	07 09	NW 5(5/*/*)m NG200,326-1,327 NW706, NT108	F	0,44 kg + 0,3 l FHS	Im Nachauflauf BBCH 12-16 gegen Ungräser und Unkräuter. Sortenliste beachten. Maximal 45 g/ha Nicosulfuron und keine Anwendung mit Nicosulfuron auf derselben Fläche im Folgejahr. Kein Einsatz auf an Gewässer angrenzende Flächen!
	Simba 100 SC	05 08 09	NT103	F	2x 0,75 l	Als Spritzfolge im Abstand von 14 Tagen von BBCH 12-18 gegen Hühnerhirse und Unkräuter. Durchwuchskartoffeln werden mit erfasst.
	Spectrum	07 09	NW 20(10/5/5)m NT101y, VA271	F	1,4 l	Im Vor- und Nachauflauf von BBCH 11-16 gegen Schadhirsen, Amarant- und Kamille-Arten. Auch in Zuckermais zugelassen. In Tankmischungen 0,8-1,2 l/ha ausreichend.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	Spectrum Gold	07 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103 NG362	F	2,0 l	Im Vorauf und frühen Nachauf gegen Schadhirs und Unkräuter. Als Spritzfolgeanwendung geeignet. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
			NW 15(10/5/5)m NG405, NW706 NT103, NG362		3,0 l	Von Vorauf bis Nachauf gegen Schadhirs, Jährige Risse und Unkräuter. Als Tankmischpartner für Gräserbehandlungen geeignet. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Spectrum Aqua Pack = Spectrum + Stomp Aqua	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW705, NT112,145,146,170 VA271	VA 90 NA 60	1,25 - 1,4 l + 2,5 - 2,8 l	Im Vorauf und frühen Nachauf bis zum 2. Laubblatt der Unkräuter. Gegen Hirs und Unkräuter, außer Klettenlabkraut. Gute Bodenfeuchtigkeit notwendig. Auch in Zuckermis zugelassen. Bei größeren Hirs Ergänzung mit Sulfonylharnstoffen, z.B. Kelvin Ultra, erforderlich. TBA-freie Behandlung. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	Spectrum Plus	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW706, NT112,145,146,170 Nur im VA: NG405	F	4,0 l	Im Voraufbau und frühen Nachaufbau bis zum 2. Laubblatt der Unkräuter. Gegen Hirsen und Unkräuter, außer Klettenlabkraut. Gute Bodenfeuchtigkeit notwendig. Bei größeren Hirsen Ergänzung mit Sulfonylharnstoffen, z.B. Kelvin Ultra, erforderlich. TBA-freie Behandlung. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Successor T	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103 NG362	F	3,0 - 4,0 l	Im Nachaufbau des Mais von BBCH 10-14. Gegen Hühnerhirse, Borstenhirse und Unkräuter. Vorwiegende Bodenwirkung. Ergänzung mit blattaktiven Präparaten wie z.B. Sulcogan, Callisto oder Laudis erhöht die Einsatzflexibilität. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Successor Top Pack 4.0 = Successor T + Haldis 100 SC	05 07 08 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103 NG362	F	3,0 - 4,0 l + 0,75 - 1,0 l	Im Nachaufbau des Mais von BBCH 10-14. Gegen Hühnerhirse, Borstenhirse und Unkräuter. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	Successor 600	05 07 08 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NG405	F	2,0 l	Im Vorauf von BBCH 00-09 gegen Hühnerhirse, Jährige Rispe und Echte Kamille. Als Vorlage für TBA-freie Spritzfolgen geeignet.
	Tanika Mais Combo = Tandus 200 + Ikanos + Kideka	05 07 08 09	NW 15(10,5,5)m NW705,706, NT103	F	0,6 + 1,0 + 1,0 l	Im Nachauf von BBCH 13-17 gegen Samenunkräuter und -ungräser. Vorwiegend blattaktive Wirkung. Maximal 45 g/ha Nicosulfuron und keine Anwendung mit Nicosulfuron auf derselben Fläche im Folgejahr.
	Task	05 09	NT108	60	307 - 383 g + 0,25 - 0,3 l FHS	Im Nachauf bis BBCH 14 gegen Hühnerhirse und Unkräuter unter Beachtung der Sortenliste. Nebenwirkung gegen Ampfer, Ackerwinde, Disteln. Kombination mit Bodenherbizid (z.B. Stomp Aqua, Successor T) sinnvoll.
	Temsa SC, ...u.a.	05 07 08 09	NW 5(*/*/*)m NT103, NW705	F	1,5 l	Im Nachauf von BBCH 12-18 gegen Hühnerhirse und Unkräuter. Ergänzung mit Bodenherbizid sinnvoll.
	Zingis	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NW705, 800 NT103	F	0,29 l + 2,0 l Mero	Im Nachauf von BBCH 12-16 gegen Hirsen und breitblättrige Unkräuter. In Kombination mit Mischpartnern, z.B. Spectrum, Reduktion auf 0,25 + 1,72 l/ha möglich. TBA- und S-Metolachlor-freie Behandlungsmöglichkeit.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser, einschließlich Quecke	Arigo	05 07 09	NW 5(5/*/*)m NW706 NT109 NG200, 326-1, 327 VA275	F	0,25 kg + 0,3 l FHS	Im Nachauflauf BBCH 12-18 gegen Quecke, Ungräser und Unkräuter. Überwiegende Blattwirkung. Maximal 45 g/ha Nicosulfuron und keine Anwendung eines Nicosulfuronhaltigen Herbizides auf derselben Fläche im Folgejahr.
	MaisTer power	05 08 09	NW 10(5/*/*)m NW706, NT109	F	1,5 l	Nach dem Auflaufen in BBCH 12-16 gegen Quecke, Weißer Gänsefuß und Windenknöterich. Sortenempfindlichkeit beachten. TBA-freie Behandlungsmöglichkeit.
	MaisTer power [Aspect] Pack	05 08 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT109 NG362	F	1,5 + 1,5 l	Nach dem Auflaufen in BBCH 12-16 gegen Quecke, Ungräser und Unkräuter. Einsatz in Spritzfolge sinnvoll. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Cato, Plaza	05 07 09	NW 5(5/*/*)m NW705, NT108 NW 5(*/*/*)m NT103	F	50 g + FHS 30 g + FHS 20 g + FHS	Im Nachauflauf von BBCH 12-16 gegen Quecke, Hirsen, Ackerfuchsschwanz, Flughafer, Jährige Risse und Unkräuter als Einmal- oder Splittingbehandlung. Sortenverträglichkeit beachten. Kein Einsatz in Mais zur Saatgutproduktion. Zur Queckenregulierung Splitting empfehlenswert.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser, einschließlich Quecke	Dragster + Vivolt	09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103-1, NT140, NG366	F	135 g + 0,2 %	Nach dem Auflaufen von BBCH 11-18 gegen Gemeine Quecke, Ungräser und Unkräuter als Einmalbehandlung, oder im Splitting im Abstand von 7-10 Tagen. Zur Queckenregulierung Splitting empfehlenswert. Anwendung von Rimsulfuron nur einmal innerhalb von drei Jahren auf derselben Fläche möglich.
			NW 5(*/*/*)m NW706, NT102-1, NT140, NG366		2x 67,5 g + 0,2 %	
			NW 5(*/*/*)m NW706, NT102-1, NT140, NG366		85 g + 0,2 % 50 g + 0,2 %	
Herbizide für den Einsatz in herbizidresistenten Mais						
Ungräser, einschließlich Quecke und Hundszahngras, ausgenommen Jährige Rispe	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05	NT101	F	1,0 - 1,5 l	Nur in Cycloxydim-resistenten Maissorten (Duo-Mais) nach dem Auflaufen von BBCH 11-18 gegen Samenungräser, oder ab 15-20 cm Wuchshöhe gegen Quecke und Hundszahngras.
		07 08 09			2,5 - 3,0 l + 1,0 l	
			NT102			

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Sonderbehandlung gegen Alt- und Problemunkräuter vor der Saat						
Altunkräuter und Ungräser	Amega 360 SL, ...u.a. #)		NT102-1 NT140 NG352-1	F	3,0 l	Bis 2 Tage vor der Saat oder vor dem Auflaufen bis 5 Tage nach der Saat gegen Ungräser, Unkräuter und Aufallkulturen. Aufwandmenge je nach Zielunkraut. Einsatz auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen! Abdrift zuverlässig vermeiden.
	Kyleo, ...u.a. #)	07 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NG352-1,405 NT109	F	5,0 l	Gegen Altverunkrautung (Ungräser und Unkräuter) bis 3 Tage vor der Maissaat. Aufwandmenge je nach Zielunkraut. Zur Regulierung von Winden und Acker-Schachtelhalm geeignet. Einsatz auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen! Abdrift zuverlässig vermeiden.

Infos zum Mais
Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Stoppelbehandlung						
Unkräuter und Ungräser, einschließlich Quecke	Credit Xtreme	09	NG352-1, NG404, NT101-1, NT140	N	2,0 - 3,33 l	Gegen Altverunkrautung (Ungräser und Unkräuter) nach der Ernte. Unkräuter sollten ausreichende, intakte Blattmasse haben. Wüchsige Witterung fördert die Wirkung. Einsatz auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen! Abdrift zuverlässig vermeiden.

*) Landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!

#) Bei alternativen Glyphosat-Präparaten sind ggf. veränderte Anwendungsbestimmungen zu beachten.
 Generelle Anwendungsverbote auf Basis von privatrechtlichen Vereinbarungen (Pacht-, Lieferverträge) und besondere Anwendungsbestimmungen nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten.

(...) = Zulassung abgelaufen, letzte Einsatzmöglichkeit in 2025!

[...] Wiederezulassung nicht gesichert, keine Übermengen bevorraten.