



Herbizidempfehlung zur Herbstbehandlung in Weizen, Roggen und Triticale (kulturspezifische Aufwandmengen beachten)

Windhalm-Standorte

Im frühen Nachauflauf (Mittel; 1,kg/ha)

➤ Bacara Forte	0,8 – 1,0
➤ Herold SC	0,3 – 0,4
➤ Malibu	2,5 – 3,0
➤ Jura	3,5 – 4,0
➤ Boxer + Alliance	3,0 + 0,06
➤ Boxer + Beflex	2,5 + 0,3
➤ Carmina 640 + Alliance	1,5 + 0,06
➤ Trinity	2,0

Ackerfuchsschwanz-Standorte


Im frühen Nachauflauf (Mittel; 1,kg/ha)

➤ Cadou Forte Set	0,6 + 0,24
➤ Herold SC	0,6
➤ Malibu	3,5 – 4,0
➤ Boxer + Herold SC	3,0 + 3,0

Bei Bedarf:
/ Atlantis WG 0,3 + FHS NAF

Im Nachauflauf (Mittel; 1,kg/ha)

➤ Herold SC + Traxos	0,5 + 0,9
----------------------	-----------



0 09 10 12 13 21 25 29 30
Entwicklungsstadien nach BBCH-Code