

Bewertung von Fungiziden im Getreidebau (Stand: April 2017)

Präparat	Zulassung bis	reg. T	Wirkstoff(e) Wirkstoffkonz. g/l bzw. kg	Zulassung in W R T H	Anwendungs- termin (BBCH)	Aufwand L/ha	Kosten €/ha	Halm- bruch	Mehltau Stop- wirkung	Mehltau Dauer- wirkung	Rost	Septoria trit. Helminth. Wirkung 2)	Septoria trit. Vorbockige Wirkung 2)	Septoria nodorum	DTR	Ährenfus. Toxinmind.	Netz- flecken	Rhynchosporium	Ramularia Nichtparasit. Blattflecken	wichtige Auflagen 3)
• Azole																				
Achat	12/2018	G1	Prothioconazol	250	W G R - -	25-61	0,5	11,60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	keine
Agent	12/2019	G1 G2	Prothioconazol Fenpropidin	125 450	W G R T -	29-61	1,0	33,90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 20/10/5/5jm NW706 (20m), NT102
Alto 240 EC	12/2016	G1	Oxyconazole	240	W G R - -	31-61 (R-69)	0,4	18,52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	keine
Ampera	12/2022	G1 G1	Prothioconazol Tebuconazol	267 133	W G R T -	30-69 (G-61)	1,5	36,15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm NW701 (10m) Fusarium: ohne NW701
Bolt XL	08/2017	G1	Prothioconazol	250	W G R - -	25-61	0,5	11,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NT101
Capalo	12/2016	G2 G2	Epoxiconazol Fenpropimorph Metconazole	63 200 75	W G R T -	25-61	2,0	66,20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 15/10/5/5jm NW701 (10m)
Caramba	04/2019	G1	Metconazol	60	W G R T -	25-61 (W-69)	1,5	40,95	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/5/0jm
Ceralo	12/2023	G1 G2	Tebuconazol Triadimenol Spiroxamine	167 43 250	W G R T -	25-61 (W/R-69)	1,2	42,60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 20/15/10/5jm NW706 (20m) Fusarium: ohne NW706
Cirkon	06/2011	G1	Prothioconazol Prothioconazol	90 400	W G R - -	Belag: 61 (G-59)	1,1	27,72	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/0/0/0jm
Eleando	12/2025	G1	Epoxiconazol	41,5	W G - - -	30-59	3,0	57,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/0/0jm
Epoxion	12/2021	G1	Epoxiconazol	125	W G R T -	30-69 (G-61)	1,0	28,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/0/0jm NW706(20m)
Epoxion Top	12/2022	G1 G2	Epoxiconazol Fenpropidin	61 400	W G R T -	30-61 (R,T-69)	2,5	46,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 20/15/10jm NW706 (20m), NW712
Fezan	12/2022	G1	Tebuconazol	250	W - - - -	30-71	1,0	21,90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm NW705 (5m) Fusarium: ohne NW705
Folcur	12/2020	G1	Tebuconazol	250	W G R - -	25-61 (W/R-69)	1,25 W: 1.0	28,00 W: 27.40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm NW701 (10m), NT101
Gladio	12/2023	G1 G1 G2	Prothioconazol Tebuconazol Fenpropidin	125 125 375	W G R T -	30-61 (W-69)	0,8 Fusar: 1.0	38,48 Fus.: 48.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 4-(20)10jm NW706 (20m), NW712 Fusarium: NW4-i/20jm
Gladio-Unix Pack		G1 G1 G2	Prothioconazol Tebuconazol Fenpropidin	125 125 375	W G R T -	25-55	0,6+0,6	50,76	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 4-(20)10jm NW706 (20m) NW712
Helocur	08/2020	G1	Tebuconazol	250	W G - T -	30-69 (G-61)	1,25 W: 1.0	27,36 W: 21.90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm NW701 (10m)
Input Classic	12/2022	G1 G2	Prothioconazol Spiroxamine	160 300	W G R T -	30-69 (G-61)	1,25	58,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 20/15/15jm NW706 (20m), Fusarium: NW701 (10m)
Kantik	12/2019	G1 G1 G2	Prothioconazol Tebuconazol Fenpropidin	200 100 150	W G R T -	31-59 (W-61)	2,0	44,20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 4-(15)15jm NW706 (20m) NW712, W214
Matador	12/2019	G1	Tebuconazol Triadimenol	225 75	W - R - -	25-61	1,0	26,20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm NW701 (10m)
Mirage 45 EC	12/2022	G1	Prothioconazol	450	W G R - -	29-49 (W-59)	1,2	23,52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm NW705 (5m)
Opus Top	12/2011	G1 G2	Epoxiconazol Fenpropimorph	84 250	W G R T -	25-61	1,5	kein Solb- vertrieb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 20/15/10/5jm NW701 (10m)
Orius	12/2020	G1	Tebuconazol	200	W G R T -	32-69 (G-61)	1,5 W: 1,25 W: 20,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm NW701 (10m)
Osiris	12/2019	G1 G1	Epoxiconazol Metconazol	37,5 7,5	W G R T H	25-69 (G,H-61)	3,0 H: 2,5	66,00 H: 55,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/5/0jm NW701 (10m)
Proline	12/2018	G1	Prothioconazol	250	W G R T -	25-61 (W-69)	0,8	54,48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/0/0jm NW701 (10m)
Pronto Plus	12/2021	G1 G2	Tebuconazol Spiroxamine	133 230	W G R - -	25-69 (G-61)	1,5	39,30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 20/15/15jm NW706 (20m), NT101
Prosoar, Sympara	12/2020	G1 G1	Prothioconazol Tebuconazol	125 125	W G R T -	25-69 (G-61)	1,0	48,90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/5/0jm NW701 (10m) Fusarium: ohne NW701
Rubric	04/2020	G1	Epoxiconazol	125	W G R - H	30-69 (G,H-61)	1,0	27,10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/5/0jm
Soleil	12/2025	G1	Bromconazol Tebuconazol	167 107	W - - - -	30-69	1,2	37,80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/0/0jm
Talus Top Pack = Talus + Opus Top		E1 G1	Proquinazid + Epoxiconazol Fenpropimorph	200 84 250	W G R T -	25-61	0,25 + 1,25	60,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 20/15/10/5jm NW701 (10m)
Taspa	12/2016	G1	Difenoconazol Prothioconazol	250 250	W - - - -	51-61	0,5	32,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm
Vegas-Proline Pack		U G1	Diflufenamid + Prothioconazol	51 250	W G R T -	30-59	0,25 + 0,8	72,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/0/0jm NW701 (10m)
• Stroblurinhaltige Mittel																				
Acanto	10/2018	C3	Picoxystrobin	250	W G R T -	27-61	1,0	48,30	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm
Amistar Opti	10/2011	C3 M	Azoxystrobin Chlorothalonil	80 400	W G R T -	25-61 (G-59 R-69)	2,5	50,25	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 20/10/5/5jm NW701 (10m), NC331
Amistar Opti Gladio		C3 M G1 G2	Azoxystrobin Chlorothalonil + Prothioconazol Tebuconazol Fenpropidin	80 400 125 250	W G R T -	30-61 (G-59)	1,8+0,6	60,72	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 4-(20)10jm NW706 (20m) NW712, NC331
Azoxystar	12/2022	C3	Azoxystrobin	250	W G R T -	31-69 (W-71)	1,0	32,50	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/0/0jm NW701 (10m)
Credo	10/2016	C3 M	Picoxystrobin Chlorothalonil	100 500	W G - - -	31-69 (G-51)	2,0	55,20	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 20/10/5/5jm NW706 (20m), NC331
Credo-Opus Top Pack		C3 M G1 G2	Picoxystrobin Chlorothalonil + Epoxiconazol Fenpropimorph	100 500 84 250	W G - - -	31-61 (G-61)	1,25+1,25	76,25	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 20/10/5/5jm NW706 (20m), NC331
Diamant	01/2010	G1 G2	Pyraclostrobin Epoxiconazol Fenpropimorph	114 43 214	W G R T -	25-61	1,75	kein Solb- vertrieb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm
Fandango	12/2011	G1 G1 G2	Fluxusoxystrobin Prothioconazol Fenpropidin	100 100 100	W G R T -	25-61 (W-69)	1,5 G: 1,25	69,90 G: 58,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/5/0jm Halmbruch/G: 5/5/0/0jm NW701 (10m)
Fandango-Input Spezial		G1 G1 G2	Fluxusoxystrobin Prothioconazol + Prothioconazol Spiroxamine	100 100 100 300	W G R T -	25-61 (W-69)	0,75+0,75	67,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 4-(20)15/15jm NW706 (20m) Fusarium: NW701 (10m)
Juwel Top	12/2019	G2 G2	Kresoxim-methyl Fenpropimorph	125 150	W G R T H	25-61 (H:32-61)	1,0	59,90	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 15/10/5/5jm NW701 (10m) T.H. NW 15/10/5/5jm NW705 (5m)
Torero	12/2022	C3	Azoxystrobin	250	W G R T H	31-69 (G-61)	1,0	32,00	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/5/0/0jm
• Carboxamidhaltige Mittel																				
Adexar	09/2017	G2 G2	Fluopyroxad Epoxiconazol	62,5 62,5	W G R T -	25-69 (G-61)	2,0	86,80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/0/0/0jm NW706 (20m)
Adexar-Diamant Pack		C3 G1 G1 G2	Fluopyroxad Epoxiconazol + Pyraclostrobin Epoxiconazol Fenpropimorph	62,5 62,5 114 43 214	W G R T -	25-61	1,1+1,1	77,66	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm NW706 (20m)
Aviator Xpro	07/2011	G2 G1	Bifenox Prothioconazol	75 150	W G R T -	25-69 (G-61)	1,25 G: 1.0	80,25 G: 64.20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm NW706 (20m)
Aviator Xpro Duo = Aviator Xpro + Fandango		G2 G1 G1	Bifenox Prothioconazol + Fluaxystrobin Prothioconazol	75 150 100 100	W G R T -	25-61 (W-69)	0,75+0,75	82,95	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm NW706 (20m)
Bontima	09/2011	G2	Isoprazam Cyprodinil	62,5 19,5	G - G - -	30-59	2,0	63,00	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 15/10/5/5jm NW701 (10m), NC342-1
Cerix	12/2025	G2	Fluopyroxad Pyraclostrobin Epoxiconazol	41,6 66,6 41,6	W G R T -	25-69 (G-61)	2,5	88,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 10/5/5/0jm
Champion	12/2010	G1 G2	Boscalid Epoxiconazol	233 67	W G R - -	25-61	1,5	kein Solb- vertrieb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW 5/0/0/0jm NW701 (10m)
Champion-Diamant Doppelgebinde		C2 G1 G1 G2	Boscalid																	

Bewertung von Fungiziden im Getreidebau (Stand: April 2017)

Präparat	Zulassung bis	FRAC-Code 1)	Wirkstoff(e) Wirkstoffkonzentration g/l bzw. kg	Zulassung in W G R T H	Anwendungs- termin (BBCH)	Aufwand l/kg/ha	Kosten €/ha	Halm- bruch	Mehltau Stopp- wirkung	Mehltau Dauer- wirkung	Rost	Septoria trit. Heilende Wirkung 2)	Septoria trit. Vorbeugende Wirkung 2)	Septoria nodorum	DTR	Ährenfus. Toxinmind.	Netz- flecken	Rhyncho- sporium	Ramularia Nichtparasit. Blattflecken	wichtige Auflagen 3)
• Azole																				
Achat	12/2018	G1	Propiconazol 250	W G R - -	25 - 61	0,5	11,60		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		keine
Agent	12/2019	G1 G2	Propiconazol 125 Fenpropidin 450	W G R T -	29 - 61	1,0	33,90		●	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NW 20(10/5/5)m NW706 (20m), NT102
Alto 240 EC	12/2018	G1	Cyproconazol 240	W G R - -	31-61 (R: - 69)	0,4	18,52		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		keine
Ampera	12/2022	G1 G1	Prochloraz 267 Tebuconazol 133	W G R T -	30 - 69 (G: - 61)	1,5	36,15	☐ *	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		NW 10(5/5/0)m NW701 (10m) Fusarium: ohne NW701
Bolt XL	08/2017	G1	Propiconazol 250	W G R - -	25-61	0,5	11,50		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NT101
Capalo	12/2018	G1 G2 U	Epoxiconazol 63 Fenpropimorph 200 Metrafenone 75	W G R T -	25 - 61	2,0	66,20	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NW -(15/10/5)m NW701 (10m)
Caramba	04/2019	G1	Metconazol 60	W G R T -	25 - 61 (W: - 69)	1,5	40,95		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		NW 5(5/0/0)m
Ceralo	12/2023	G1 G1 G2	Tebuconazol 167 Triadimenol 43 Spiroxamine 250	W G R T -	25 - 61 (W,R: - 69)	1,2	42,60		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		NW 20(15/10/10)m NW706 (20m) Fusarium: ohne NW706
Cirkon	06/2017	G1 G1	Propiconazol 90 Prochloraz 400	W G R - -	Bef.beg. - 61 (G: - 55)	1,1	27,72	☐ *	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NW 5(0/0/0)m
Eleando	12/2025	G1 G1	Epoxiconazol 41,6 Prochloraz 150	W G - - -	30 - 59	3,0	57,00	☐ *	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NW 5(5/0/0)m
Epoxion	12/2021	G1	Epoxiconazol 125	W G R T -	30 - 69 (G: - 61)	1,0	28,50		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NW 5(5/0/0)m NW706(20m)
Epoxion Top	12/2022	G1 G2	Epoxiconazol 40 Fenpropidin 100	W G R T -	30 - 61 (R,T: - 69)	2,5	46,00		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NW -(20/15/10)m NW706 (20m), NW712
Fezan	12/2022	G1	Tebuconazol 250	W - - - -	30 - 71	1,0	21,90		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				NW 10(5/5/0)m NW705 (5m) Fusarium: ohne NW705
Folicur	12/2020	G1	Tebuconazol 250	W G R - -	25 - 61 (W,R: - 69)	1,25 W: 1.0	28.00 W: 22.40		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		NW 10(5/5/0)m NW701 (10m), NT101
Gladio	12/2023	G1 G1 G2	Propiconazol 125 Tebuconazol 125 Fenpropidin 375	W G R T W	30 - 61 (W: - 69)	0.8 Fusar.: 1.0	38.48 Fus.: 48.10		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		NW -(20/10)m NW706 (20m), NW712 Fusarium: NW-(1/20)m
Gladio-Unix Pack		G1 G1 G2 D1	Propiconazol 125 Tebuconazol 125 Fenpropidin 375 + Cyprodinil 750	W G R T -	25 - 55	0,6+0,6	50,76	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NW -(20/10)m NW706 (20m) NW712
Helocur	08/2020	G1	Tebuconazol 250	W G - T -	30 - 69 (G: - 61)	1,25 W: 1.0	27.38 W: 21.90		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		NW 10(5/5/0)m NW701 (10m)
Input Classic	12/2022	G1 G2	Prothioconazol 160 Spiroxamine 300	W G R T -	30 - 69 (G: - 61)	1,25	58,25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NW -(20/15/15)m NW706 (20m), Fusarium: NW701 (10m)
Kantik	12/2019	G1 G1 G2	Prochloraz 200 Tebuconazol 100 Fenpropidin 150	W G R T -	31 - 59 (W: - 61)	2,0	44,20	☐ *	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NW -(15/15/15)m NW706 (20m) NW712, VV214
Matador	12/2019	G1 G1	Tebuconazol 225 Triadimenol 75	W - R - -	25 - 61	1,0	26,20		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐		NW 10(5/5/0)m NW701 (10m)
Mirage 45 EC	12/2022	G1	Prochloraz 450	W G R - -	29 - 49 (W: - 59)	1,2	23,52	☐ *	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NW 10(5/5/0)m NW705 (5m)
Opus Top	12/2017	G1 G2	Epoxiconazol 84 Fenpropimorph 250	W G R T -	25 - 61	1,5	kein Solo- vertrieb		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		NW 20(15/10/5)m NW701 (10m)
Orius	12/2020	G1	Tebuconazol 200	W G R T -	32-69 (G: - 61)	1.5 W: 1.25	24.90 W: 20.75		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		NW 10(5/5/0)m NW701 (10m)
Osiris	12/2019	G1 G1	Epoxiconazol 37,5 Metconazol 27,5	W G R T H	25 - 69 (G, H: - 61)	3.0 H: 2.5	66.00 H: 55.00		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NW 5(5/0/0)m NW701 (10m)
Proline	12/2018	G1	Prothioconazol 250	W G R T -	25 - 61 (W: - 69)	0,8	54,48	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NW 5(5/0/0)m NW701 (10m)
Pronto Plus	12/2021	G1 G2	Tebuconazol 133 Spiroxamine 250	W G R - -	25 - 69 (G: - 61)	1,5	39,30		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		NW -(20/15/15)m NW706 (20m), NT101
Prosaro, Sympara	12/2020	G1	Prothioconazol 125 Tebuconazol 125	W G R T -	25 - 69 (G: - 61)	1,0	48,90	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NW 5(5/5/0)m NW701 (10m), Fusarium: ohne NW701

Bewertung von Fungiziden im Getreidebau (Stand: April 2017)

Präparat	Zulassung bis	FRAC-Code 1)	Wirkstoff(e) Wirkstoffkonzentration g/l bzw. kg	Zulassung in W G R T H	Anwendungs- termin (BBCH)	Aufwand l/kg/ha	Kosten €/ha	Halm- bruch	Mehltau Stopp- wirkung	Mehltau Dauer- wirkung	Rost	Septoria trit. Heilende Wirkung 2)	Septoria trit. Vorbeugende Wirkung 2)	Septoria nodorum	DTR	Ährenfus. Toxinmind.	Netz- flecken	Rhyncho- sporium	Ramularia Nichtparasit. Blattflecken	wichtige Auflagen 3)
Rubric	04/2020	G1	Epoxiconazol 125	W G R - H	30 - 69 (G: H: - 61)	1,0	27,10													NW 5(5/0)m
Soleil	12/2025	G1 G1	Bromuconazol 167 Tebuconazol 107	W - - - -	30 - 69	1,2	37,80													NW 5(0/0)m
Talius Top Pack = Talius + Opus Top		E1 G1	Proquinazid 200 +Epoxiconazol 84 Fenpropimorph 250	W G R T -	25 - 61	0.25+1.25	60,75													NW 20(15/10)m NW701 (10m)
Taspa	12/2018	G1 G1	Difenoconazol 250 Propiconazol 250	W - - - -	51 - 61	0,5	32,75													NW 10(5/5/0)m
Vegas-Proline Pack		U G1	Cyflufenamid 51 + Prothioconazol 250	W G R T -	30 - 59	0.25+0.8	72,00													* NW 5(5/0)m NW701 (10m)
• Strobilurininhaltige Mittel																				
Acanto	10/2018	C3	Picoxystrobin 250	W G R T -	27 - 61	1,0	48,30													NW 10(5/5/0)m
Amistar Opti	10/2017	C3 M	Azoxystrobin 80 Chlorothalonil 400	W G R T -	25 - 61 (G: - 59, R: - 69)	2,5	50,25													NW - (20/10/5)m NW701 (10m), NG331
Amistar Opti Gladio		C3 M G1 G1 G2	Azoxystrobin 80 Chlorothalonil 400 + Propiconazol 125 Tebuconazol 125 Fenpropidin 375	W G R T -	30 - 61 (G: - 59)	1.8+0.6	60,72													NW - (20/10)m NW706 (20m) NW712, NG331
Azoxystar	12/2022	C3	Azoxystrobin 250	W G R T -	31 - 69 (W: - 71)	1,0	32,50													NW 5(5/0/0)m NW701 (10m)
Credo	10/2018	C3 M	Picoxystrobin 100 Chlorothalonil 500	W G - - -	31 - 69 (G: - 51)	2,0	55,20													NW - (20/10/5)m NW706 (20m), NG331
Credo-Opus Top Pack		C3 M G1 G2	Picoxystrobin 100 Chlorothalonil 500 + Epoxiconazol 84 Fenpropimorph 250	W G - - -	31 - 61 (G: - 51)	1.25+1.25	76,25													NW - (20/10/5)m NW706 (20m), NG331
Diamant	01/2018	C3 G1 G2	Pyraclostrobin 114 Epoxiconazol 43 Fenpropimorph 214	W G R T -	25 - 61	1,75	kein Solo- vertrieb													NW 10(5/5/0)m
Fandango	12/2018	C3 G1	Fluxastrobin 100 Prothioconazol 100	W G R T -	25 - 61 (W: - 69)	1.5 G: 1.25	69.90 G: 58.25													* NW 5(5/5/0)m Halmbruch/G: 5(5/0/0)m NW701 (10m)
Fandango-Input Spezial		C3 G1 G1 G2	Fluxastrobin 100 Prothioconazol 100 + Prothioconazol 160 Spiroxamine 300	W G R T -	25 - 61 (W: - 69)	0.75+0.75	67,50													* NW - (20/15/15)m NW706 (20m) Fusarium: NW701 (10m)
Juwel Top	12/2019	C3 G1 G2	Kresoxim-methyl 125 Epoxiconazol 125 Fenpropimorph 150	W G R T H	25 - 61 (H: 32 - 61)	1,0	59,90													NW 15(10/5/5)m NW701 (10m) T.H: NW 10(10/5/5)m NW705 (5m)
Torero	12/2022	C3	Azoxystrobin 250	W G R T H	31 - 69 (G: - 61)	1,0	32,00													NW 5(5/0/0)m
• Carboxamidhaltige Mittel																				
Adexar	09/2017	C2 G1	Fluxapyroxad 62,5 Epoxiconazol 62,5	W G R T -	25 - 69 (G: - 61)	2,0	86,80													* NW 5(0/0/0)m NW706 (20m)
Adexar-Diamant Pack		C2 G1 C3 G1 G2	Fluxapyroxad 62,5 Epoxiconazol 62,5 + Pyraclostrobin 114 Epoxiconazol 43 Fenpropimorph 214	W G R T -	25-61	1.1+1.1	77,66													* NW 10(5/5/0)m NW706 (20m)
Aviator Xpro	07/2019	C2 G1	Bixafen 75 Prothioconazol 150	W G R T -	25 - 69 (G: - 61)	1.25 G: 1.0	80.25 G: 64.20													* NW 10(5/5/0)m NW706 (20m)
Aviator Xpro Duo = Aviator Xpro + Fandango		C2 G1 C3 G1 G2	Bixafen 75 Prothioconazol 150 + Fluxastrobin 100 Prothioconazol 100	W G R T -	25 - 61 (W: - 69)	0.75+0.75	82,95													* NW 10(5/5/0)m NW706 (20m)
Bontima	09/2017	C2 D1	Isopyrazam 62,5 Cyprodinil 187,5	- G - - -	30 - 59	2,0	63,00													* NW 15(10/5/5)m NW701 (10m), NG342-1
Cerix	12/2025	C2 C3 G1	Fluxapyroxad 41,6 Pyraclostrobin 66,6 Epoxiconazol 41,6	W G R T -	25 - 69 (G: - 61)	2,5	88,75													* NW 10(5/5/0)m

Bewertung von Fungiziden im Getreidebau (Stand: April 2017)																				
Präparat	Zulassung bis	FRAC-Code (1)	Wirkstoff(e) g/l bzw. kg	Zulassung in W G R T H	Anwendungs- termin (BBCH)	Aufwand l,kg/ha	Kosten €/ha	Halm- bruch	Mehltau Stopp- wirkung	Mehltau Dauer- wirkung	Rost	Septoria trit. Heilende Wirkung 2)	Septoria trit. Vorbeugende Wirkung 2)	Septoria nodorum	DTR	Ährenfus. Toxinmind.	Netz- flecken	Rhyncho- sporium	Ramularia Nichtparasit. Blattflecken	wichtige Auflagen 3)
Champion	12/2018	C2 G1	Boscalid Epoxiconazol 233 67	W G R - -	25 - 61	1,5	kein Solo- vertrieb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* NW 5(0/0)m NW701 (10m)
Champion-Diamant Doppelgebinde		C2 G1 C3 G2 G1	Boscalid Epoxiconazol +Pyraclostrobin Epoxiconazol Fenpropimorph 233 67 114 43 214	W G R - -	25 - 61	0,9+0,9	70,74	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* NW 10(5/5)m NW701 (10m)
Elatus Era	07/2019	C2 G1	Benzovindiflupyr Prothioconazol 75 150	W G R T -	31 - 69 (G: - 59)	1,0	kein Solo- vertrieb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* NW 15(10/5/5)m
Elatus Era Opti = Elatus Era + Amistar Opti		C2 G1 C3 G1 M	Benzovindiflupyr Prothioconazol +Azoxystrobin Chlorthalonil 75 150 80 400	W G R T -	31-61 (G: -59 R: -69)	1,0+1,5	89,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW -(20/10/5)m NW701 (10m), NG331
Elatus Era Sympara		C2 G1 G1 G1	Benzovindiflupyr Prothioconazol +Prothioconazol Tebuconazol 75 150 125 125	W G R T -	31 - 69 (G: - 59)	1,0+0,33	76,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* NW 15(10/5/5)m NW701 (10m), Fusarium: ohne NW701
Input Xpro	09/2017	C2 G1 G2	Bixafen Prothioconazol Spiroxamine 50 100 250	W G R T -	25 - 69 (G: - 61)	1,5	75,45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* NW -(20/15/15)m NW706 (20m)
Seguris	12/2017	C2 G1 G1	Isoprazam Epoxiconazol 125 90	W G R T -	30-69 (G: -59)	1,0	kein Solo- vertrieb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* NW 15(10/5/5)m NW701 (10m), NG342-1
Seguris Opti = Seguris + Amistar Opti		C2 G1 C3 G1 M	Isoprazam Epoxiconazol +Azoxystrobin Chlorthalonil 125 90 80 400	W G R T -	30-61 (G: -59 R: -69)	1,0+1,5	75,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NW -(20/10/5)m NW701 (10m) NG331, NG342-1
Siltra Xpro	11/2017	C2 G1	Bixafen Prothioconazol 60 200	W G - - -	30-69 (G: -61)	1,0	67,10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* NW 5(5/0/0) NW701 (10m)
Skyway Xpro	10/2017	C2 G1 G1	Bixafen Prothioconazol Tebuconazol 75 100 100	W G R T -	25 - 69 (G: - 61)	1,25 G: 1,0	74,75 G: 59,80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* NW 10(5/5/0)m NW706 (20m) Fusarium: ohne NW706
• Thiophanate																				
Don-Q, Topsin	12/2018	B1	Thiophanat-methyl 704	W - - T -	61 - 69	1,1	23,87									●				NW 20(10/5/5)m NW701 (10m)
• Anilinopyrimidine																				
Unix	12/2018	D1	Cyprodinil 750	W G R T -	Bef.beg. - 55	1,0	kein Solo- vertrieb	●	●	●	○	●	●	●	●		●	●		NW 15(10/5/5)m NW706 (20m)
• Kontaktmittel																				
Dithane NeoTec	05/2017	M	Mancozeb 750	W - - - -	30 - 61	2,0	20,20		○	○	●	○	●	●	○					NW 15(10/5/5)m NT102
• Mehltau-Spezialfungizide																				
Corbel	12/2017	G2	Fenpropimorph 750	W G R - -	25 - 61	1,0	39,10		●	●	●	○	○	○	○		○	●		NW -(15/5)m NW701 (10m)
Talius	12/2022	E1	Proquinazid 200	W G R T -	25 - 61	0,25	22,90		●	●	○	○	○	○	○		○	○		NW 5(5/0/0)m
Vegas	12/2020	U	Cyflufenamid 51	W G R T H	30 - 59	0,25	15,88		●	●	○	○	○	○	○		○	○		keine

* auf Standorten mit Resistenz ist mit einem Wirkungsabfall zu rechnen W=Weizen, G=Gerste, R=Roggen, T=Triticale, H=Hafer, WH=Winterhafer

Preise ohne MwSt aus Preisliste 2017 für Großgebinde (ohne 640 l- und Eco-Gebinde)

1) FRAC-Code(= Fungizid-Wirkungsgruppe): zur Resistenzvermeidung unterschiedliche Wirkungsgruppen in Mischungen oder Spritzfolgen kombinieren.

2) Bei der Einstufung der Wirkung gegen Septoria tritici wird von Resistenz gegen Strobilurine ausgegangen.

3) Bei den Auflagen zu Oberflächengewässern (ohne Hangneigungsauflagen) sind die je nach verlustmindernder Technik tatsächlich einzuhaltenden Abstände in Meter angegeben, nach dem Muster "NW ohne (50% / 75% / 90%) Verlustminderung". Bei den Hangneigungsauflagen NW701/705/706, die ab 2 % Neigung, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat gelten, ist die erforderliche Breite des bewachsenen Abstandstreifens gegenüber angrenzenden Gewässern mit angegeben.

Ein waagrecht Strich "-" bedeutet, dass die Anwendung mit dieser Verlustminderungstechnik nicht zulässig ist. NT-Auflagen: siehe www.bvl.bund.de.

NG331: Die maximale Aufwandmenge von 2.000 g Chlorthalonil pro Hektar und Jahr darf - auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden.

NW342-1: Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Isoprazam enthalten.

NW712: Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Fenpropidin enthalten.

VV214: Stroh nicht zum Zweck der Tierhaltung und Tierfütterung verwenden.

○=keine, ◐=geringe, ◑=mittlere, ◒=gute, ◓=sehr gute Wirkung

Die Bewertung enthält auch bekannte Nebenwirkungen bei Behandlung gegen zugelassene Krankheiten.