

**Infos zu Leguminosen**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Botrytis</i> , Falscher Mehltau, Brennflecken an Ackerbohnen	Ortiva	07 09	NW 5(5/**)m NW701	35	1,0 l max. 2x	Bei Befallsbeginn behandeln.
<i>Botrytis</i> , Rost ( <i>Uromyces viciae fabae</i> ) an Ackerbohnen	Elatus Era	05 07 08 09	NW 10(5/5/**)m NT140	F	0,66 l max. 1x	
Echte Mehltupilze an Ackerbohnen	Folicur	05 07 08 09	NW 10(5/5/**)m NT101, NW701	F	1,0 l max. 2x	
Rost ( <i>Uromyces viciae fabae</i> ) an Ackerbohnen	Azbany	09	NW 5(5/**)m NW706, NW800	35	1,0 l max. 2x	
	Chamane	09	NW 5(5/**)m NW706, NW800	35	1,0 l max. 1x	
	Folicur	05 07 08 09	NW 10(5/5/**)m NT101, NW701	F	1,0 l max. 2x	
Schokoladenflecken ( <i>Botrytis fabae</i> ) an Ackerbohnen	Folicur	05 07 08 09	NW 10(5/5/**)m NT101, NW701	F	1,0 l max. 2x	

**Infos zu Leguminosen**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Colletotrichum</i> an Lupine-Arten	Folicur	05 07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT101, NW701	F	1,0 l max. 2x	Bei Befallsbeginn behandeln.
	Ortiva	07 09	NW 5(5/*/*)m NW701	35	1,0 l max. 2x	
<i>Botrytis cinerea</i> an Futtererbsen	Chamane	09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l max. 2x	
Erbsenrost ( <i>Uromyces pisi</i> ) an Futtererbsen	Folicur	05 07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT101, NW701	F	1,0 l max. 2x	
Brennflecken ( <i>Ascochyta pisi</i> ) an Futtererbsen	Chamane	09	NW 5(5/*/*)m NW705	F	1,0 l max. 2x	
	Ortiva	07 09	NW 5(5/*/*)m NW705	35	1,0 l max. 2x	

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!