Präparate zur Unkrautkontrolle in Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen 2025

Präparat	Wirkstoff(e)	HRAC-Wirk-gruppe	Aufwand (E/ha)	Kosten (€/ha) [1]	Einsatz	Zulassung in:			Wirkungsspektrum																		
						Ackerbohne	Futtererbse	Lupine	Ackerfuchsschwanz	Jährige Rispe	Flughafer	Quecke	Ausfallgetreide	Hirsearten	Windenknöterich	Amarant	Franzosenkraut	Klettenlabkraut	Kamille	Gänsefuß, Melde	Hohlzahn	Hellerkraut	Taubnessel	Stiefmütterchen	Ehrenpreis	Vogelmiere	Nachtschatten
Breitbandherbizide und Präparate mit rein dikotyler Wirkung																											
Bandur	Aclonifen	32	3,5 - 4,0	93 - 106	VA	■	■		◕	●	◑	○	◕	●	◑	◕	◕	◕	◕	◕	◔	●	●	◑	●	●	◔
Boxer, …u.a.	Prosulfocarb	15	3,0 - 5,0	38 - 64	VA	■	■	■	◑	●	◑	○	○	○	◑	◑	◕	●	◑	◑	●	●	●	○	●	●	◑
Centium 36 CS, …u.a.	Clomazone	13	0,2 - 0,25	34 - 43	VA	■	■	2)	○	○	○	○	◔	○	◕	◔	◔	●	◔	◔	◔	◕	●	◔	◕	●	◔
Novitron DamTec	Aclonifen + Clomazone	32 + 13	2,0 - 2,4	91 - 109	VA	■	■		◑	●	◑	○	◑	◕	◑	◕	◕	◕	◕	●	◑	●	●	◕	●	●	◔
Spectrum Plus	Pendimethalin + Dimethenamid-P	3 + 15	2,5 - 4,0	66 - 105	VA	■	■	■	◑	●	◔	○	◔	◕	◑	●	●	◑	●	◕	◕	◕	●	◕	◕	◕	◕
Spectrum Plus	Pendimethalin + Dimethenamid-P	3 + 15	2,5 - 4,0	66 - 105	NA		■		◑	●	◔	○	◔	◕	◑	●	●	◑	●	◕	◕	◕	●	◕	◕	◕	◕
Stomp Aqua	Pendimethalin	3	2,5 - 3,0	60 - 72	VA	■	■	■	◔*	◕	○	○	○	◑	◑	●	◕	◑	◔	●	●	●	●	◕	●	●	◕
Stomp Aqua	Pendimethalin	3	2,5 - 3,0	60 - 72	NA		■		○	◔	○	○	○	◔	◔	◕	◔	◔	○	◕	◑	◑	◕	◑	◑	◕	◑
Präparate ausschließlich mit Gräserwirkung																											
Agil-S, …u.a.	Propaquizafop	1	0,75	24	NA	■	■		●*	◔	●	◔	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Agil-S, …u.a.	Propaquizafop	1	1,5	49	NA	■	■		●*	◔	●	◕	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	Cycloxydim	1	1,0 - 1,5 + 1,0	40 - 60	NA	■	■		●*	◔	●	◔	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	Cycloxydim	1	2,0 - 2,5 + 1,0	80 - 99	NA	■	■		●*	◔	●	◕	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fusilade MAX, …u.a.	Fluazifop-P	1	0,75 - 1,0	25 - 32	NA	■	■	■	●*	◔	●	◔	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fusilade MAX, …u.a.	Fluazifop-P	1	2,0	66	NA		■	■	●*	◔	●	◕	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Select 240 EC, …u.a. + Radiamix	Clethodim	1	0,5 + 1,0	42	NA			■	●*	●	●	◑	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Targa Super, …u.a.	Quizalofop-P	1	0,75 - 1,5	14 - 29	NA	■	■		●*	◔	●	◔	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Targa Super, …u.a.	Quizalofop-P	1	2,0 - 2,5	39 - 48	NA	■	■		●*	◔	●	◕	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Die Angaben entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse. Verbindlich ist die der Packung aufgedruckte Gebrauchsanleitung.
Die Wirkungseinstufung erfolgte nach eigenen Erfahrungen für die Standardanwendung der Präparate.

Legende: VA = Vorauflauf, NA = Nachauflauf
○ = keine, ◔ = geringe, ◑ = mittlere, ◕ = gute, ● = sehr gute Wirkung

1) Kosten nach Handelsliste für Großgebinde ohne MwSt.

2) Einsatz in Weißer und Gelber Lupine zur Lebensmittelproduktion.

HRAC-Wirkgruppe: Gleiche Zahl = gleiche biochemische Wirkung = gleiches Resistenzrisiko

* Gefahr der Resistenzentwicklung bei regelmäßiger Anwendung!

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Pflanzenschutz

Herbologie / © K. Gehring, S. Thyssen
Stand: März 2025