

**Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen
ausgewählter Mais-Herbizid-Packs für die Frühjahrsbehandlung 2025**

Präparat	Hang- auflage ¹⁾	Gewässerabstand [m]				Nicht-Zielflächen-Abstand ²⁾ [m]								Sonstige Auflagen ³⁾
		Abdriftminderungsklasse je nach Düsenteknik				Abdriftminderungsklasse je nach Düsenteknik								
		0 %	50%	75%	90%	0%	50%	75%	90%	Anteil an Kleinstrukturen ausreichend ?				
Pufferzone [m]	Abstand [m]				NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA		
Stardust Pack Starship 100 SC + Tandus	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Callisto P Pack Callisto + Peak	10	5	*	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5 - 0 #	0	5 - 0 #	0	
Laudis Plus Laudis + Delion	-	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Elumis P Pack Elumis + Peak	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327
Tanika Mais Combo = Tandus + Ikanos + Kideka	20	5	5	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5 - 0 #	0	5 - 0 #	0	NG326-1, NG327
Merlin Duo Pack , bis 1,5 + 0,5 l/ha Merlin Duo + Fluva 100	20	5	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG362, NG368, VA277
Merlin Duo Pack , bis 2,0 + 0,67 l/ha Merlin Duo + Fluva 100	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG362, NG368, VA277
Callisto P Flexx Pack Merlin Flexx + Callisto + Peak	10	10	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	20	0	5 - 0 #	0	NG368
MaisTer Power Flexx Pack MaisTer Power ++ + Merlin Flexx	20	10	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5 - 0 #	0	NG368
Elumis Triumph Pack Elumis + Successor T	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327, NG362
Laudis [Aspect] Pack Aspect + Laudis	10	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG362
MaisTer power [Aspect] Pack Aspect + MaisTer Power	20	10	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5 - 0 #	0	NG362
Successor Top 4.0 Successor T + Haldis 100 SC	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG362

 = keine Anwendung möglich.

*) landesspezifische Regelungen und Vorgaben der Pflanzenschutz-
anwendungsverordnung zum Gewässerabstand beachten!

##) verringerter Abstand zu Hecken auf ehemals
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten
Flächen.

[...] = Wirkstoffverfügbarkeit nicht gesichert, kein Übermengen bevorraten, aktuelle Zulassungssituation beachten.

1) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat.

2) Abstände sind nicht erforderlich:

- bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
- bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3 m breit sind, oder
- bei der Anwendungen mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten.
- in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulisse siehe 'www.julius-kuehn.de'.

3) NG326, NG326-1: es dürfen max. 45 g/ha Nicosulfuron auf derselben Fläche ausgebracht werden.

NG327: Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Nicosulfuron.

NG362: auf derselben Fläche darf innerhalb von drei Jahren nur eine Behandlung mit einem Terbutylazin-haltigen Mittel mit max. 850 g/ha Terbutylazin erfolgen.

NG368: keine Anwendung von Isoxaflutol-haltigen Mitteln im Folgejahr.

VA277: Bei angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, muss ein Abstand von 5 m eingehalten werden und mit Abdriftminderung von mindestens 50% behandelt werden.



Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft

LfL

Institut für Pflanzenschutz

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt, für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!

Herbologie / © K. Gehring, S. Thyssen
Stand: Februar 2025