

09.01.2017

**B36 - Winterbegrünung mit Wildsaaten (wildtiergerechter Zwischenfruchtanbau)
„Maisfruchtfolge (mit frostunempfindlichen/ spätsaatverträglichen Arten)“**

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	%
1	<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Sandhafer	15,0
2	<i>Brassica napus</i>	Winterraps (3 Sorten: 1 Teil "frühe", 2 Teile "mittelfrühe", 1 Teil "späte")	4,0
3	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>medullosa</i> Thell.	Markstammkohl	4,5
4	<i>Brassica rapa</i>	Winterrübsen	4,5
5	<i>Calendula officinalis</i>	Ringelblume	1,0
6	<i>Lepidium sativum</i>	Kresse	15,0
7	<i>Lolium multiflorum</i>	Welsches Weidelgras	10,0
8	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Espарsette	3,0
9	<i>Ornithopus sativus</i>	Echte Seradella	4,0
10	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Phazelie	2,0
11	<i>Pisum sativum</i>	Wintererbse	15,0
12	<i>Raphanus sativus</i>	"Ölrettich; Nematoden resistente Sorte (Heterodera schachtii)"	1,0
13	<i>Sinapis alba</i>	Weißer Senf	5,0
14	<i>Trifolium hybridum</i>	Schwedenklee	2,0
15	<i>Trifolium incarnatum</i>	Inkarnat-Klee	2,0
16	<i>Vicia sativa</i>	Saatwicke	10,0
17	<i>Vicia villosa</i> Roth s. l.	Zottel-Wicke	2,0
		SUMME %	100
		Anzahl Arten	17