

Blaue Lupine ökologisch- Sortenbeschreibung in Bayern

Die Grundlage dieser Beschreibungen bilden die Ergebnisse der bayerischen Landessortenversuche sowie die Einstufungen in der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes (BSA).

Nach Prüffahren und alphabetisch sortiert

| Wuchstyp ¹⁾ | Sorte | Prüffahre | Bitterstoffgehalt* | Blütenfarbe* | Ornamentierung des Korns* | Kornertrag | Rohproteinertrag ²⁾ | Rohproteingehalt ²⁾ | TKG | Massenbildung in der Anfangsentwicklung | Pflanzenlänge | Standfestigkeit | Anfälligkeit für Nachblüher | Reifeverzögerung des Strohs | Neigung zum Platzen auf dem Feld | Ausfall Körner |
|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| v | Boregine | 2016-2021 | bitterstoffarm | weiß | keine | o | (-) | o | + | + | (+) | (+) | (-) | - | (-) | (-) |
| v | Probor | 2016-2021 | bitterstoffarm | blau | braun | (-) | o | + | (-) | (-) | o | o | (+) | o | o | o |
| v | Salsa | 2018-2021 | bitterstoffarm | weiß | keine | (+) | (+) | o | (-) | (-) | (+) | (-) | o | o | (+) | (+) |
| v | Bolero | 2019-2021 | bitterstoffarm | blau | mehrfarbig | (+) | (+) | o | o | + | o | o | (-) | o | (+) | (+) |
| v | Carabor | 2019-2021 | bitterstoffarm | blau | mehrfarbig | o | o | o | o | o | o | (+) | o | (+) | (+) | (+) |

¹⁾ Wuchstyp: v = verzweigt

²⁾ Beschreibung aus dem Vorjahr, da Untersuchungsergebnisse aus 2021 noch nicht vorliegen

* nach der beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes

TKG=Tausendkorngewicht

Blaue Lupine, in Vorjahren geprüfte Sorten

| Wuchs- typ ¹⁾ | Sorte | Prüfjahre ²⁾ | Bitterstoffgehalt* | Blütenfarbe* | Ornamentierung des Korns* | Kornertrag | Rohproteinertrag ³ | Rohproteingehalt ³ | TKG | Massenbildung in der Anfangsentwicklung | Pflanzenlänge | Bestandeshöhe bei Ernte | Standfestigkeit | Anfälligkeit für Nach- blüher | Reifeverzögerung des Strohs | Neigung zum Platzen auf dem Feld | Ausfall Körner |
|-----------------------------|---------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| v | Mirabor | 2015-2017 | bitter- stoffarm | violett | Beige | 0 | 0 | 0 | (+) | | (+) | 0 | (-) | (-) | | | |
| e | Boruta | 2016-2018 | bitter- stoffarm | violett | braun | (-) | (-) | o | (-) | | (-) | (-) | + | (+) | | | |

* nach der beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamts

1) Wuchstyp: v = verzweigt; e = endständig

Zeichenerklärung für die Sortenbeschreibung

| | |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| +++ | sehr gut, sehr hoch, sehr lang |
| ++ | gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, lang bis sehr lang |
| + | gut, hoch, lang |
| (+) | mittel bis gut, mittel bis hoch, mittel bis lang |
| 0 | mittel |
| (-) | mittel bis schlecht, mittel bis gering, mittel bis kurz |
| - | schlecht, gering, kurz |
| -- | schlecht bis sehr schlecht, gering bis sehr gering, kurz bis sehr kurz |
| --- | sehr schlecht, sehr gering, sehr kurz |