

# Information zu Getreideherbiziden für die Frühjahrsanwendung 2025

Teil II: Mittel gegen Unkräuter

Präparat	Wirkstoffe und Wirkstoffkonzentration (g/l bzw. kg)	HRAC-Wirkgruppe	Maximale Aufwandmenge / ha	Kosten €/ha <sup>1)</sup>	Anwendung in Kultur:	BBCH-Stadium	Wirkung auf Leitunkräuter:													
							Ackerhohlzahn	Ehrenpreis	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich	Kornblume	Ausfall-Raps	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere	Amper	
Alliance, ...u.a.	Metsulfuron 58 + Diflufenican 600	2 + 12	100 g	27	WW,WG,WR,WT SW,SG	13 - 29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ariane C	Florasulam 2,5 + Fluroxypyr 100 + Clopyralid 80	2 + 4	1,0 - 1,5 l	35 - 53	WW,WG,WR,WT,DI SG,SW,SH	13 - 39 13 - 30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Artus	Metsulfuron 100 + Carfentrazone 400	2 + 14	50 g	30	WW,WG,WR,WT,WH SG,SW,ST,SH	13 - (25) 29 (32)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aurora	Carfentrazone 400	14	50 g	19	WW,WG,WR,WT SW,SG,ST,SH	13 (21) - 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
(Biathlon 4D) + Dash	Florasulam 54 + Tritosulfuron 714	2	70 g + 1,0 l FHS	37	WW,WG,WR,WT,WDU,WH,DI SW,SG,SR,ST,SDU,SH	13 - 39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Concert SX, ...u.a.	Metsulfuron 40 + Thifensulfuron 400	2	100 g	27	WW,WR,WT,WH SW,SG,ST,SH	13 - 29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dirigent SX, ...u.a.	Metsulfuron 143 + Tribenuron 143	2	35 g	23	WW,WG,WR,WT SW,SG,SH	13 - 30 (37)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duplosan DP	Dichlorprop-P 600	4	1,3 l	30	WW,WG,WR,WH SW,SG,SH	13 - 29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duplosan Super	Dichlorprop-P 310 + MCPA 160 + Mecoprop-P 130	4	2,5 l	44	WW,WG,WR,WT,WDU,WH,DI SW,SG,SR,ST,SDU,SH	10 - 30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Finy, ...u.a.	Metsulfuron 200	2	25 - 30 g	8 - 10	WW,WG,WT,WH SW,SG,ST,SH	13 - 29 (32)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fox	Bifenox 480	14	0,75 l	27	WW,WG,WR,WT	21 - 29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gentis	Fluroxypyr 90 + 2,4-D 360	4	1,25	27	WW,WG,WT,WH SW,SG,SR,ST,SH	13 - 31	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kinvara	MCPA 233 + Fluroxypyr 50 + Clopyralid 28	4	3,0 l	64	WW,WG,WR,WT,WH SW,SG,SR,ST,SH	24 - 39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Omnera LQM	Metsulfuron 5 + Thifensulfuron 30 + Fluroxypyr 135	2 + 4	1,0 l	39	WW,WG,WR,WT SW,SG	21 - 39 12 - 39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pixie Pack Saracen Delta + Duplosan Super	Diflufenican 500 + Florasulam 50 + Mecoprop-P 130 + Dichlorprop-P 310 + MCPA 160	2 + 4 + 12	0,1 l + 1,0 l	33	WW,WG SG	13 - 30 21 - 30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pixxaro EC	Halauxifen 12 + Fluroxypyr 280	4	0,5 l	30	WW,WG,WR,WT,WDU,DI SW,SG,SR,SDU	13 - 45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pointer Plus	Florasulam 105 + Metsulfuron 80 + Tribenuron 80	2	50 g	33	WW,WG,WR,WT SW,SG,SH	12 - 39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pointer SX, ...u.a.	Tribenuron 500	2	37,5 - 60 g	20 - 31	WW,WG,WR,WT,WH SW,SG,ST,SH	13 - 30 (37) 13 - 30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus Perfect	Florasulam 25 + Clopyralid 300	2 + 4	0,2 l	31	WW,WG,WR,WT,DI SW,SG,SH,SDU	13 - 32 13 - 29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Saracen, ...u.a.	Florasulam 50	2	0,1 (0,15) l	14 (21)	WW,WG,WR,WT SW,SG,SH	13 - 39 13 - 29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Saracen Delta	Florasulam 50 + Diflufenican 500	2 + 12	0,1 l	16	WW,WG SG	13 - 32 21 - 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Saracen Max	Florasulam 200 + Tribenuron 600	2	25 g	folgt	WW,WG,WR,WT,WH SG,SH	12 - 39 12 - 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tomigan XL, ...u.a.	Florasulam 2,5 + Fluroxypyr 100	2 + 4	1,5 l	39	WW,WG,WR,WT SW,SG,SH	13 - 39 13 - 29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tomigan 200, ...u.a.	Fluroxypyr 200	4	0,9 l	21	WW,WG,WR,WT,DI SW,SG,SH	(13) 21 - 32 (45) 13 - 39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
U 46 M-Fluid, ...u.a.	MCPA 500	4	1,4 l	23	WW,WG,WR,WT,WDU,DI SW,SG,SH,SR,SDU	13 - 39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zypar	Halauxifen 6 + Florasulam 5	2 + 4	1,0 l	36	WW,WG,WR,WT,WDU,DI SW,SG,SR,SDU	13 - 45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Die Einstufung der Herbizide erfolgte nach eigenen Erkenntnissen unter praxisüblichen Bedingungen und Standardanwendung der Mittel. (...) = Zulassung abgelaufen, Aufbrauchfrist bis 07.11.2025!

\*) Gefahr der Resistenzentwicklung bei regelmäßiger Anwendung! #) Mindenwirkung gegen Clearfield-Ausfallraps

1) Preise nach aktueller Handelsliste für Großgebäude, ohne Mehrwertsteuer

HRAC-Wirkgruppe: Gleiche Zahl = gleiche biochemische Wirkung = gleiches Resistenzrisiko

BBCH-Stadium = Entwicklungsstadium, z.B. 13 = 3. Blatt, 29 = Bestockungsende

Symbolklärung: ● sehr gute ● gute ● mittlere ● geringe ○ keine Wirkung

Bindend für die Anwendung ist die Gebrauchsanleitung der einzelnen Präparate!

WW = Winterweizen, WG = Wintergerste, WR = Winterroggen, WT = Wintertriticale, WH = Winterhafer, WDU = Winterdurum bzw. Winterhartweizen, DI = Dinkel  
SW = Sommerweizen, SG = Sommergerste, SR = Sommerroggen, ST = Sommertriticale, SH = Sommerhafer, SDU = Sommerdurum bzw. Sommerhartweizen



Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft  
Institut für Pflanzenschutz

Herbologie / © K. Gehring, S. Thyssen  
Stand: März 2025