

## Infos zum Getreide

## Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Accurate	WW,SW,WG,SG, WT,ST,WH,SH	07 09	NT103	F	20 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29 in Sommer- und Wintergetreide gegen Unkräuter.
		WW,WG,WT,WH		NW 5(*/*/*)m NT103		F	30 g
	Accurate Extra	WW		NW 10(5/5/*)m NT103, NW800	F	70 g	Im Frühjahr von BBCH 13-49 gegen Unkräuter, ausgenommen Ehrenpreis und Klettenlabkraut.
		SW,SG				NW 10(5/5/*)m NT103	
	Activus SC	WW,WG,WR,WT	08 09	NW -(-/-/10)m NW705 NT145-1,146,170	F	4,0 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 11-13 gegen Unkräuter außer Kamille-Arten. Tankmischpartner zur Ungrasbekämpfung. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Alliance	WW,SW,WG,SG, WR,WT	07 09	NW -(15/5/5)m NW701, NT101	F	100 g	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter und Windhalm. Gegen Windhalm sehr früher Einsatz möglichst mit Ergänzungspartner notwendig.
65 g						Im Herbst im Nachauflauf von BBCH 10-29 gegen Unkräuter. Als Ergänzungspartner zu gräserwirksamen Präparaten geeignet.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Ariane C	WW,SW,WG,SG,WR,WT,DI,SH	07 08 09	NT101-1 mit 1,0 l/ha; NT102-1 mit 1,5 l/ha	F	1,0 - 1,5 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr in Wintergetreide mit 1,0 l/ha von BBCH 21-29 und mit 1,5 l/ha von BBCH 30-39, in Sommergetreide von BBCH 13-39 mit 1,5 l/ha gegen Unkräuter und Acker-Kratzdistel.
	Artus	WW,SW,WG,SG,WR,WT,H	07 09	NW 5(*/*/*)m NT102	F	50 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29, in Hafer nur bis BBCH 25, in WW bis BBCH 32 gegen Unkräuter.
	Aurora	WW,SW,WG,SG,WR,WT,SH	07	NT103	F	40 - 50 g	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32, bzw. in WW und WG von BBCH 13-32 gegen Ehrenpreis, Taubnessel und Klettenlabkraut. Sonnige Witterung sichert die Wirkung ab.
	Boudha	WW,SW,WG,SG,WR,WT,SH	08 09	NW 5(5/*/*)m NT103	F	20 g	Im Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis-Arten.
	Cleanshot	WW,WG,WR,WT	07 09	NT101	F	95 g	Im Herbst im Nachauflauf von BBCH 10-13 gegen Unkräuter und Ausfallraps, einschließlich Clearfield-Ausfallraps. Als Mischpartner für gräserwirksame Bodenherbizide im frühen Einsatz.
	Concert SX, ...u.a.	SW,SG,H		NW 5(5/*/*)m NW701, NW800, NT108	F	100 g	Im Nachauflauf von BBCH 13-29 gegen Unkräuter außer Ehrenpreis und Klettenlabkraut. Nebenwirkung gegen Distel, Ziest, Minze und Ampfer.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Connex	WW	09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT102, NW800	F	70 g	Im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Unkräuter, ausgenommen Ehrenpreis und Klettenlabkraut. In Sommergetreide max. 60 g/ha. Kombination mit Ergänzungspartner sinnvoll.
		SW,SG	09	NW 15(10/5/*)m NW706, NT101	F	60 g	
	Croupier OD	WW,WG,WR,WT, SW,SG	09	NW 10(5/5/*)m NT109, NW800	F	0,5 - 0,67 l	Im Frühjahr von BBCH 20-39 gegen Unkräuter. In Tankmischung mit gräserwirksamen ALS-Partner 0,5 l/ha ausreichend.
	Director	WW,WG,WT,WR, DU,DI,SW,SG,H	09	NT102-1	F	0,075 - 0,125 l/ha	Nach dem Auflaufen im Herbst und Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter. Im Frühjahr in Wintergetreide von BBCH 30-39 gegen Klettenlabkraut.
	Diflanil 500 SC	WW, WG		NW -(-/20/10)m NW706, NW800, NT108	F	0,25-0,375 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 10-29 gegen Unkräuter. Optimale Wirkung im frühen Nachauflauf bei ausreichender Bodenfeuchte. Geeignet v.a. als Ergänzungspartner mit 0,25 l/ha gegen Stiefmütterchen, Ehrenpreis und Taubnessel. Kein Nachbau von dikotylen Zwischenfrüchten und Winterraps.
	Dirigent SX	WW,SW,G,WR, WT,SH	09	NW 5(*/*/*)m NW701, NT103	F	35 g	Im Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis-Arten.
	Duplosan DP	WW,SW,G,WR,H	05 07	NW 5(*/*/*)m NW701, NT103	F	1,3 l	Im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter.

## Infos zum Getreide

## Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Duplosan Super	WW,SW,G,R,T,H,DU,DI	05 07 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NG403, NT109	F	2,0 - 2,5 l	Im Frühjahr von BBCH 11-30 gegen Unkräuter. Im Sommergetreide 2,0 l/ha ausreichend.
	Finy, ...u.a.	WW,WG,WT,WH	09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	30 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29 in Sommer- bzw. bis BBCH 32 in Wintergetreide gegen Unkräuter. Nebenwirkung gegen Disteln, Ziest, Minze.
		SW,SG,ST,SH				25 g	
	Flame	WW,DU,WG,EM,EK,KW,SG,SR,SW,ST	07 08 09	NW 5(5/*/*)m NT109, NW706	F	30 g	Im Frühjahr von BBCH 13-49 gegen Vogelmiere, Kornblume, Acker-Senf, Vergissmeinnicht und weitere Unkräuter. Auch in Khorasan-Weizen zugelassen.
	Fox	WW,WG,WR,WT	09	NW 5(5/*/*)m NW701, NT101	F	1,5 l	Im Frühjahr von BBCH 21-29 gegen Unkräuter. Speziell gegen Stiefmütterchen. Auch bei Grasuntersaaten ab BBCH 13 einsetzbar.
	Gentis	WW,WG,WR,WT,SW,SG,SR,ST,SH	07 08	NW 5(5/*/*)m NW706, NT102-1	F	1,25 l	Im Frühjahr von BBCH 13-31 gegen Unkräuter.
	Kinvara	WW,SW,WG,SG,WH,SH,WR,SR,WT,ST	07 09	NW 10(5/5/*)m NT108	F	3,0 l	Im Frühjahr von BBCH 24-39 gegen Unkräuter. Zur Spätbehandlung geeignet.
	Omnera LQM	WW,SW,WG,SG,WR,WT	07 09	NW 15(10/5/5)m NW701, NW800, NT109	F	1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 21-39 in Wintergetreide und BBCH 12-39 in Sommergetreide gegen Unkräuter. In Sommergetreide 0,75 l/ha ausreichend.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
Breitblättrige Unkräuter	Pointer SX	WW,WG,WR,T		NT103	F	60 g (Frühjahr)	Im Nachauflauf im Herbst und Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Unkräuter außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis. In Wintergetreide zur Spätbehandlung gegen Acker-Kratzdistel zugelassen.	
		SW,SG,H		NT102		45 g		
		WW,WG,WR,T				30 g (Herbst)		
	Pointer Plus	WW,SW,WG,SG,WR,WT,SH	07 09		NW 5(5/*/*)m NT108	F	50 g	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Unkräuter und Acker-Kratzdistel.
	Pixxaro EC	WW,SW,WG,SG,WR,SR,WT,DI,WD U,SDU	07 09		NW 10(5/5/*)m NW706, NT103	F	0,5 l	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-45 gegen Unkräuter.
	Primus Perfect	WW,SW,WG,SG,WR,WT,DI,SH,SDU	09		NW 5(*/*/*)m NT103	F	0,2 l	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-30 in Sommergetreide, bzw. 13-32 in Wintergetreide gegen Unkräuter. In Tankmischungen Reduzierung sinnvoll. Früher Einsatz unter kühlen Bedingungen möglich.
	Saracen	WW,SW,WG,SG,WR,WT,SH	09		NT109	F	75 ml (Herbst) 100 ml (Frühjahr)	Im Herbst und Frühjahr im Nachauflauf von BBCH 13-29 gegen Unkräuter. In Tankmischung Reduzierung auf 50-75 ml/ha möglich.
Saracen Delta	WW,WG,WT,SG	09		NW 5(5/5/*)m NW705(Herbst), NW706(Frühjahr), NT108	F	75 - 100 ml	Im Nachauflauf von BBCH 13-32 in Wintergetreide und von BBCH 21-32 in Sommergetreide gegen Unkräuter. In Sommergetreide 75 ml/ha ausreichend. Unterschiedliche Hangaufgabe je nach Anwendungstermin beachten.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Saracen Max	WW,WG,SG,WR,WT,SH		NW 5(5/*/*)m NT109	F	20 - 25 g	Im Frühjahr von BBCH 12-39 in Wintergetreide und BBCH 12-32 gegen Unkräuter. In Sommergetreide 20 g/ha ausreichend.
	Sempra	WW,WG,WR	09	NW -(-/20/10)m NW706, NW800, NT108	F	0,25 - 0,375 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 10-29 gegen Unkräuter. Optimale Wirkung im frühen Nachauflauf bei ausreichender Bodenfeuchte. Geeignet v.a. als Ergänzungspartner mit 0,25 l/ha gegen Stiefmütterchen, Ehrenpreis und Taubnessel. Kein Nachbau von dikotylen Zwischenfrüchten und Winterraps.
	Stomp Aqua	WW,WG,WR,WT,DI	07 08 09	NW -(-/-/5)m NT112, NW705, NT145,146,170	F	2,5 - 3,0 l	Im Nachauflauf-Herbst gegen Unkräuter. Tankmischpartner zur Gräserbekämpfung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Tandus	WW,WG,WR,WT,WDU,WH SW,SG,SH	07 08 09	NT102 NT101		1,0 l 0,75 l	Im Frühjahr von BBCH 12-32, in WW und WG bis BBCH 49, gegen Unkräuter. Von BBCH 12-32 in SH, in SW und SG bis BBCH 49, gegen Unkräuter.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schadereger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Tomigan 200, ...u.a.	WW,SW,WG,SG, WR,WT,SH,DI	05 07 08 09	NT101 NT108	F	0,5 - 0,9 l	Gegen Unkräuter im Frühjahr in Wintergetreide von BBCH 13-32, in Dinkel von BBCH 21-32, in Sommergetreide von BBCH 13-39. In BBCH 21-32 gilt für alle Getreidearten NT101, davor und danach NT108.
	Tomigan XL, ...u.a.	WW,SW,WG,SG, WR,WT,SH	07 09	NW 5(5/*/*)m NT108	F	0,75 - 1,5 l	Im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter und Kletten-Labkraut. In Wintergetreide Spätbehandlung gegen Kletten-Labkraut bis BBCH 39 möglich.
	Trimmer WG	WW,WG,WR,WT	07 09	NW 5(*/*/*)m NT108, NW800 NT103	F	60 g (Frühjahr)	Im Nachauflauf im Herbst oder Frühjahr von BBCH 13-29 in Wintergetreide und von BBCH 12-39 in Sommergetreide gegen Unkräuter. In Tankmischung Aufwandmengenreduzierung möglich.
		SW,SG				30 g	
		WW,WG,WR,T				30 g (Herbst)	
U 46 M-Fluid, ...u.a.	WW,WG,R,WT, DI,WDU,SDU,SW, SG,SH	05 07 09	NT108	F	1,4 l	Im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Unkräuter. Nebenwirkung gegen Acker-Kratzdistel, Winden und Schachtelhalm. Auch bei Grasuntersaaten ab BBCH 13 einsetzbar. In Rotklee-Untersaaten möglich.	
Zypar	WW,SW,WG,SG, WR,SR,WT,DU,DI	07 09	NW 10(5/5/*)m NW 5(5/5/*)m NW706, NT102	F	1,0 l (Frühjahr) 0,75 l (Herbst)	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-45 mit 1,0 l/ha und im Herbst von BBCH 11-29 mit 0,75 l/ha gegen Unkräuter. Unterschiedliche Aufwandmenge und Auflagen im Herbst und Frühjahr beachten.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Addition	WW,WG,WR,WT		NW -(-/-/5)m NW706, NW800 NT145,146,170	F	2,5 l	Im frühen Nachauflauf im Herbst von BBCH 11-13 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter) vermeiden. Ergänzung mit Windhalm-fähigen Tankmischpartner sinnvoll.
	Attribut	WW,WR,WT	09	NW 5(5/*/*)m NT102 NW701, NW800	F	60 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Windhalm. Früher Einsatz und Ergänzung gegen Unkräuter notwendig.
	Avoxa	WW,WR,WT	07 08 09	NW 5(5/5/*)m NT109	F	1,35 l	Im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Windhalm, Weidelgras und Unkräuter. Gegen breite dikotyle Verunkrautung Mischpartner notwendig. Aufgrund der Kombination der beiden Wirkmechanismen ACCase-Hemmer und ALS-Hemmer wird der Einsatz als kritisch hinsichtlich des Resistenzmanagements gesehen.
	Axial Komplett	WW,SW,WG,SG, WR,WT,SDU	07 08 09	NT102	F	1,0 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr in BBCH 13-29 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter. Auch Herbstesatz ab BBCH 13 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Unkräuter möglich.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schadereger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	BeFlex	WW,WG,WR,WT		NW 10(5/5/*)m NW701	F	0,5 l	Im Herbst ab dem Auflaufen von BBCH 09-25. Optimal im sehr frühen Einsatz. Tankmischung mit Gräser-Partner empfehlenswert.
	BeFlex Pro = Piroseo + BeFlex	WW,WG,WR,WT	07 09	NW -(-/*)m NW706, NT145,146,170, VA320	F	2,5 + 0,5 l	Im Herbst ab dem Auflaufen von BBCH 09-12 gegen Windhalm und Unkräuter. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Boxer, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	07 09	NW -(-/*)m NW706, NT145,146,170, VA320	F	3,0 l	Im Herbst vom Voraufbau bis BBCH 12 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Als Tankmischpartner zur Ungrasbekämpfung geeignet. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Broadway Plus	WW,WR,WT, WDU,DI	07 09	NW -(15/10/5)m NW706 NT108	F	62,5 g + 1,0 l Netzmittel	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Windhalm und Unkräuter. In der Regel 50 g/ha + 0,8 l/ha Netzmittel ausreichend.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Carmina 640	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NG404,405,414, NG337, NT103	F	2,5 l	Im Herbst von BBCH 10-29 gegen Windhalm und Unkräuter. Früher Einsatz bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit notwendig. Sortenverträglichkeit bei Weizen beachten! Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Carmina Complet = Carmina 640 + Alliance	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW 20(10/5/5)m NW701, NG404,405,414, NG337,NT103	F	1,5 l + 65 g	Im Herbst von BBCH 10-29 gegen Windhalm und Unkräuter. Früher Einsatz sinnvoll. Sortenverträglichkeit bei Weizen i.d.R. unproblematisch. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Concert SX	WW,WR,T		NW 5(5/5/*)m NW706,NW800 NT108	F	150 g	Im Nachauflauf von BBCH 13-29 gegen Windhalm und Unkräuter, außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis. Nebenwirkung gegen Distel, Ziest, Minze und Ampfer.
	Compola	WW,WG,WR,WT	05 07 09	NW -(10/5/5)m NW706,NT103, VA277	F	3,0 l	Im Herbst im Nachauflauf von BBCH 10-14 gegen Windhalm, Rispengras und Unkräuter.
	Daltrice + Efortol	WW,WR,WT	05 09	NW 5(*/*/*)m NT108-1,NT140	F	0,3 kg + 0,6 l	Im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Fantasia Gold	WW,WG,WR,WT, WDU,DI	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW706,VA282	F	3,0 - 5,0 l	Im Herbst vom Voraufbau bis BBCH 21 gegen einjährige Unkräuter und Ungräser. Als Tankmischkomponente in reduzierter Aufwandmenge zur Gräserbekämpfung geeignet. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Husar Plus + Mero	WW,WR,WT,DI	05 07 09	NW 5(*/*/*)m NT103, NW800	F	0,2 + 1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Windhalm, Jährige Rispe, Weidelgras-Arten, und Unkräuter.
		SW,SG,SDU		NT103		0,15 + 0,75 l	Nach dem Auflaufen von BBCH 13-30 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter.
	Jura Max, Boxer Evo	WW,WG,WR,WT, WDU,DI	05 07 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103-1	F	3,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 10-13 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Als Tankmischkomponente zur Ungrasbekämpfung geeignet. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Kuntao	WW,WG,WR,WT, WDU,DI	07 08 09	NW -(20/10/*)m NW706, NT102-1, VA320	F	0,7 l	Im Herbst im Voraufbau gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Als Tankmischkomponente zur Ungrasbekämpfung geeignet.
						0,625 l	Im Herbst im Nachaufbau von BBCH 10-13 gegen Windhalm und Unkräuter. Als Tankmischkomponente zur Ungrasbekämpfung geeignet.
	Lentipur 700, ...u.a.	WW,WG,WR,WT		NW 10(5/5/*)m NG404, NG405, NG414, NG337, NT103	F	3,0 l	Vor dem Auflaufen in WW,WR und WG; nach dem Auflaufen im Herbst in WW,WG und WT (BBCH 11-29) gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter; im Frühjahr in WW und WG bis BBCH 29. Bevorzugt als Herbstbehandlung. Die Ungräser sollten nicht mehr als 2 Blätter haben. Sortenverträglichkeit bei Weizen beachten! Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
Mateno Trio Set = Mateno Duo + Cofeno	WW,WG,WR,WT, WDU	07 08 09	NW -(20/10/5)m NW706, NT109	F	0,35 l + 1,5 l	Im Herbst von Vor- bis frühen Nachaufbau in BBCH 13 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.	

### Infos zum Getreide

### Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Niantic + Probe	WW	05 07 09	NT103	F	0,15 kg + 0,3 l	Im Herbst ab BBCH 11 und im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Windhalm. Ergänzung gegen dikotyle Unkräuter notwendig.
	Sumimax, Bridge Extra 50 WG	WW	08 09	NW 10(5/5/*)m NW706,803	F	60 g	Im Herbst im Voraufbau bis frühen Nachaufbau von BBCH 09-14 gegen Windhalm und Unkräuter. Sehr früher Einsatz wird empfohlen.
	Trinity	WW, WG, WR, WT, WDU	08 09	NW -(-/-/5)m NT145,146,170 NW706,800, NG337	F	2,0 l	Im Herbst im frühen Nachaufbau von BBCH 10-13 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Viper Compact	WW, WG, WR, WT, WDU, EM, EK	09	NW -(-/-/15/10)m NW706,800, NT103	F	1,0 l	Im Herbst im frühen Nachaufbau von BBCH 10-23 gegen Windhalm und Unkräuter. Aufgrund hohen ALS-Resistenzrisikos bei Windhalm Anwendungshäufigkeit minimieren und Anwendung in Mischung mit Flufenacet- oder CTU-haltigen Präparaten bevorzugen, sowie keine Nachbehandlung mit Sulfonylharnstoff-Präparaten im Frühjahr gegen Windhalm vornehmen!

### Infos zum Getreide

### Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Atlantis Flex	WW,WT,WR, WDU,DI	07 09	NW 5(*/*/*)m NW800, NT103	F	0,2 kg + 0,6 l Biopower	Im Nachauflauf im Frühjahr bis BBCH 32 gegen Acker-Fuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter.
		WW,WT,WDU		NW 5(5/*/*)m NW701,800, NT103		0,33 kg + 1,0 l Biopower	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Acker-Fuchsschwanz, Flughafer, Trespens, Weidelgras und Unkräuter.
	Attribut	WW	09	NW 5(5/5/*)m NW706, NW800 NT103	F	100 g	Im Nachauflauf Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Ackerfuchsschwanz auf mittleren bis schweren Böden. Kein Nachbau von dikotylen Zwischenfrüchten und Winterraps möglich!
	Avoxa	WW,WR,WT	07 08 09	NW 5(5/5/*)m NT109	F	1,8 l	Im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Ackerfuchsschwanz, Trespens und Unkräuter. Gegen breite dikotyle Verunkrautung Mischpartner notwendig. Aufgrund der Kombination der beiden Wirkmechanismen ACCase-Hemmer und ALS-Hemmer wird der Einsatz als kritisch hinsichtlich des Resistenzmanagements gesehen.
	Axial Komplett	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NT102	F	1,0 - 1,3 l	Nach dem Auflaufen in BBCH 13-29 im Herbst mit 1,0 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Unkräuter, im Frühjahr mit 1,3 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Weidelgras und Unkräuter.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Broadway Plus	WW,WR,WT, DU,DI	07 09	NW 10(5/5/*)m NT108-1, NT140	F	62,5 g + 1,0 l Netzmittel	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Ackerfuchsschwanz. Gute Nebenwirkung gegen Trespens.
	Current	WW,WR,WT	05 09	NW 5(5/*/*)m NW800, NT108-1	F	0,4 - 0,5 kg	Im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Unkräuter und Ungräser. Netzmittel-Zusatz sinnvoll.
	Daltrice + Efortol	WW,WR,WT	05 09	NW 5(5/*/*)m NW800, NT108-1, NT140	F	0,4 - 0,5 kg + 0,8 - 1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Unkräuter und Ungräser. Speziell gegen Ackerfuchsschwanz, Weidelgras und Trespens-Arten. Ergänzung gegen Unkräuter bei Bedarf.
	Fantasia Gold	WW,WG,WR,WT, WDU,DI,SG	07 08 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT101-1	F	5,0 l	Im Herbst von Vor- bis Nachauflauf in BBCH 21 gegen einjährige Unkräuter und Ungräser. Mit 2,5-3,0 l/ha als Tangmischpartner zur Ungrasbekämpfung geeignet. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse) vermeiden.
	Incelo Komplett = Incelo + Biopower + Husar OD	WW,WT,WDU	07 09	NW 5(5//5/*)m NW706, NW800 NT102-1	F	0,3 kg + 1,0 l + 0,1 l	Im Frühjahr ab BBCH 20 bis BBCH 32 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe, Weidelgras- und Trespens-Arten, Flughafer und Unkräuter.

### Infos zum Getreide

### Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Mateno Trio Set = Mateno Duo + Cofeno	WW,WT	07 08 09	NW -(-/20/10)m NW706, NT109	F	0,7 l + 3,0 l	Im Herbst im Voraufbau von BBCH 00-09 gegen Acker-Fuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
		WW,WG,WR,WT, WDU		NW -(20/10/5)m NW706, NT109		0,35 l + 3,0 l	Im Herbst von Vor- bis frühen Nachaufbau in BBCH 13 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Jura Max, Boxer Evo	WW,WG,WR,WT, WDU,DI	05 07 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103-1	F	3,2 l	Im Herbst im Voraufbau von BBCH 05-09 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Als Tankmischkomponente zur Ungrasbekämpfung geeignet. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

### Infos zum Getreide

### Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Niantic + Probe	WW	05	NT108	F	0,3 kg	Im Herbst ab BCHH 11 mit 0,3 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz und Rispen-Arten sowie mit 0,4 kg/ha gegen starken Ackerfuchsschwanz-Besatz und Taube Trespe. Im Frühjahr von BBCH 13-32 mit 0,3 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Rispen, Kamille und Vogelmiere; von BBCH 13-30 mit 0,4 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Weidelgras, Flughafer und Unkräuter, mit 0,5 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz und Taube Trespe. Ergänzung gegen dikotyle Unkräuter erforderlich, AHL kann zur Wirkungsunterstützung beitragen.
			07	NW800		+ 0,6 l	
			09	NT109 NW800		0,4 kg + 0,8 l	
				NT109 NW701,800		0,5 kg + 1,0 l	
Ackerfuchsschwanz und weitere Ungräser	Altivate 6 WG	WW,WR,WT	09	NW 5(*/*/*)m NW 701	F	0,15 kg + 0,6 l FHS  0,25 kg + 1,0 l FHS	Nach dem Auflaufen im Frühjahr in BBCH 20-32 mit 0,15 kg/ha gegen Windhalm und jährige Rispe. Mit 0,25 kg/ha nur in Winterweizen gegen Ackerfuchsschwanz, Flughafer und Weidelgras. Dikotyle Ergänzung erforderlich.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz und weitere Ungräser	Axial 50	WW,SW,WG,SG,WR,WT,DI,DU	07 08 09	NT101/101-1	F	0,9 l  1,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst in BBCH 13-29 mit 0,9 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Weidelgräser. Im Frühjahr in BBCH 13-39 mit 0,9 l/ha gegen Windhalm und Flughafer oder mit 1,2 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz und Weidelgräser. Kulturspezifische Indikationen beachten.
	Sword 240 EC	WW,WR,WT,WDU	07 08 09		F	0,25 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 11-29 oder im Frühjahr von BBCH 21-31(39) gegen Acker-Fuchsschwanz, Flughafer und Weidelgras in BBCH 13-15. Ergänzung mit geeigneten Zusatzstoff, wie z.B. Hasten oder Kantor, empfehlenswert. Alternativer Wirkmechanismus zu Sulfonylharnstoff-präparaten im Resistenzmanagement.
	Traxos	WW,WR,WT	07 08 09	VA320	F	1,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst und Frühjahr von BBCH 13-31 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Weidelgras-Arten. Alternativer Wirkmechanismus zu Sulfonylharnstoff-präparaten im Resistenzmanagement.

### Infos zum Getreide

### Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Flughafer	Axial Komplett	SW,SG,SDU	07 08 09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	1,0 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter.
	Husar Plus + Mero	SW,SG,SDU	05 07 09	NW 5(5/*/*)m NT108	F	0,15 l + 0,75 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter.
	Broadway Plus	SW,SDU	07 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT103	F	40 g + 0,6 l Netzmittel	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Flughafer, Stiefmütterchen, Winden- und Vogel-Knöterich.
Taube Tresse, Gemeine Quecke	Attribut	WR,WT,DI	09	NW 5(5/*/*)m NT102 NW701, NW800	F	60 g	Im Nachauflauf Frühjahr von BBCH 13-29 zur Niederhaltung von Quecke und Tauber Tresse. Zusatz von Mero verbessert die Wirkung.
		WW		NW 5(5/*/*)m NT103 NW701, NW800		100 g	
Tresse-Arten, Weidelgras-Arten und Flug-Hafer	Atlantis Flex	WW,WT,WDU	07 09	NW 5(5/*/*)m NW701,800, NT103	F	0,33 kg + 1,0 l FHS	Im Frühjahr nach dem Auflaufen von BBCH 21-32. Möglichst frühzeitige Anwendung gegen Tressen und Weidelgräser. Bei Flughafer kompletten Auflauf abwarten.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Taubes Trespe, Flughäfer und Weidelgras-Arten	Niantic	WW	05 07 09	NT109 NW800	F	0,4 kg + 0,8 l FHS	Im Herbst ab BBCH 11 mit 0,4 kg/ha gegen Taubes Trespe. Im Frühjahr von BBCH 13-30 mit 0,4 kg/ha gegen Flughäfer und Weidelgras-Arten, mit 0,5 kg/ha gegen Taubes Trespe. Ergänzung gegen dikotyle Unkräuter erforderlich, AHL kann zur Wirkungsunterstützung beitragen.
				NT109 NW701,800		0,5 kg + 1,0 l FHS	
<b>Spät- und Stoppelbehandlungen gegen Problemunkräuter</b>							
Acker-Kratzdistel	Ariane C	WW,WG,WR,WT, WH,WDI,SW,SG,S DU,SH,SDI,SR	07 08 09	NT102-1	F	1,5 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr ab BBCH 30 in Wintergetreide und ab BBCH 13 in Sommergetreide bis BBCH 39 gegen Acker-Kratzdistel und Samenunkräuter. Nebenwirkung gegen Winden-Arten und Ausfallkartoffeln.
	Dirigent SX	WW,WG,WR,WT		NW 5(*/*/*)m NW701, NT103	F	35 g	Im Frühjahr von BBCH 30-37 gegen Acker-Kratzdistel.
	Pointer Plus	WW,SW,WG,SG, WR,WT,SH	07 09	NW 5(5/*/*)m NT108	F	50 g	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Acker-Kratzdistel, Klettenlabkraut und Unkräuter.
	Pointer SX	WW,WG,WR,T		NT102	F	37,5 g	Im Frühjahr in Wintergetreide in der Schossphase von BBCH 30-37 gegen Acker-Kratzdistel. Ampfer wird mit erfasst.

## Infos zum Getreide

## Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Acker-Kratzdistel	U 46 M-Fluid	WW,SW,WG,SG,WR,SR,WT,DI,WDU,SDU,SH	05 07 09	NT108	F	1,4 l	Im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Acker-Kratzdistel und Unkräuter. Einsatz im Knospenstadium der Distel bei wüchsigem Wetter fördert die Wirkung.
Acker-Kratzdistel, Acker-Winde	U 46 M-Fluid	DI,DU	05 07 09	NT108, nur für DI: NG412	F	1,4 l	Nach dem Auflaufen von BBCH 13-39 gegen Acker-Kratzdistel und Acker-Winde. Ausreichende Blattmasse der Unkräuter und wüchsige Witterung beachten.
Klettenlabkraut	Fluroxane, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NT103	F	0,6 - 1,0 l	In der Schossphase bis BBCH 39 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung auch gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.
	Follow 333	WW,WG,WR,WT,SW,SG	07 09	NW 10(5/5/*)m NT103	F	0,54 l	Spätbehandlung von BBCH 33-45 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung gegen Winden und Durchwuchskartoffeln.
	Tomigan 200, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	05 07 08 09	NT108	F	0,5 - 0,9 l	In der Schossphase bis BBCH 45 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung auch gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.
	Tomigan XL, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	07 09	NW 20(10/5/5)m NT108	F	1,0 - 1,5 l	Im Schossen bis Ligula-Stadium BBCH 30-39 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung auch gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.
Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Flughafer	Axial 50	WW,SW,WG,SG,WR,WT,DI,DU	07 08 09	> 0,9 l/ha: NT101	F	0,9 - 1,2 l	Spätbehandlung bis BBCH 39, gegen Windhalm und Flughafer 0,9 l/ha, gegen Ackerfuchsschwanz 1,2 l/ha. Weidelgräser werden mit erfasst.

**Infos zum Getreide**
***Unkräuter und Ungräser***

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ausfallgetreide und Gemeine Quecke	Clinic Xtreme, ...u.a. #)	Getreidestoppel	09	NG352-1, NT101-1, NT140	F	1,5 - 4,0 l	Nach der Ernte gegen Ausfallgetreide und Quecke. Queckenaustrieb abwarten, min. 3 neue Blätter bzw. 15-25 cm Bestandeshöhe. Wirkungsperiode (1 - 10 Tage) vor Beginn der Bodenbearbeitung bzw. Saatbettbereitung ist vom jeweils eingesetzten Glyphosat-Präparat abhängig. Spritzbrühekonzentration von min. 1-1,5 % einhalten. Zusatz von Netzmittel oder SSA kann die Wirkung unterstützen. Einsatz auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen! Abdrift zuverlässig vermeiden.

**Infos zum Getreide**
***Unkräuter und Ungräser***

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ausfallgetreide und Gemeine Quecke	Kyleo #)	Getreidestoppel	07 09	NW 5(5/*/*) m NW706, NG352-1,405, NT109	F	4,0 - 5,0 l	Nach der Ernte gegen Ungräser und Unkräuter. Aufwandmenge je nach Zielunkraut. Zur Regulierung von Winden und Acker-Schachtelhalm geeignet. Einsatz auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen! Abdrift zuverlässig vermeiden.

\*) Landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!

#) Bei alternativen Glyphosat-Präparaten sind ggf. veränderte Anwendungsbestimmungen zu beachten.

Generelle Anwendungsverbote auf Basis von privatrechtlichen Vereinbarungen (Pacht-, Lieferverträge) und besondere Anwendungsbestimmungen nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten.