

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Accurate	WW,SW,WG,SG, WT,ST,WH,SH	07 09	NT103	F	20 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29 in Sommer- und Wintergetreide gegen Unkräuter.
		WW,WG,WT,WH		NW 5(*/*/*)m NT103	F	30 g	Im Frühjahr von BBCH 30-32 in Wintergetreide gegen Unkräuter.
	Accurate Extra	WW		NW 10(5/5/*)m NT103, NW800	F	70 g	Im Frühjahr von BBCH 13-49 gegen Unkräuter, ausgenommen Ehrenpreis und Klettenlabkraut.
		SW,SG				60 g	
	Activus SC	WW,WG,WR,WT	09	NW -(/-/10)m NW705 NT145-1,146,170	F	4,0 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 11-13 gegen Unkräuter außer Kamille-Arten. Tankmischpartner zur Ungrasbekämpfung. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Alliance	WW,SW,WG,SG, WR,WT	07 09	NW -(15/5/5)m NW701, NT101	F	100 g	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter und Windhalm. Gegen Windhalm sehr früher Einsatz möglichst mit Ergänzungspartner notwendig.
65 g						Im Herbst im Nachauflauf von BBCH 10-29 gegen Unkräuter. Als Ergänzungspartner zu gräserwirksamen Präparaten geeignet.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Ariane C	WW,SW,WG,SG, WR,WT,DI,SH	07 08 09	NT103	F	1,5 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13 bis 30 in Sommergetreide und bis 39 in Wintergetreide gegen Unkräuter und Acker-Kratzdistel.
	Artus	WW,SW,WG,SG, WR,T,H	07 09	NW 5(*/*/*)m NT102	F	50 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29, in Hafer nur bis BBCH 25, in WW bis BBCH 32 gegen Unkräuter.
	Aurora	WW,SW,WG,SG, WR,WT,SH	09	NT103	F	40 - 50 g	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32, bzw. in WW und WG von BBCH 13-32 gegen Ehrenpreis, Taubnessel und Klettenlabkraut. Sonnige Witterung sichert die Wirkung ab.
	Biathlon 4D + Dash EC	WW,SW,WG,SG, WR,SR,WT,ST, DI,WH,SH, WDU,SDU	05 07 08 09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	70 g + 1,0 l	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Acker-Winde, Acker-Kratzdistel und Unkräuter. Als Tankmischpartner mit z.B. Atlantis Flex, Axial 50 oder Traxos geeignet.
	Boudha	WW,SW,WG,SG, WR,WT,SH	09	NW 5(5/*/*)m NT103	F	20 g	Im Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis-Arten.
	Cleanshot	WW,WG,WR,WT	07 09	NT101	F	95 g	Im Herbst im Nachauflauf von BBCH 10-13 gegen Unkräuter und Ausfallraps, einschließlich Clearfield-Ausfallraps. Als Mischpartner für gräserwirksame Bodenherbizide im frühen Einsatz.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Concert SX, ...u.a.	SW,SG,H	09	NW 5(5/*/*)m NW701, NW800, NT108	F	100 g	Im Nachauflauf von BBCH 13-29 gegen Unkräuter außer Ehrenpreis und Klettenlabkraut. Nebenwirkung gegen Distel, Ziest, Minze und Ampfer.
	Connex	WW	09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT102, NW800	F	70 g	Im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Unkräuter, ausgenommen Ehrenpreis und Klettenlabkraut. In Sommergetreide max. 60 g/ha. Kombination mit Ergänzungspartner sinnvoll.
		SW,SG	09	NW 15(10/5/*)m NW706, NT101	F	60 g	
	Croupier OD	WW,WG,WR,WT, SW,SG	09	NW 10(5/5/*)m NT109, NW800	F	0,5 - 0,67 l	Im Frühjahr von BBCH 20-39 gegen Unkräuter. In Tankmischung mit gräserwirksamen ALS-Partner 0,5 l/ha ausreichend.
	Director	WW,WG,WT,WR, DU,DI,SW,SG,H	09	NT102-1	F	0,075 - 0,125 l/ha	Nach dem Auflaufen im Herbst und Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter. Im Frühjahr in Wintergetreide von BBCH 30-39 gegen Klettenlabkraut.
	Diflanil 500 SC	WW, WG	09	NW -(-/20/10)m NW706, NW800, NT108	F	0,25-0,375 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 10-29 gegen Unkräuter. Optimale Wirkung im frühen Nachauflauf bei ausreichender Bodenfeuchte. Geeignet v.a. als Ergänzungspartner mit 0,25 l/ha gegen Stiefmütterchen, Ehrenpreis und Taubnessel. Kein Nachbau von dikotylen Zwischenfrüchten und Winterraps.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Dirigent SX	WW,SW,G,WR,WT,SH	09	NW 5(*/*/*)m NW701, NT103	F	35 g	Im Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis-Arten.
	Duplosan DP	WW,SW,G,WR,H	05 07	NW 5(*/*/*)m NW701, NT103	F	1,3 l	Im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter.
	Duplosan Super	WW,SW,G,R,T,H,DU,DI	05 07 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NG403, NT109	F	2,0 - 2,5 l	Im Frühjahr von BBCH 11-30 gegen Unkräuter. Im Sommergetreide 2,0 l/ha ausreichend.
	Finyl, ...u.a.	WW,WG,WT,WH SW,SG,ST,SH	09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	30 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29 in Sommer- bzw. bis BBCH 32 in Wintergetreide gegen Unkräuter. Nebenwirkung gegen Disteln, Ziest,
						25 g	
	Flame	WW,DU,WG,EM,EK,KW,SG,SR,SW,ST	07 09	NW 5(5/*/*)m NT109, NW706	F	30 g	Im Frühjahr von BBCH 13-49 gegen Vogelmiere, Kornblume, Acker-Senf, Vergissmeinnicht und weitere Unkräuter. Auch in Khorasan-Weizen zugelassen.
	Fox	WW,WG,WR,WT	09	NW 5(5/*/*)m NW701, NT101	F	1,5 l	Im Frühjahr von BBCH 21-29 gegen Unkräuter. Speziell gegen Stiefmütterchen. Auch bei Grasuntersaaten ab BBCH 13 einsetzbar.
	Gentis	WW,WG,WR,WT,SW,SG,SR,ST,SH	07 08	NW 5(5/*/*)m NW706, NT102-1	F	1,25 l	Im Frühjahr von BBCH 13-31 gegen Unkräuter.
Kinvara	WW,SW,WG,SG,WH,SH,WR,SR,WT,ST	07 09	NW 10(5/5/*)m NT108	F	3,0 l	Im Frühjahr von BBCH 24-39 gegen Unkräuter. Zur Spätbehandlung geeignet.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Omnera LQM	WW,SW,WG,SG,WR,WT	07 09	NW 15(10/5/5)m NW701, NW800, NT109	F	1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 21-39 in Wintergetreide und BBCH 12-39 in Sommergetreide gegen Unkräuter. In Sommergetreide 0,75 l/ha ausreichend.
	Pixie Pack = Saracen Delta + Duplosan Super	WW,WG	05 07 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NG403, NT109	F	100 ml + 1,0 l	Im Frühjahr im Wintergetreide von BBCH 13-30 und in der Sommergerste von BBCH 21-30 gegen Unkräuter.
		SG		NW 5(5/5/*)m NW705, NG403, NT109			
	Pointer SX	WW,WG,WR,T  SW,SG,H WW,WG,WR,T	07 09	NT103	F	60 g (Frühjahr)	Im Nachauflauf im Herbst und Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Unkräuter außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis. In Wintergetreide zur Spätbehandlung gegen Acker-Kratzdistel zugelassen.
				NT102		45 g	
						30 g (Herbst)	
Pointer Plus	WW,SW,WG,SG,WR,WT,SH	07 09	NW 5(5/*/*)m NT108	F	50 g	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Unkräuter und Acker-Kratzdistel.	
Pixxaro EC	WW,SW,WG,SG,WR,SR,WT,DI,WDU,SDU	07 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103	F	0,5 l	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-45 gegen Unkräuter.	
Primus Perfect	WW,SW,WG,SG,WR,WT,DI,SH,SDU	09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	0,2 l	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-30 in Sommergetreide, bzw. 13-32 in Wintergetreide gegen Unkräuter. In Tankmischungen Reduzierung sinnvoll. Früher Einsatz unter kühlen Bedingungen möglich.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schadereger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Saracen	WW,SW,WG,SG,WR,WT,SH	09	NT109	F	75 ml (Herbst) 100 ml (Frühjahr)	Im Herbst und Frühjahr im Nachauflauf von BBCH 13-29 gegen Unkräuter. In Tankmischung Reduzierung auf 50-75 ml/ha möglich.
	Saracen Delta	WW,WG,SG	09	NW 5(5/5/*)m NW705(Herbst), NW706(Frühjahr), NT108	F	75 - 100 ml	Im Nachauflauf von BBCH 13-32 in Wintergetreide und von BBCH 21-32 in Sommergetreide gegen Unkräuter. In Sommergetreide 75 ml/ha ausreichend. Unterschiedliche Hangaufgabe je nach Anwendungstermin beachten.
	Saracen Max	WW,WG,SG,WR,WT,SH		NW 5(5/*)m NT109	F	20 - 25 g	Im Frühjahr von BBCH 12-39 in Wintergetreide und BBCH 12-32 gegen Unkräuter. In Sommergetreide 20 g/ha ausreichend.
	Sempra	WW,WG,WR	09	NW -(-/20/10)m NW706, NW800, NT108	F	0,25 - 0,375 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 10-29 gegen Unkräuter. Optimale Wirkung im frühen Nachauflauf bei ausreichender Bodenfeuchte. Geeignet v.a. als Ergänzungspartner mit 0,25 l/ha gegen Stiefmütterchen, Ehrenpreis und Taubnessel. Kein Nachbau von dikotylen Zwischenfrüchten und Winterraps.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schadereger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Stomp Aqua	WW,WG,WR,WT,DI	07 09	NW -(-/-/5)m NT112, NW705, NT145,146,170	F	2,5 - 3,0 l	Im Nachauflauf-Herbst gegen Unkräuter. Tankmischpartner zur Gräserbekämpfung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Tandus	WW,WG,WR,WT,WDU,WH	07 08 09	NT102		1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 12-32, in WW und WG bis BBCH 49, gegen Unkräuter.
		SW,SG,SH		NT101		0,75 l	Von BBCH 12-32 in SH, in SW und SG bis BBCH 49, gegen Unkräuter.
	Tomigan 200, ...u.a.	WW,SW,WG,SG,WR,WT,SH,DI	05 07 08 09	NT101 NT108	F	0,5 - 0,9 l	Gegen Unkräuter im Frühjahr in Wintergetreide von BBCH 13-32, in Dinkel von BBCH 21-32, in Sommergetreide von BBCH 13-39. In BBCH 21-32 gilt für alle Getreidearten NT101, davor und danach NT108.
	Tomigan XL, ...u.a.	WW,SW,WG,SG,WR,WT,SH	07 09	NW 5(5/*/*)m NT108	F	0,75 - 1,5 l	Im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter und Kletten-Labkraut. In Wintergetreide Spätbehandlung gegen Kletten-Labkraut bis BBCH 39 möglich.
	Trimmer WG	WW,WG,WR,WT	07 09	NW 5(*/*/*)m NT108, NW800	F	60 g (Frühjahr)	Im Nachauflauf im Herbst oder Frühjahr von BBCH 13-29 in Wintergetreide und von BBCH 12-39 in Sommergetreide gegen Unkräuter. In Tankmischung Aufwandmengenreduzierung möglich.
SW,SG		NT103		30 g			
WW,WG,WR,T				30 g (Herbst)			

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	U 46 M-Fluid, ...u.a.	WW,WG,R,WT, DI,WDU,SDU,SW, SG,SH	05 07 09	NT108	F	1,4 l	Im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Unkräuter. Nebenwirkung gegen Acker-Kratzdistel, Winden und Schachtelhalm. Auch bei Grasuntersaaten ab BBCH 13 einsetzbar. In Rotklee-Untersaaten möglich.
	Zypar	WW,SW,WG,SG, WR,SR,WT,DU,DI	07 09	NW 10(5/5/*)m NW 5(5/5/*)m NW706, NT102	F	1,0 l (Frühjahr) 0,75 l (Herbst)	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-45 mit 1,0 l/ha und im Herbst von BBCH 11-29 mit 0,75 l/ha gegen Unkräuter. Unterschiedliche Aufwandmenge und Auflagen im Herbst und Frühjahr beachten.
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Addition	WW,WG,WR,WT		NW -(/-/5)m NW706, NW800 NT145,146,170	F	2,5 l	Im frühen Nachauflauf im Herbst von BBCH 11-13 gegen Windhalm, Jährige Risse und Unkräuter. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter) vermeiden. Ergänzung mit Windhalm-fähigen Tankmischpartner sinnvoll.
	Attribut	WW,WR,WT	09	NW 5(5/*/*)m NT102 NW701, NW800	F	60 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Windhalm. Früher Einsatz und Ergänzung gegen Unkräuter notwendig.



**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Avoxa	WW,WR,WT	07 08 09	NW 5(5/5/*)m NT109	F	1,35 l	Im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Windhalm, Weidelgras und Unkräuter. Gegen breite dikotyle Verunkrautung Mischpartner notwendig. Aufgrund der Kombination der beiden Wirkmechanismen ACCase-Hemmer und ALS-Hemmer wird der Einsatz als kritisch hinsichtlich des Resistenzmanagements gesehen.
	Axial Komplett	WW,SW,WG,SG,WR,WT,SDU	07 09	NT102	F	1,0 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr in BBCH 13-29 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter. Auch Herbsteinsatz ab BBCH 13 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Unkräuter möglich.
	[Battle Delta]	WW,WG,WR,WT	08 09	NW -(/-/10)m NW706, NT101	F	0,425 l	Im Herbst vom Voraufbau bis BBCH 24 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Früher Einsatz bis BBCH 13 sinnvoll.
	BeFlex	WW,WG,WR,WT	09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	0,5 l	Im Herbst ab dem Auflaufen von BBCH 09-25. Optimal im sehr frühen Einsatz. Tankmischung mit z.B. 2,5 l/ha Boxer empfehlenswert.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Boxer, ... u.a.	WW,WG,WR,DI	07 08 09	NW -(-/!/*) NT145,146,170	F	3,0 - 5,0 l	Im Herbst vom Voraufbau bis BBCH 12 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Als Tankmischkomponente zur Gräserbekämpfung geeignet. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	[Broadcast]	WW,WG,WR,WT, DI	07 09	NW -(-/!15)m NW706 NT103	F	0,6 l	Im Herbst im Nachaufbau von BBCH 10-13 gegen Windhalm, Jährige Rispe, Klettenlabkraut, Vogelmiere und Kamille. Ackerfuchsschwanz wird mit erfasst. Gegen Windhalm im frühen Nachaufbau 0,4 l/ha ausreichend.
		WW,WG,WR,WT		NW -(-/!15/5)m NW706,800 NT102		0,3 l	Im Herbst im Voraufbau mit 0,3 l/ha gegen Windhalm und Unkräuter.
	[Broadcast] Duo Pack = [Broadcast] + Trimmer WG	WW,WG,WR,WT	07 09	NW -(-/!15)m NW706 NT103	F	0,4 l + 20 g	Im Herbst im Nachaufbau im BBCH 13 gegen Windhalm und Unkräuter.
	Broadway	WW,WR,WT, DU,DI,EM	07 09	NT101	F	130 g + 0,6 l FHS	Nach dem Aufbauen im Frühjahr von BBCH 12-32 gegen Windhalm und Unkräuter.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Broadway Plus	WW,WR,WT, WDU,DI	07 09	NW -(15/10/5)m NW706 NT108	F	62,5 g + 1,0 l Netzmittel	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Windhalm und Unkräuter. In der Regel 50 g/ha + 0,8 l/ha Netzmittel ausreichend.
	Carmina 640	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NG404,405,414, NG337, NT103	F	2,5 l	Im Herbst von BBCH 10-29 gegen Windhalm und Unkräuter. Früher Einsatz bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit notwendig. Sortenverträglichkeit bei Weizen beachten! Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Carmina Complet = Carmina 640 + Alliance	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW 20(10/5/5)m NW701, NG404,405,414, NG337,NT103	F	1,5 l + 65 g	Im Herbst von BBCH 10-29 gegen Windhalm und Unkräuter. Früher Einsatz sinnvoll. Sortenverträglichkeit bei Weizen i.d.R. unproblematisch. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	[Carpatus SC]	WW,WG,WR,WT, DI	07 08 09	NW -(-/15/5)m NW706,NW800 NT102  NW -(-/15)m NW706,NT103	F	0,3 l  0,6 l	Im Herbst vor dem Auflaufen gegen Windhalm und Unkräuter.  Im Herbst von BBCH 11-13 auf mittleren bis schweren Böden gegen Windhalm, Jährige Rispe, Klettenlabkraut, Vogelmiere und Kamille.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Concert SX	WW,WR,T	09	NW 5(5/5/*)m NW706,NW800 NT108	F	150 g	Im Nachauflauf von BBCH 13-29 gegen Windhalm und Unkräuter, außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis. Nebenwirkung gegen Distel, Ziest, Minze und Ampfer.
	[Chrome]	WW,WG,WR,WT	08 09	NW 15(10/5/5)m NW706,NT101, NG405	F	1,2 l	Im Herbst vom Vorauf bis BBCH 29 gegen Windhalm und Unkräuter.
	Compola	WW,WG,WR,WT	05 07 09	NW -(10/5/5)m NW706,NT103, VA277	F	3,0 l	Im Herbst im Nachauflauf von BBCH 10-14 gegen Windhalm, Rispengras und Unkräuter.
	Daltrice + Efortol	WW,WR,WT	05 09	NW 5(*/*/*)m NT108-1,NT140	F	0,3 kg + 0,6 l	Im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter.
	Fantasia Gold	WW,WG,WR,WT, WDU,DI	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW706,VA282	F	3,0 - 5,0 l	Im Herbst vom Vorauf bis BBCH 21 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Als Tankmischkomponente zur Gräserbekämpfung geeignet. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Husar Plus + Mero	WW,WR,WT,DI	05 09	NW 5(*/*/*)m NT103, NW800	F	0,2 + 1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Windhalm, Jährige Rispe, Weidelgras-Arten, und Unkräuter.
		SW,SG,SDU		NW 5(5/*/*)m NT108		0,15 + 0,75 l	Nach dem Auflaufen von BBCH 13-30 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter.
	Jura	WW,WG,WR,WT	05 07 08 09	NW -(-/-/5)m NT145,146,170 NW706, NW800	F	3,5 - 4,0 l	Im Herbst von Voraufbau bis BBCH 13 gegen Windhalm, Rispe und Unkräuter. Unter normalen Bedingungen 3,5 l/ha ausreichend. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
Jura Max	WW,WG,WR,WT, WDU,DI	05 07 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103-1	F	3,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 10-13 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Lentipur 700, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	08 09	NW 10(5/5/*)m NG404, NG405, NG414, NG337, NT103	F	3,0 l	Vor dem Auflaufen in WW,WR und WG; nach dem Auflaufen im Herbst in WW,WG und WT (BBCH 11-29) gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter; im Frühjahr in WW und WG bis BBCH 29. Bevorzugt als Herbstbehandlung. Die Ungräser sollten nicht mehr als 2 Blätter haben. Sortenverträglichkeit bei Weizen beachten! Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Mateno Forte Set = Mateno Duo + [Cadou SC]	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(20/10/5)m NW701, NT109	F	0,35 l + 0,25 l	Im Herbst von Voraufbau bis frühen Nachaufbau BBCH 13 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Bei Reduzierung von Cadou SC auf 0,24 l/ha entfällt die NW701.
	Niantic + Probe	WW	05 07 09	NT103	F	0,15 kg + 0,3 l	Im Herbst ab BBCH 11 und im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Windhalm. Ergänzung gegen dikotyle Unkräuter notwendig.
	[Pontos]	WW,WG,WR,WT, EM,EK	07 08 09	NW -(10/5/5)m NT102, nur im VA: NW705	F	0,5 l	Im Herbst von Voraufbau bis BBCH 29 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Einsatz im frühen Nachaufbau bis BBCH 12/13 empfehlenswert.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Windhalm und breitblättrige Unkräuter	Sumimax	WW	08	NW 10(5/5/*)m	F	60 g	Im Herbst im Voraufbau bis frühen Nachaufbau von BBCH 09-14 gegen Windhalm und Unkräuter. Sehr früher Einsatz wird empfohlen.
	Trinity	WW,WG,WR,WT, WDU	08 09	NW -(-/-/5)m NT145,146,170 NW706,800, NG337	F	2,0 l	Im Herbst im frühen Nachaufbau von BBCH 10-13 gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Viper Compact	WW,WG,WR,WT, WDU, EM, EK	09	NW -(-/15/10)m NW706,800, NT103	F	1,0 l	Im Herbst im frühen Nachaufbau von BBCH 10-23 gegen Windhalm und Unkräuter. Aufgrund hohen ALS-Resistenzrisikos bei Windhalm Anwendungshäufigkeit minimieren und Anwendung in Mischung mit Flufenacet- oder CTU-haltigen Präparaten bevorzugen, sowie keine Nachbehandlung mit Sulfonylharnstoff-Präparaten im Frühjahr gegen Windhalm vornehmen!
	[Vulcanus Top]	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW 20(15/10/5)m NW706,VA320 NT102-1		1,5 l	Im Voraufbau gegen Windhalm, Rispengras und Unkräuter. Gegen dikotyle Unkräuter in den meisten Fällen weitere Ergänzung notwendig.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Atlantis Flex	WW,WT,WR, WDU,DI	07 09	NW 5(*/*/*)m NW800, NT102	F	0,2 kg + 0,6 l Biopower	Im Nachauflauf im Frühjahr bis BBCH 32 gegen Acker-Fuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter.
		WW,WT,WDU		NW 5(5/*/*)m NW701,800, NT103		0,33 kg + 1,0 l Biopower	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Acker-Fuchsschwanz, Flughafer, Trespens, Weidelgras und Unkräuter.
	Attribut	WW	09	NW 5(5/5/*)m NT103 NW706, NW800	F	100 g	Im Nachauflauf Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Ackerfuchsschwanz auf mittleren bis schweren Böden. Kein Nachbau von dikotylen Zwischenfrüchten und Winterraps möglich!
	Avoxa	WW,WR,WT	07 08 09	NW 5(5/5/*)m NT109	F	1,8 l	Im Frühjahr von BBCH 13-32 gegen Ackerfuchsschwanz, Trespens und Unkräuter. Gegen breite dikotyle Verunkrautung Mischpartner notwendig. Aufgrund der Kombination der beiden Wirkmechanismen ACCase-Hemmer und ALS-Hemmer wird der Einsatz als kritisch hinsichtlich des Resistenzmanagements gesehen.



**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Axial Komplett	WW,WG,WR,WT	07 09	NT102	F	1,0 - 1,3 l	Nach dem Auflaufen in BBCH 13-29 im Herbst mit 1,0 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Unkräuter, im Frühjahr mit 1,3 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Weidelgras und Unkräuter.
	Boxer [Cadou SC] Pack = Boxer + [Cadou SC]	WW,WG,WR	07 08 09	NW701, NT101,145,146, NT170	F	2,0 - 2,5 l + 0,4 - 0,5 l	Im Herbst von Voraufbau bis BBCH 12 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Gegen Windhalm und Jährige Rispe 0,25 l/ha Cadou SC ausreichend. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	[Broadcast]	WW,WG,WR,WT	07 09	NW -(-/-/15)m NW706,800 NT103	F	0,6 l	Im Herbst im Voraufbau gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Unkräuter.
	Broadway	WW,WR,WT, DU,DI,EM	07 09	NT102	F	220 - 275 g + 1,0-1,25 l FHS	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 12-30 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe, Weidelgräser und Unkräuter. Gute Nebenwirkung gegen Trespen.
	[Carpatus SC]	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(-/-/15)m NW706,NW800, NT103	F	0,6 l	Im Herbst vor dem Auflaufen gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Unkräuter.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Current	WW,WR,WT	05 09	NW 5(5/*/*)m NW800, NT108-1	F	0,4 - 0,5 kg	Im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Unkräuter und Ungräser. Netzmittel-Zusatz sinnvoll.
	Daltrice + Efortol	WW,WR,WT	05 09	NW 5(5/*/*)m NW800, NT108-1, NT140	F	0,4 - 0,5 kg + 0,8 - 1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Unkräuter und Ungräser.
	[Fence], ...u.a.	WW, WG	07 08 09		F	0,5 l	Im Herbst vom Voraufbau bis BBCH 23 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Jährige Rispe. Früher Einsatz bis BBCH 10 empfehlenswert. Gegen dikotyle Unkräuter Ergänzung notwendig. Gegen Windhalm und Jährige Rispe 0,25 l/ha ausreichend.
	[Herold SC]	WW,WG,WR,T,DI	07 08 09	NW -(15/10/5)m NW706 NT102	F	0,4 - 0,6 l	Im Herbst vom Voraufbau bis BBCH 13 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. In Triticale nur im NA mit 0,5 l/ha. Früher Einsatz bis BBCH 11 empfehlenswert. Leichte Böden max. 0,5 l/ha. Gegen Windhalm und Jährige Rispe 0,4 l/ha ausreichend.
	Incelo Komplett = Incelo + Biopower + Husar OD	WW,WT	07 09	NW 5(5//5/*)m NW706, NW800 NT101	F	0,3 kg + 1,0 l + 0,1 l	Im Frühjahr ab BBCH 20 bis BBCH 32 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe, Weidelgras- und Trespen Arten, Flughafer und Unkräuter.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	[Malibu]	WW,WG,WR, WDU,T,EK,EM	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW701 NT112,145,146, NT170	F	3,0 - 4,0 l	Im Herbst im frühen Nachauflauf gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispel und Unkräuter, optimal von BBCH 11-12. Gegen Windhalm und Jährige Rispel 3,0 l/ha ausreichend. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Mateno Forte Set = Mateno Duo + [Cadou SC]	WW,WT	07 08 09	NW -(-/20/10)m NW706, NT109	F	0,7 + 0,5 l	Im Herbst von Voraufbau gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispel und Unkräuter.
		WW,WG,WR,WT		NW -(20/10/5)m NW701, NT109	F	0,35 + 0,5 l	Im Herbst im Voraufbau bis sehr frühen Nachauflauf BBCH 13 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispel und Unkräuter.
	[Mertil]	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(15/10/5)m NW706 NT102	F	0,6 l	Im Herbst von BBCH 11-13 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispel und Unkräuter. Gegen Windhalm und Jährige Rispel 0,4 l/ha ausreichend.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, weitere Ungräser und breitblättrige Unkräuter	Niantic + Probe	WW	05	NT108	F	0,3 kg	Im Herbst ab BCHH 11 mit 0,3 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz und Rispen-Arten sowie mit 0,4 kg/ha gegen starken Ackerfuchsschwanz-Besatz und Taube Trespe.
			07	NW800		+ 0,6 l	
			09	NT109 NW800		0,4 kg + 0,8 l	Im Frühjahr von BBCH 13-32 mit 0,3 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Rispen, Kamille und Vogelmiere; von BBCH 13-30 mit 0,4 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Weidelgras, Flughafer und Unkräuter, mit 0,5 kg/ha gegen Ackerfuchsschwanz und Taube Trespe. Tankmischung mit Biathlon 4D oder AHL zur Wirkungsunterstützung empfehlenswert.
				NT109 NW701,800		0,5 kg + 1,0 l	
	[Quirinus Forte Set] = [Quirinus] + [Pontos]	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(10/5/5)m NT102, nur im VA: NW705	F	0,5 + 0,5	Von Voraufbau bis BBCH 29 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Weidelgras-Arten, Jährige Rispe und Unkräuter. Einsatz im Voraufbau bis sehr frühen Nachaufbau BBCH 10/11 empfehlenswert.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz und weitere Ungräser	Altivate 6 WG	WW,WR,WT	07 09	NW 5(*/*/*)m NW 701	F	0,15 kg + 0,6 l FHS  0,25 kg + 1,0 l FHS	Nach dem Auflaufen im Frühjahr in BBCH 20-32 mit 0,15 kg/ha gegen Windhalm und jährige Rispe. Mit 0,25 kg/ha nur in Winterweizen gegen Ackerfuchsschwanz, Flughafer und Weidelgras. Dikotyle Ergänzung erforderlich.
	Axial 50	WW,SW,WG,SG, WR,WT,DI,DU	07 09	NT101	F	0,9 l  1,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst in BBCH 13-29 mit 0,9 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Weidelgräser. Im Frühjahr in BBCH 13-39 mit 0,9 l/ha gegen Windhalm und Flughafer oder mit 1,2 l/ha gegen Ackerfuchsschwanz und Weidelgräser. Kulturspezifische Indikationen beachten.
	Sword 240 EC	WW,WR,WT, WDU	07 08 09		F	0,25 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 11-29 oder im Frühjahr von BBCH 21-31(39) gegen Ackerfuchsschwanz, Flughafer und Weidelgras in BBCH 13-15. Ergänzung mit geeigneten Zusatzstoff, wie z.B. Hasten oder Kantor, empfehlenswert. Alternativer Wirkmechanismus zu Sulfonylharnstoff-präparaten im Resistenzmanagement.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz und weitere Ungräser	Traxos	WW,WR,WT	07 09		F	1,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst und Frühjahr von BBCH 13-31 gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Weidelgras-Arten. Alternativer Wirkmechanismus zu Sulfonylharnstoffpräparaten im Resistenzmanagement.
	[Vulcanus Top]	WW,WG,WR,WT	07 08 09	NW -(20/10/5)m NW706,VA320 NT102-1	F	2,0 l	Im Voraufbau gegen Ackerfuchsschwanz. In Kombination mit anderen Ackerfuchsschwanz-Präparaten zur Erhöhung der
Flughafer	Axial Komplett	SW,SG,SDU	07 09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	1,0 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter.
	Husar Plus + Mero	SW,SG,SDU	05 09	NW 5(5/*/*)m NT108	F	0,15 l + 0,75 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter.
	Broadway Plus	SW,SDU	07 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NT103	F	40 g + 0,6 l Netzmittel	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32 gegen Flughafer, Stiefmütterchen, Winden- und Vogel-Knöterich.
Taube Trespe, Gemeine Quecke	Attribut	WR,WT,DI	09	NW 5(5/*/*)m NT102 NW701, NW800	F	60 g	Im Nachaufbau Frühjahr von BBCH 13-29 zur Niederhaltung von Quecke und Tauber Trespe. Zusatz von Mero verbessert die Wirkung.
		WW		NW 5(5/*/*)m NT103 NW701, NW800		100 g	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Trespe-Arten, Weidelgras-Arten und Flug-Hafer	Atlantis Flex	WW,WT,WDU	07 09	NW 5(5/*/*)m NW701,800, NT103	F	0,33 kg + 1,0 l FHS	Im Frühjahr nach dem Auflaufen von BBCH 21-32. Möglichst frühzeitige Anwendung gegen Trespens und Weidelgräser. Bei Flughafer kompletten Auflauf abwarten.
Taubes Trespe, Flughafer und Weidelgras-Arten	Niantic	WW	05 07 09	NT109 NW800	F	0,4 kg + 0,8 l FHS	Im Herbst ab BBCH 11 mit 0,4 kg/ha gegen Taube Trespe. Im Frühjahr von BBCH 13-30 mit 0,4 kg/ha gegen Flughafer und Weidelgras-Arten, mit 0,5 kg/ha gegen Taube Trespe. Tankmischung mit Biathlon 4D oder AHL zur Wirkungsunterstützung empfehlenswert.
				NT109 NW701,800		0,5 kg + 1,0 l FHS	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<b>Spät- und Stoppelbehandlungen gegen Problemunkräuter</b>							
Acker-Kratzdistel	Ariane C	WW,WG,WR,WT,DI	07 08 09	NT103	F	1,5 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr bis BBCH 39 gegen Acker-Kratzdistel und Samenunkräuter. Breite Wirkung. Nebenwirkung gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.
	Dirigent SX	WW,WG,WR,WT	09	NW 5(**/*)m NW701, NT103	F	35 g	Im Frühjahr von BBCH 30-37 gegen Acker-Kratzdistel.
	Pointer Plus	WW,SW,WG,SG,WR,WT,SH	07 09	NW 5(5/*)m NT108	F	50 g	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Acker-Kratzdistel, Klettenlabkraut und Unkräuter.
	Pointer SX	WW,WG,WR,T	07 09	NT102	F	37,5 g	Im Frühjahr in Wintergetreide in der Schossphase von BBCH 30-37 gegen Acker-Kratzdistel. Ampfer wird mit erfasst.
	U 46 M-Fluid	WW,SW,WG,SG,WR,SR,WT,DI,WDU,SDU,SH	05 07 09	NT108	F	1,4 l	Im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Acker-Kratzdistel und Unkräuter. Einsatz im Knospenstadium der Distel bei wüchsigem Wetter fördert die Wirkung.



**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Acker-Kratzdistel, Acker-Winde	Biathlon 4D + Dash EC	WW,SW,WG,SG, WR,SR,WT,ST, DI,WDU,SDU,WH, SH	05 07 08 09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	70 g + 1,0 l	Spätbehandlung bis BBCH 39 gegen Acker-Winde, Acker-Kratzdistel und Unkräuter.
	U 46 M-Fluid	DI,DU	05 07 09	NT108, nur für DI: NG412	F	1,4 l	Nach dem Auflaufen von BBCH 13-39 gegen Acker-Kratzdistel und Acker-Winde. Ausreichende Blattmasse der Unkräuter und wüchsige Witterung beachten.
Klettenlabkraut	Fluroxane, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	05 07 08 09	NT103	F	0,6 - 1,0 l	In der Schossphase bis BBCH 39 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung auch gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.
	Lodin, ...u.a.	WW,WG,WR,WT, WH	07 08 09	NW 20(10/5/5)m NT103	F	1,0 l	Im Frühjahr von BBCH 12-39 gegen Klettenlabkraut und Vogelmiere.
		SW,SG,SH		NW 15(10/5)m NT102		0,75 l	
	Tomigan 200, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	05 07 08 09	NT108	F	0,5 - 0,9 l	In der Schossphase bis BBCH 45 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung auch gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.
Tomigan XL, ...u.a.	WW,WG,WR,WT	07 09	NW 20(10/5/5)m NT108	F	1,0 - 1,5 l	Im Schossen bis Ligula-Stadium BBCH 30-39 gegen Klettenlabkraut. Nebenwirkung auch gegen Winden-Arten und Durchwuchskartoffel.	

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Flughafer	Axial 50	WW,SW,WG,SG,WR,WT,DI,DU	07 09	> 0,9 l/ha: NT101	F	0,9 - 1,2 l	Spätbehandlung bis BBCH 39, gegen Windhalm und Flughafer 0,9 l/ha, gegen Ackerfuchsschwanz 1,2 l/ha. Weidelgräser werden mit erfasst.
Ausfallgetreide und Gemeine Quecke	Clinic Xtreme, ...u.a. #)	Getreidestoppel		NG352-1, NT101-1, NT140	F	1,5 - 4,0 l	Nach der Ernte gegen Ausfallgetreide und Quecke. Queckenaustrieb abwarten, min. 3 neue Blätter bzw. 15-25 cm Bestandeshöhe. Wirkungsperiode (1 - 10 Tage) vor Beginn der Bodenbearbeitung bzw. Saatbettbereitung ist vom jeweils eingesetzten Glyphosat-Präparat abhängig. Spritzbrühekonzentration von min. 1-1,5 % einhalten. Zusatz von Netzmittel oder SSA kann die Wirkung unterstützen. Tankmischung mit Starane XL zur Windenbekämpfung möglich. Einsatz auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen! Abdrift zuverlässig vermeiden.

**Infos zum Getreide**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ausfallgetreide und Gemeine Quecke	Kyleo #)	Getreidestoppel	07 09	NW 5(5/*/*) m NW706, NG352-1,405, NT109	F	4,0 - 5,0 l	Nach der Ernte gegen Ungräser und Unkräuter. Aufwandmenge je nach Zielunkraut. Zur Regulierung von Winden und Acker-Schachtelhalm geeignet. Einsatz auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen! Abdrift zuverlässig vermeiden.

\*) Landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!

#) Bei alternativen Glyphosat-Präparaten sind ggf. veränderte Anwendungsbestimmungen zu beachten.

Generelle Anwendungsverbote auf Basis von privatrechtlichen Vereinbarungen (Pacht-, Lieferverträge) und besondere Anwendungsbestimmungen nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten.

[...] Wiederzulassung nicht gesichert, keine Übermengen bevorraten.