

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Nacktschnecken	Schneckenkorn auf Basis von Fe-III-Phosphat oder Metaldehyd z.B. Axcela, Ironmax Pro, Metarex INOV, MetaPads und Delicia Schnecken-Linsen		abhängig vom Präparat	F	abhängig vom Präparat	Kontrolle nach der Saat mittels Schneckenfolien oder nassen Jutesäcken. Wird nach einer Nacht bei fünf Kontrollstellen durchschnittlich unter jeder Falle mindestens eine Schnecke gefunden, dann ist eine Behandlung erforderlich. Auf kritischen Flächen ist die Behandlung nach ca. 10 - 14 Tagen zu wiederholen. Raps ist bis zum 4-Blatt-Stadium gefährdet. Bei Granualtstreugeräten Prüfpflicht beachten!
Feldmaus, Erdmaus	Ratron Giftlinsen	09	NW704, NS648 NT659, NT680, NT820-2, NT820-3	F	100 g / Köder- stelle max. 2,5 kg/ha	In geeigneten Köderstationen auslegen. Keine breitflächige Ausbringung erlaubt. Nur eine Anwendung pro Kultur und Jahr erlaubt.
		09	NW704, NS648 NT664, NT659, NT802-1, NT803-1, NT820-1, NT820-2, NT820-3	F	5 Körner pro Loch max. 2,0 kg/ha	Bei Bedarf verdecktes Auslegen in die Mäusegänge. Das Mittel ist sehr giftig für Vögel und Wild. Nur eine Anwendung pro Kultur und Jahr erlaubt.

Infos zum Rapsbau
Tierische Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rapserrdfloh	Kaiso Sorbie	07, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108,	56	150 g	<p>Um Schäden durch Kohlflye (und Rapserrdfloh) gering zu halten, sind Fröhsaaten zu vermeiden.</p> <p><u>Schadschwelle gegen Käferfraß:</u> Behandlung notwendig sobald mehr als 10 Prozent der Blattfläche an den Keimblättern oder an den ersten drei Laubblättern abgefressen ist. Häufig reicht für den Keimlingsschutz eine Randbehandlung aus.</p> <p><u>Schadschwelle gegen Larven:</u> Bekämpfung sinnvoll, wenn bis Anfang Oktober mehr als 50 (schlechter, lückiger Bestand) bis 100 (guter, gleichmäßiger Bestand) Rapserrdföhe in der Gelbschale gefangen werden oder wenn mehr als 5 Larven/Rapsnpflanze vorhanden sind. Karate Zeon, Lamdex Forte und Hunter WG dürfen in der Kultur Raps max. 2x eingesetzt werden!</p> <p>Bei Lamdex Forte, Hunter WG endet am 30.06.23 der Abverkauf, die Aufbrauchfrist läuft bis zum 30.06.24</p>
	Karate Zeon	08 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108,	35	75 ml	
	(Lamdex Forte, Hunter WG)	06, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108,	35	150 g	

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rapsstängelrüssler	Kaiso Sorbie	07, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108,	56	150 g max. 1x	Gelbschalenskontrolle ab 5°C Bodentemperatur! Schadschwelle: 10 bis 15 Käfer in 3 Tagen je Gelbschale.
	Karate Zeon	08, 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108,	35	75 ml max. 2x	Lamdex Forte, Hunter, Kaiso Sorbie und Karate Zeon haben in Mischung mit Azol-Fungiziden (ausgenommen Proline) ebenfalls eine B2-Bieneneinstufung. Karate Zeon, Lamdex Forte und Hunter dürfen in der Kultur Raps max. 2x eingesetzt werden! In dieser Anwendung ist Trebon 30 EC max. 2x zugelassen. Bei Lamdex Forte, Hunter WG endet am 30.06.23 der Abverkauf, die Aufbrauchfrist läuft bis zum 30.06.24 Ist zum Zeitpunkt der Stängelschädlingbekämpfung schon ein Großteil der Rapsglanzkäferpopulation im Schlag vorhanden, sollte zur Bekämpfung der Rapsstängelrüssler das Mittel Trebon 30 EC eingesetzt
	Lamdex Forte, Hunter WG	06, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108,	56	150 g max. 2x	
	Trebon 30 EC	05, 07 08, 09	NB6621 NW -(-/10)m NW701, NT101	F	200 ml max. 2x	

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Kohlschotenrüssler	Lamdex Forte, Hunter WG	06, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108,	56	150 g max. 2x	Schadschwelle bei Kohlschotenrüssler: 1 Käfer/Pflanze. Karate Zeon, Mavrik, Lamdex Forte, Hunter und Kaiso Sorbie haben in Mischung mit Azol-Fungiziden (ausgenommen Proline) ebenfalls eine B2-Bieneneinstufung. Mavrik darf in der Kultur Raps max. 1x eingesetzt werden. Karate Zeon, Lamdex Forte und Hunter dürfen in der Kultur Raps max. 2x eingesetzt werden. In dieser Anwendung ist Trebon 30 EC max. 2x zugelassen. Bei Lamdex Forte, Hunter WG endet am 30.06.23 der Abverkauf, die Aufbrauchfrist läuft bis zum 30.06.24 In vielen Regionen Bayerns besteht beim Rapsglanzkäfer Resistenz gegen Pyrethroide. Werden diese zur Kohlschotenrüsslerbekämpfung eingesetzt, wenn gleichzeitig Rapsglanzkäfer im Bestand vorhanden sind, wird der weiteren Resistenzentwicklung der Rapsglanzkäfer Vorschub geleistet.
	Kaiso Sorbie	07, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108,	56	150 g max. 1x	
	Karate Zeon	08, 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108,	35	75 ml max. 2x	
	Mavrik Vita Evure		NB6623, NN410 NW 15(10/5/5)m NT101	56	200 ml max. 1x	
	Trebon 30 EC	05, 07 08, 09	NB6621 NW -(-/-/10)m NW701, NT101	F	200 ml max. 2x	

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rapsglanzkäfer	Mospilan SG	07, 09	NB6612 NW 5(*/*/*)m NT102, NN410 VV553	F	200 g max. 1x	Schadschwelle Rapsglanzkäfer: In Winterraps bei mehr als 10 Käfern, in Sommerraps bei mehr als 1-3 Käfern je Pflanze am Feldrand. Bei geöffneter Blüte schädigt der Käfer in der Regel nicht mehr. Mavrik Vita darf - im Gegensatz zu Mospilan - noch in Beständen mit ersten offenen Blütenblättern eingesetzt werden. Mospilan hat in Mischung mit Azol-Fungiziden eine B1-Bieneneinstufung, Mavrik in Mischung mit Azol-Fungiziden (ausgenommen Proline) eine B2-Bieneneinstufung. Mospilan darf nicht mit Netzmitteln kombiniert werden.
	Mavrik Vita Evure		NB6623, NN410 NW 15(10/5/5)m NT101	56	200 ml max. 1x	
Kohlschotenmücke	Kaiso Sorbie	07, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108,	56	150 g max. 1x	Schadschwelle: Ab Blühbeginn bei durchschnittlich 1 Mücke/Pflanze und Tag. Lamdex Forte, Hunter WG, Mavrik, Kaiso Sorbie und Karate Zeon haben in Mischung mit Azol-Fungiziden (ausgenommen Proline) eine B2-Bieneneinstufung. Karate Zeon, Hunter WG und Lamdex Forte dürfen in der Kultur Raps max. 2x eingesetzt werden. Die anderen aufgeführten Insektizide dürfen in dieser Anwendung max. 1x eingesetzt werden. Bei Lamdex Forte, Hunter WG endet am 30.06.23 der Abverkauf, die Aufbrauchfrist läuft bis zum 30.06.24
	Karate Zeon	08, 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108,	35	75 ml max. 2x	
	Mavrik Vita Evure		NB6623, NN410 NW 15(10/5/5)m NT101	56	200 ml max. 1x	
	Lamdex Forte, Hunter WG	06, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	35	150 g max. 2x	

Infos zum Rapsbau
Tierische Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Beißende Insekten	Karate Zeon	08, 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108,	35	75 ml max. 2x	Mavrik Vita, Lamdex Forte und Karate Zeon haben in Mischung mit Azol-Fungiziden ebenfalls eine B2 Bieneinstufung (ausgenommen in Mischung mit Proline)! In dieser Anwendung ist Karate Zeon, Lamdex Forte, Hunter WG und Sumicidin Alpha max. 2x zugelassen. Mavrik Vita darf in der Kultur Raps max. 1x eingesetzt werden. Mavrik Vita ist nicht zur Bekämpfung von Stängelschädlingen zugelassen! Bei Lamdex Forte, Hunter WG endet am 30.06.23 der Abverkauf, die Aufbrauchfrist läuft bis zum 30.06.24
	Mavrik Vita Evure		NB6623, NN410 NW 15(10/5/5)m NT101	56	200 ml max. 1x	
	Lamdex Forte, Hunter WG	06, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108,	35	150 g max. 2x	
	Sumicidin Alpha EC			56	250 ml max. 2x	

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!