

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbbruchkrankheit ( <i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i> )	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	Bekämpfungszeitraum Ende der Bestockung bis Spitzen des Fahnenblattes nach der Hauptinfektionsperiode. Infektionsgefahr bei längeren feuchtkühlen Witterungsperioden. Warndiensthinweise beachten. Ausbringung in Kombination mit Wachstumsreglern ist möglich. Die aufgeführten Präparate wirken zugleich gegen zahlreiche Blattkrankheitserreger.
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW, WR,T	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Fandango	W,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 08,	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,25 l	
	Flexure	W,G,R,T,H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	F	1,25 l	
	Input Classic	W,G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
Input Triple	W,G	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l		

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit ( <i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i> )	Navura	W	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Proline	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m VA271	F	1,0 l	
	Tokyo	WW,SW, DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Unix	W,G,R,T	09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	1,0 kg	

**Infos zum Getreide**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit ( <i>Pseudo-cercospora</i> <i>herpotrichoides</i> )	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU,G,R, WT	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Verben, Talius Pro	W	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	F	1,0 l	
	Xenial	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau ( <i>Erysiphe graminis</i> )	Ascra Xpro	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	Im Frühjahr zu Epidemiebeginn bis spätestens zur Getreideblüte.
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW, G,WR,T	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Cayunis	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m	F	1,0 l	
	Cayunis Xpro Set = Cayunis + Siltra Xpro	W,G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NW701	F	W: 0,9 + 0,9 l	
		DI,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	G,R,T: 0,8 + 0,8 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU, G,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
Fandango	W,G,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l		

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau ( <i>Erysiphe graminis</i> )	Flexure	W,G,R,T,H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	Reine Schwefel-Präparate. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide.
	Input Classic	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Jordi Power = Jordi + Nafabo	W,G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	42	1,5 + 1,5 l	
	Joust	W,T	07, 09	NW 5(5/**)m NT850, NW800, VA271	35	0,8 l	
				NW 5(**/**)m NT850, VA271	35	0,6 l	
	Kayak	G		NW 10(5/5/**)m NW706	49	1,5 l	
	Kumulus WG, Netzschwefel Stulln, Thiovit Jet	W,G,R			35	6 kg	
	Microthiol WG	W,G,R,T,H			35	7,5 kg	
	Navura	W,T	05, 07, 09	NW 5(**/**)m NT140	35	1,5 l	
Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/**)m	35	0,65 l		

**Infos zum Getreide**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau ( <i>Erysiphe graminis</i> )	Pronto Plus	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar	W,G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
		DI,R,T,H	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Siltra Xpro	W,G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,R,T,H	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m VA271	F	1,0 l	
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	
	Skyway Xpro	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Talius	W,G,R,T	05, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,25 l	
Thiopron	W,G,R,T	07		F	7,5 l	Reines Schwefel-Präparat in einer SC-Formulierung. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide.	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau ( <i>Erysiphe graminis</i> )	Tokyo	WW,SW, DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich)
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,T	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU, WT	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Vegas Plus	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW 20(15/10/10)m VA271	F	0,8 l	
	Verben, Talius Pro	W,G,WT	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	F	1,0 l	
	Xenial	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost ( <i>Puccinia recondita</i> ) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost ( <i>Puccinia hordei</i> ) an Gerste, Haferkronenrost ( <i>Puccinia coronata</i> ) an Hafer	Ambarac	W,G	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	Bei warmer Witterung schnelle Vermehrung möglich, daher in der Ährenphase auf langanhaltenden Fungizidschutz achten.  Amistar Max ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Amistar, Regoral	W,G,R,T,H	09	NW 5(*/*/*)m	F	1,0 l	
	Amistar Gold	W,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Amistar Max	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	W,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
			G,H	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
			G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW, G,WR,T	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Azbany	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
Balaya	W,R,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l		
Cayunis	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m	F	1,0 l		

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost ( <i>Puccinia recondita</i> ) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost ( <i>Puccinia hordei</i> ) an Gerste, Haferkronenrost ( <i>Puccinia coronata</i> ) an Hafer	Cayunis Xpro Set = Cayunis + Siltra Xpro	W,G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NW701	F	W: 0,9 + 0,9 l	
		DI,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	G,R,T: 0,8 + 0,8 l	
	Chamane	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Comet	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	F	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU,G,R, T	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Domark 10 EC	W	02, 05, 07, 08, 09		F	1,25 l	
	Elatus Era	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42 G: F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 1,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
Elatus Era Max = Elatus Era + Amistar Max	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	42 G:F	1,0 + 1,5 l	Amistar Max ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost ( <i>Puccinia recondita</i> ) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost ( <i>Puccinia hordei</i> ) an Gerste, Haferkronenrost ( <i>Puccinia coronata</i> ) an Hafer	Elatus Era Sympara	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	42	1,0 + 0,33 l G:	
	Fandango	W,G,R,T	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Flexure	W,G,R,T,H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Folicur, Horizon	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l W: 1,0 l	
	Greteg	W,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Input Classic	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	R	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Jordi Power = Jordi + Nafabo	W,G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	42	1,5 + 1,5 l	
	Joust	W,R,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT850, NW800, VA271	35	0,8 l	
	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT850, VA271	35	0,6 l		

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost ( <i>Puccinia recondita</i> ) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost ( <i>Puccinia hordei</i> ) an Gerste, Haferkronenrost ( <i>Puccinia coronata</i> ) an Hafer	LS Azoxy	W,G,R,T	09	NW 5(5/**)m NW701	F	1,0 l	Maganic hat die Zulassung ab voll entwickeltem Fahnenblatt (BBCH 39). Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51).  Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
		H	09	NW 5(5/**)m	F	1,0 l	
	Maganic	WW,SW, DU,G,R	05, 07, 08, 09	NW 5(5/**)m	F	1,0 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/**)m	F	1,0 l	
	Navura	W,G,R	05, 07, 09	NW 5(**/*)m NT140	35	1,5 l	
	Orius	W,G,R,T	07, 08	NW 10(5/5/**)m NW701	F	1,5 l W: 1,25 l	
	Panorama	WW,SW, DI,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 5(**/*)m NW706, NW800, VA275	35	0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,R	05, 07, 09	NW 5(5/5/**)m	35	0,65 l	
	Pioli	W,G,R,T	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Proline	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/**)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
G			07, 08, 09	NW 5(5/5/**)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost ( <i>Puccinia recondita</i> ) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost ( <i>Puccinia hordei</i> ) an Gerste, Haferkronenrost ( <i>Puccinia coronata</i> ) an Hafer	Pronto Plus	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Remocco 60, Sirena EC	W,G,R	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Revystar	W,G,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
			R,T	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l
	Revytrex + Comet	W,G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	35	1,5 + 0,5 l	
			R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,1 + 0,35 l
	Siltra Xpro	W,G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
			DI,R,T,H	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m VA271	F	1,0 l
	Skyway Xpro	W,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
			G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost ( <i>Puccinia recondita</i> ) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost ( <i>Puccinia hordei</i> ) an Gerste, Haferkronenrost ( <i>Puccinia coronata</i> ) an Hafer	Soratel	WW,SW, G,WR,T	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Tebucur 250 EW	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Tokyo	WW,SW, DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Tomec	WW,SW, G,R,T,H	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Traciafin	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,R	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l R: 1,5 l	
	Univoq Xtra = Univoq + Regoral	W,R,T	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 + 0,3 l	
	Vastimo	W,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Xenial	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	
Zoxis Super	W,G,R,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l		

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost ( <i>Puccinia striiformis</i> )	Ambarac	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	Bei feuchtkühler Witterung und anfälliger Sorte schnelle Vermehrung möglich, daher bei Befallsbeginn sofort handeln.  Amistar Max ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Amistar Gold	W	07,08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Amistar Max	W	07,08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Balaya	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Cayunis	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m	F	1,0 l	
	Cayunis Xpro Set = Cayunis + Siltra Xpro	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	0,9 + 0,9 l T: 0,8 + 0,8 l	
	Chamane	W	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU,G,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Comet	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	F	1,25 l	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost ( <i>Puccinia striiformis</i> )	Delaro Forte	WW,SW,DI,DU	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	Amistar Max ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Domark 10 EC	W	02, 05, 07, 08, 09		F	1,25 l	
	Elatus Era	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Max = Elatus Era + Amistar Max	W	05, 07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	W,T	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Flexure	W,G,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Greteg	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Input Classic	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	W	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800, VA275	F	1,25 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost ( <i>Puccinia striiformis</i> )	Jordi	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	Maganic hat die Zulassung ab voll entwickeltem Fahrenblatt (BBCH 39).
	Jordi Power = Jordi + Nafabo	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	42	1,5 + 1,5 l	
	Joust	W	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT850, NW800, VA271	35	0,8 l	
	LS Azoxy	W	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	
	Maganic	WW,SW, DU	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Navura	W,T	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Panorama	WW,SW, DI,R,T	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NW706, NW800, VA275	35	0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Proline	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
Gelbrost ( <i>Puccinia striiformis</i> )	Remocco 60, Sirena EC	W	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l		
	Revystar	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l		
	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l		
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	35	1,5 + 0,5 l		
	Siltra Xpro	W,DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m VA271	F	1,0 l		
	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l		
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l		
	Soratel	WW,SW	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l		
	Tebucur 250 EW	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l		
	Tokyo		WW,SW, DI,DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
			G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
Tomec	WW,SW, G,R,T,H	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l			

**Infos zum Getreide**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost ( <i>Puccinia striiformis</i> )	Traciafin	WW,SW,DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,T	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Univoq Xtra = Univoq + Regoral	W,T	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 + 0,3 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW,DU	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben, Talius Pro	W	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	F	1,0 l	
	Xenial	W,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	
	Zoxis Super	W,G,R,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	Ambarac	G,R	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	Längere Nässeperioden fördern die Krankheitsausbreitung. Fungizideinsatz ab BBCH 31 je nach Temperatur 7 - 14 Tage nach Infektionsbeginn.
	Ascra Xpro	R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	G,WR	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Azbany	G,R,T	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	G,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Cayunis	G,R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m	F	1,0 l	
	Cayunis Xpro Set = Cayunis + Siltra Xpro	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NW701	F	0,8 + 0,8 l	
		R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F		
	Cherokee Neo, Hint	G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium- Blattfleckenkrank- heit ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	Comet	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	F	1,25 l	
	Delaro Forte	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	G,R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	G,R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	G,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Flexure	G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Folicur, Horizon	G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l	
	Input Classic	G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Jordi Power = Jordi + Nafabo	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	42	1,5 + 1,5 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	Joust	R	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT850, NW800, VA271	35	0,8 l	Maganic hat die Zulassung ab voll entwickeltem Fahnenblatt (BBCH 39).  Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
		G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT850, VA271	35	0,6 l	
	LS Azoxy	G,R,T	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	
	Maganic	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Navura	G,R	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Orius	G,R	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Panorama	G	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NW706, NW800, VA275	35	0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	G,R,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pioli	G,R	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Proline	R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	

**Infos zum Getreide**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium- Blattfleckenkrank- heit ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Remocco 60, Sirena EC	G,R	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Revystar	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
		R	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l	
	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	35	1,5 + 0,5 l	
		R	05, 07 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	35	1,1 + 0,35 l	
	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m VA271	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	Soratel	G, WR	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Tokyo	R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Tomec	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Traciafin	WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	R	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 l	
	Univoq Xtra = Univoq + Regoral	R	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 + 0,3 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	G	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	

**Infos zum Getreide**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium- Blattfleckenkrank- heit ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	Vastimo	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben, Talius Pro	G,WR	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	F	1,0 l	
	Xenial	G,R	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	
	Zoxis Super	R,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit ( <i>Pyrenophora teres</i> )	Ambarac	G	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	Zu Beginn der Befallsausbreitung bis Ende des Ährenschiebens. Ausbreitung durch feuchtwarme Witterung begünstigt.
	Ascra Xpro	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	G	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Azbany	G	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Cayunis	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m	F	1,0 l	
	Cayunis Xpro Set = Cayunis + Siltra Xpro	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NW701	F	0,8 + 0,8 l	
	Chamane	G	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Cherokee Neo, Hint	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Comet	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	F	1,25 l	
	Delaro Forte	G	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit ( <i>Pyrenophora teres</i> )	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	G	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,25 l	
	Flexure	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Folicur, Horizon	G	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l	
	Input Classic	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Jordi Power = Jordi + Nafabo	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	42	1,5 + 1,5 l	
	Joust	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT850, VA271	35	0,6 l	
	Kayak	G		NW 10(5/5/*)m NW706	49	1,5 l	
	LS Azoxy	G	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	
Maganic	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	Maganic hat die Zulassung ab voll entwickeltem Fahrenblatt (BBCH 39).	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit ( <i>Pyrenophora teres</i> )	Navura	G	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Orius	G	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pioli	G,R	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Proline	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Remocco 60, Sirena EC	G	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	35	1,5 + 0,5 l	
	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
Soratel	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l		

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit ( <i>Pyrenophora teres</i> )	Tokyo	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Tomec	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Traciafin	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	G	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben, Talius Pro	G	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	F	1,0 l	
	Xenial	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	
	Zoxis Super	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> )	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	Die Ausbreitung wird begünstigt durch warme, wechselfeuchte Witterungsabschnitte mit hoher Luftfeuchte. Besonders hohe Gefährdung bei Weizenvorfrucht mit Minimalbodenbestellung und anfälligen Sorten.
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Cayunis	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m	F	1,0 l	
	Cayunis Xpro Set = Cayunis + Siltra Xpro	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NW701	F	W: 0,9 + 0,9 l	
		DI,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	T: 0,8 + 0,8 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Comet	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	F	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Fandango	W	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Flexure	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
Input Classic	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l		

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> )	Input Triple	W	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	Maganic hat die Zulassung ab voll entwickeltem Fahnenblatt (BBCH 39).
	Jordi	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Jordi Power = Jordi + Nafabo	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	42	1,5 + 1,5 l	
	Maganic	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Navura	W	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Proline	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	35	1,5 + 0,5 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m VA271	F	1,0 l	
Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l		

**Infos zum Getreide**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> )	Soratel	WW,SW	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Tokyo	WW,SW, DI,DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
	Univoq	W	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l	
	Vastimo	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Xenial	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre ( <i>Septoria tritici</i> ) und Blatt- und Spelzenbräune ( <i>Septoria nodorum</i> )	Ambarac	W,T	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	Feuchtwarme Witterung begünstigt Infektionen durch <i>Septoria nodorum</i> , feuchtkühle die durch <i>Septoria tritici</i> . Der Kontaktwirkstoff Folpet (z.B. in Folpan 500 SC, Nafabo, Amistar Max) hat nur eine vorbeugende Wirkung. Systemische Fungizide besitzen auch eine heilende Wirkung, d.h. sie erfassen auch noch wenige Tage alte <i>Septoria</i> -Infektionen. Azbany, Chamane und LS Azoxy sind in Weizen nur gegen <i>Septoria nodorum</i> zugelassen. Strobilurin-Solo-Präparate wie Azbany, Chamane oder LS Azoxy besitzen aufgrund weitverbreiteter Resistenz keine ausreichende Wirkung gegen <i>Septoria tritici</i> .
	Amistar Gold	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Amistar Max	W	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW,T	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Azbany	W	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Cayunis	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m	F	1,0 l	
	Cayunis Xpro Set = Cayunis + Siltra Xpro	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NW701	F	W: 0,9 + 0,9 l	
DI,T		05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	T: 0,8 + 0,8 l		
Chamane	W	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l		

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre ( <i>Septoria tritici</i> ) und Blatt- und Spelzenbräune ( <i>Septoria nodorum</i> )	Cherokee Neo, Hint	WW,SW,DU,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	Amistar Max ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Delaro Forte	WW,SW,DI,DU,T	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Max = Elatus Era + Amistar Max	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Flexure	W,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Folpan 500 SC, Nafabo	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	42	1,5 l	
	Greteg	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Input Classic	W,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre ( <i>Septoria tritici</i> ) und Blatt- und Spelzenbräune ( <i>Septoria nodorum</i> )	Jordi	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	Maganic hat die Zulassung ab voll entwickeltem Fahnenblatt (BBCH 39). Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51).  Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Jordi Power = Jordi + Nafabo	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	42	1,5 + 1,5 l	
	Joust	W	07, 09	NW 5(5/**)m NT850, NW800, VA271	35	0,8 l	
	LS Azoxy	W	09	NW 5(5/**)m NW701	F	1,0 l	
	Maganic	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/**)m	F	1,0 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/**)m	F	1,0 l	
	Navura	W,T	05, 07, 09	NW 5(**/**)m NT140	35	1,5 l	
	Orius	T	07, 08	NW 10(5/5/**)m NW701	F	1,5 l	
	Panorama	WW,SW, DI,R,T	05, 07, 08, 09	NW 5(**/**)m NW706, NW800, VA275	35	0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/**)m	35	0,65 l	
Pioli	W,T	07, 08, 09		F	2,0 l		

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre ( <i>Septoria tritici</i> ) und Blatt- und Spelzenbräune ( <i>Septoria nodorum</i> )	Proline	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Remocco 60, Sirena EC	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Revystar	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
		T	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l	
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	35	1,5 + 0,5 l	
		T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	35	1,1 + 0,35 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m VA271	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	W,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre ( <i>Septoria tritici</i> ) und Blatt- und Spelzenbräune ( <i>Septoria nodorum</i> )	Soratel	WW,SW,T	07, 09	NW 5(**/*)m NT140	F	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Tokyo	WW,SW,DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW,DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,T	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Univoq Xtra = Univoq + Regoral	W,T	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 + 0,3 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW,DU	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben, Talius Pro	W	07, 08, 09	NW 5(**/*)m	F	1,0 l	
	Xenial	W,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Ambarac	W	02, 05, 07, 08,	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	Hohe Infektionsgefahr nach Vorfrucht Mais, nicht-wendender Bodenbearbeitung, anfälligen Sorten und warmer Witterung mit einzelnen gewittrigen Niederschlägen Mitte des Ährenschiebens bis Ende der Blüte.  Elatus Era, Pioli, Siltra Xpro oder Skyway Xpro sollten zur Resistenzvermeidung in Spritzfolgen nur bei Vorbehandlung ohne Carboxamidpräparate (z.B. Cayunis, Elatus Era, Elatus Plus, Jordi, Pioli, Revytrex, Vastimo, Xpro-Produkte) eingesetzt werden.
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW701, VA277	42	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU,SG	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 l	
	Elatus Era Sympara	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	W	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Flexure	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW701, VA277	42	1,25 l	
	Folicur, Horizon	W (ohne DU)	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,0 l	
	Input Classic	W,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW701	F	1,25 l	
	Joust	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT850, VA271	35	0,8 l	
Maganic	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l		

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	VextaSil ist ein empfohlener Zusatzstoff
	Navura	W, T	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Panorama	WW,SW, DI	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m VA275	35	0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m NT850	35	0,65 l	
	Proline	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Remocco 60, Sirena EC	W	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Siltra Xpro	W,DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m VA271	F	1,0 l	
	Sirena Pro Pack = Sirena EC + Protendo Forte + VextaSil	WW,SW, DU	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT850	35	1,0 + 0,5 + 0,2 l	
Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l		

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	
	Soratel	WW,SW	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	
	Tebucur 250 EW	W,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,25 l W: 1,0 l	
	Tokyo	WW,SW, DI,DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W	05, 07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l	
	Verben, Talius Pro	W	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	F	1,0 l	

## Infos zum Getreide

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ramularia-Sprenkelkrankheit ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Amistar Max	G	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,5 l	Die typischen Sprenkelnekrosen erscheinen meist erst nach dem Ährenschieben, oft nach einem Witterungsumschwung von bewölkt und regnerisch (strahlungsarm) auf sonnig mit starkem Anstieg der Temperatur und der Globalstrahlung. Fungizide mindern den Schadensverlauf, wenn sie in den empfindlichen Entwicklungsstadien zwischen Fahnenblattstadium (BBCH 39) und Beginn der Blüte (BBCH 61) möglichst kurz vor oder kurz nach einem Witterungsumschwung zu einer Hochstrahlungsphase eingesetzt werden. Folpet (z.B. in Folpan 500 SC, Nafabo oder Amistar Max) ist ein Kontaktwirkstoff zur Befallsminderung. Da <i>Ramularia collo-cygni</i> mittlerweile in ganz Bayern eine zunehmende Resistenz gegen wichtige Fungizidwirkstoffe zeigt, kann die Folpet-Ergänzung die Wirkung gegen die Sprenkelkrankheit verbessern und zugleich die Ausbreitung der Resistenzen verzögern. Empfohlen wird eine Kombination mit Gerstenfungiziden, welche die Wirkstoffe Mefentrifluconazol oder Prothioconazol enthalten.
	Ascra Xpro	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	G	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Balaya	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Cayunis	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m	F	1,0 l	
	Cayunis Xpro Set = Cayunis + Siltra Xpro	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m NW701	F	0,8 + 0,8 l	
	Delaro Forte	G	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Max = Elatus Era + Amistar Max	G	05, 07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
Flexure	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l		

### Infos zum Getreide

### Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ramularia-Sprenkelkrankheit ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Folpan 500 SC, Nafabo	G	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW706	42	1,5 l	Maganic hat die Zulassung ab voll entwickeltem Fahnenblatt (BBCH 39).
	Input Classic	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Jordi Power = Jordi + Nafabo	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	42	1,5 + 1,5 l	
	Joust	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT850, VA271	35	0,6 l	
	Maganic	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Navura	G	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Revystar	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NT140	35	1,5 + 0,5 l	

**Infos zum Getreide**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ramularia-Sprenkelkrankheit ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Soratel	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	
	Vastimo	G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Xenial	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!