

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Bekämpfungszeitraum Ende der Bestockung bis Spitzen des Fahnenblattes nach der Hauptinfektionsperiode. Infektionsgefahr bei längeren feuchtkühlen Witterungsperioden. Warndiensthinweise beachten. Ausbringung in Kombination mit Wachstumsreglern ist möglich. Die aufgeführten Präparate wirken zugleich gegen zahlreiche Blattkrankheitserreger. Bis 2024 war Abran statt Soratel Partner im Avastel-Pack. Auf teils abweichende Indikationen und Auflagen ist bei Altware zu achten.
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW, WR,T	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Fandango	W,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 08,	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,25 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Flexure	W,G,R,T,H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	F	1,25 l	
	Input Classic	W,G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	W,G	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Navura	W	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Tokyo	WW,SW, DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Traciafin	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Unix	W,G,R,T	09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	1,0 kg	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU,G,R, WT	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Verben, Talius Pro	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Xenial	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Im Frühjahr zu Epidemiebeginn bis spätestens zur Getreideblüte. Bis 2024 war Abran statt Soratel Partner im Avastel-Pack. Auf teils abweichende Indikationen und Auflagen ist bei Altware zu achten.
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ascra Xpro	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW, G,WR,T	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU, G,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
Fandango	W,G,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Flexure	W,G,R,T,H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	F	1,25 l	Reine Schwefel-Präparate. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide. Reines Schwefel-Präparat. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide.	
	Input Classic	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l		
	Input Triple	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l		
	Jordi	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l		
	Joust	W,T	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT850, NW800, VA271	35		0,8 l
				07, 09	NW 5(*/*/*)m NT850, VA271	35		0,6 l
	Kayak	G		NW 10(5/5/*)m NW706	49	1,5 l		
	Kumulus WG, Netzschwefel Stulln, Thiovit Jet	W,G,R				35		6 kg
	Microthiol WG	W,G,R,T,H				35		7,5 kg
	Navura	W,T		05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35		1,5 l
Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,WT		05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Pronto Plus	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	Reines Schwefel-Präparat in einer SC- Formulierung. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide.
	Prosaro, Sympara	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar	W,G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
		DI,R,T,H	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	
	Skyway Xpro	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Talius	W,G,R,T	05, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,25 l	
	Thiopron	W,G,R,T	07		F	7,5 l	
	Tokyo	WW,SW, DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
G		07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Traciafin	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich)
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,T	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU, WT	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Vegas Plus	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW 20(15/10/10)m VA271	F	0,8 l	
	Verben, Talius Pro	W,G,WT	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Xenial	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Abran	WW,SW,DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Bei warmer Witterung schnelle Vermehrung möglich, daher in der Ährenphase auf langanhaltenden Fungizidschutz achten. Amistar Max ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ambarac	W,G	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Amistar, Regoral	W,G,R,T,H	09	NW 5(*/*/*)m	F	1,0 l	
	Amistar Gold	W,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Amistar Max	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	W,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G,H	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW, G,WR,T	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	Bis 2024 war Abran statt Soratel Partner im Avastel-Pack. Auf teils abweichende Indikationen und Auflagen ist bei Altware zu achten.
	Azbany	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	W,R,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	W,G,R	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Comet	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU,G,R, T	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Domark 10 EC	W	05, 07, 08, 09		F	1,25 l	
	Elatus Era	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42 G: F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 1,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	

Infos zum Getreide

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Elatus Era Star = Elatus Era + Amistar	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42 G:F	1,0 + 0,5 l	
	Elatus Era Sympara	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	42 G:	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	W,G,R,T	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Fezan	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Flexure	W,G,R,T,H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	F	1,25 l	
	Folicur	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l W: 1,0 l	
	Greteg	W,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Input Classic	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	R	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Joust	W,R,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT850, NW800,	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT850, VA271	35	0,6 l	
	LS Azoxy	W,G,R,T	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	
		H	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/**)m	F	1,0 l	Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51).	
	Navura	W,G,R	05, 07, 09	NW 5(**/*)m NT140	35	1,5 l		
	Orius	W,G,R,T	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l W: 1,25 l		
		G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/**)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l		
	Panorama	WW,SW, DI,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 5(**/*)m NW706, NW800, VA275	35	0,5 l		
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,R	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l		
	Pioli	W,G,R,T	07, 08, 09		F	2,0 l		Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Proline, Curbatur	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l		
		G	07, 08, 09	NW 5(5/**)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l		
	Pronto Plus	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l		
	Prosaro, Sympara	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l		
	Revystar	W,G,T	07, 09	NW 5(5/**)m	35	1,5 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/**)m	35	1,5 l	
		R,T	05, 07, 09	NW 5(5/**)m	35	1,125 l	
	Revytrex + Comet	W,G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
		R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,1 + 0,35 l	
		DI,R,T,H	07, 08, 09	NW 10(5/5/**)m	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	W,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/**)m NW706	F	1,25 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/**)m NW705	F	1,0 l	
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(**/**)m	42	1,2 l	
	Soratel	WW,SW, G,WR,T	07, 09	NW 5(**/**)m NT140	F	0,8 l	
	Tebucur 250 EW	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/**)m NW701	F	1,0 l	
	Tokyo	WW,SW, DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/**)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/**)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Tomec	WW,SW, G,R,T,H	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Traciafin	WW,SW,DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,R	05,07,09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l R: 1,5 l	
	Univoq Xtra = Univoq + Regoral	W,R,T	05,07,09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 + 0,3 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Xenial	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Abran	WW,SW,DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Bei feuchtkühler Witterung und anfälliger Sorte schnelle Vermehrung möglich, daher bei Befallsbeginn sofort handeln. Amistar Max ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich). Bis 2024 war Abran statt Soratel Partner im Avastel-Pack. Auf teils abweichende Indikationen und Auflagen ist bei Altware zu achten.
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ambarac	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Amistar Gold	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Amistar Max	W	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Balaya	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	W	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	W	09	NW 5(5/**)m	35	1,0 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU,G,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Comet	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Domark 10 EC	W	05, 07, 08, 09		F	1,25 l	
	Elatus Era	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Star = Elatus Era + Amistar	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 0,5 l	
	Elatus Era Sympara	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	W,T	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Flexure	W,G,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	F	1,25 l	
	Greteg	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/**)m	F	0,5 l	
	Input Classic	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Input Triple	W	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800, VA275	F	1,25 l	
	Joust	W	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT850, NW800, VA271	35	0,8 l	
	LS Azoxy	W	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	
	Navura	W,T	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Panorama	WW,SW, DI,R,T	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NW706, NW800, VA275	35	0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	
	Soratel	WW,SW	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	
	Tebucur 250 EW	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Tokyo	WW,SW, DI,DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
				NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Tomec	WW,SW, G,R,T,H	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Traciafin	WW,SW, DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
				NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,T	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Univoq Xtra = Univoq + Regoral	W,T	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 + 0,3 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Vastimo	W	07, 08, 09	NW 5(5/**)m	F	2,0 l	
	Verben, Talius Pro	W	07, 08, 09	NW 5(5/**)m	F	1,0 l	
	Xenial	W,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Abran	WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Längere Nässeperioden fördern die Krankheitsausbreitung. Fungizideinsatz ab BBCH 31 je nach Temperatur 7 - 14 Tage nach Infektionsbeginn. Bis 2024 war Abran statt Soratel Partner im Avastel-Pack. Auf teils abweichende Indikationen und Auflagen ist bei Altware zu achten.
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ambarac	G,R	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	G,WR	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Azbany	G,R,T	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
Balaya	G,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium- Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	G,R	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Cherokee Neo, Hint	G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Comet	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Delaro Forte	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	G,R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	G,R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	G,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Flexure	G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	F	1,25 l	
	Folicur	G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l	
	Input Classic	G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Joust	R	07, 09	NW 5(5/**)m NT850, NW800,	35	0,8 l	Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Solosanwendung wird auch nicht empfohlen.
		G	07, 09	NW 5(**/**)m NT850, VA271	35	0,6 l	
	LS Azoxy	G,R,T	09	NW 5(5/**)m NW701	F	1,0 l	
	Navura	G,R	05, 07, 09	NW 5(**/**)m NT140	35	1,5 l	
	Orius	G,R	07, 08	NW 10(5/5/**)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/**)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Panorama	G	05, 07, 08, 09	NW 5(**/**)m NW706, NW800, VA275	35	0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	G,R,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/**)m	35	0,65 l	
	Pioli	G,R	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Proline, Curbatur	R	07, 08, 09	NW 10(5/5/**)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
G		07, 08, 09	NW 5(5/**)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium- Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Pronto Plus	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
			05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l	
	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
			05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,1 + 0,35 l	
	Skyway Xpro	R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Soratel	WW,SW, WR	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	
	Tokyo	R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Tomec	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Traciafin	WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	R	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 l	
	Univoq Xtra = Univoq + Regoral	R	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 + 0,3 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	G	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben, Talius Pro	G,WR	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Xenial	G,R	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Abran	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Zu Beginn der Befallsausbreitung bis Ende des Ährenschiebens. Ausbreitung durch feuchtwarme Witterung begünstigt. Bis 2024 war Abran statt Soratel Partner im Avastel-Pack. Auf teils abweichende Indikationen und Auflagen ist bei Altware zu achten.
	Ambarac	G	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	G	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Azbany	G	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	G	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	G	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Cherokee Neo, Hint	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Comet	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Delaro Forte	G	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Elatus Era	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	G	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,25 l	
	Flexure	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	F	1,25 l	
	Folicur	G	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l	
	Input Classic	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Joust	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT850, VA271	35	0,6 l	
	Kayak	G		NW 10(5/5/*)m NW706	49	1,5 l	
	LS Azoxy	G	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	
	Navura	G	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Orius	G	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Pecari 300 EC, Protendo Forte	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Pioli	G,R	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Proline, Curbatur	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
	Skyway Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Soratel	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	
	Tokyo	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Tomec	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Traciafin	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	G	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Vastimo	G	07, 08, 09	NW 5(5/**)m	F	2,0 l	
	Verben, Talius Pro	G	07, 08, 09	NW 5(**/**)m	F	1,0 l	
	Xenial	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	Abran	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Die Ausbreitung wird begünstigt durch warme, wechselfeuchte Witterungsabschnitte mit hoher Luftfeuchte. Besonders hohe Gefährdung bei Weizenvorfrucht mit Minimalbodenbestellung und anfälligen Sorten. Bis 2024 war Abran statt Soratel Partner im Avastel-Pack. Auf teils abweichende Indikationen und Auflagen ist bei Altware zu achten.
	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Comet	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Fandango	W	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Flexure	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	F	1,25 l	
	Input Classic	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	W	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	Navura	W	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
	Soratel	WW,SW	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	
	Tokyo	WW,SW, DI,DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
	Univoq	W	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l	
	Vastimo	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Xenial	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Abran	WW,SW,DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Feuchtwarme Witterung begünstigt Infektionen durch <i>Septoria nodorum</i> , feuchtkühle die durch <i>Septoria tritici</i> . Folpan 500 SC ist ein reines Kontaktfungizid und hat nur eine vorbeugende Wirkung. Systemische Fungizide besitzen auch eine heilende Wirkung, d.h. sie erfassen auch noch wenige Tage alte <i>Septoria</i> -Infektionen. Azbany, Chamane und LS Azoxy sind in Weizen nur gegen <i>Septoria nodorum</i> zugelassen. Strobilurin-Solo-Präparate wie Amistar, Azbany, Chamane, Comet, LS Azoxy oder Tomec besitzen aufgrund weitverbreiteter Resistenz keine ausreichende Wirkung gegen <i>Septoria tritici</i> .
	Ambarac	W,T	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Amistar Gold	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Amistar Max	W	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW,T	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Azbany	W	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	W	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW,DU,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW,DI,DU,T	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Elatus Era	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Flexure	W,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	F	1,25 l	
	Folpan 500 SC	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	42	1,5 l	
	Greteg	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Input Classic	W,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Joust	W	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT850, NW800, VA271	35	0,8 l	
	LS Azoxy	W	09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Navura	W,T	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Orius	T	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Panorama	WW,SW, DI,R,T	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NW706, NW800, VA275	35	0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pioli	W,T	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
T		05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
		T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,1 + 0,35 l	
	Skyway Xpro	W,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
	Soratel	WW,SW,T	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	
	Tokyo	WW,SW,DI,DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW,DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,T	05,07,09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Univoq Xtra = Univoq + Regoral	W,T	05,07,09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 + 0,3 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW,DU	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben, Talius Pro	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Xenial	W,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Abran	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Hohe Infektionsgefahr nach Vorfrucht Mais, nicht-wendender Bodenbearbeitung, anfälligen Sorten und warmer Witterung mit einzelnen gewittrigen Niederschlägen Mitte des Ährenschiebens bis Ende der Blüte. Elatus Era, Pioli oder Skyway Xpro sollten zur Resistenzvermeidung in Spritzfolgen nur bei Vorbehandlung ohne Carboxamidpräparate (z.B. Alonty, Elatus Era, Elatus Plus, Pioli, Priaxor, Revytrex, Vastimo, Xpro- Produkte) eingesetzt werden.
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ambarac	W	02, 05, 07, 08,	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	WW,SW	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Caramba, Aptrell 60, Plexeo, Remocco 60,	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Cherokee Neo, Hint	WW,SW, DU,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW701, VA277	42	1,25 l	
	Delaro Forte	WW,SW, DI,DU,SG	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 l	
	Elatus Era Sympara	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	42	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	W	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Fezan	W (ohne DU)	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Flexure	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW701, VA277	F	1,25 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Folicur	W (ohne DU)	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,0 l	VextaSil ist ein empfohlener Zusatzstoff
	Input Classic	W,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW701	F	1,25 l	
	Joust	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT850, NW800, VA271	35	0,8 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Navura	W	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Panorama	WW,SW, DI	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m VA275	35	0,5 l	
	Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m NT850	35	0,65 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Sirena Pro Pack = Sirena EC + Protendo Forte + VextaSil	WW,SW, DU	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT850	35	1,0 + 0,5 + 0,2 l	
Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l		

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	
	Soratel	WW,SW	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	
	Tebucur 250 EW	W,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,25 l W: 1,0 l	
	Tokyo	WW,SW, DI,DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
				NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
				NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l	
	Verben, Talius Pro	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ramularia-Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo-cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Amistar Max	G	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW705, VA320	F	1,5 l	Die typischen Sprenkelnekrosen erscheinen meist erst nach dem Ährenschieben, oft nach einem Witterungsumschwung von bewölkt und regnerisch (strahlungsarm) auf sonnig mit starkem Anstieg der Temperatur und der Globalstrahlung. Fungizide mindern den Schadensverlauf, wenn sie in den empfindlichen Entwicklungsstadien zwischen Fahnenblattstadium (BBCH 39) und Beginn der Blüte (BBCH 61) möglichst kurz vor oder kurz nach einem Witterungsumschwung zu einer Hochstrahlungsphase eingesetzt werden. Folpet (in Folpan 500 SC oder Amistar Max) ist ein Kontaktwirkstoff zur Befallsminderung. Da <i>Ramularia collo-cygni</i> mittlerweile in ganz Bayern eine zunehmende Resistenz gegen wichtige Fungizidwirkstoffe zeigt, kann die Folpet-Ergänzung die Wirkung gegen die Sprenkelkrankheit verbessern und zugleich die Ausbreitung der Resistenzen verzögern. Empfohlen wird eine Kombination mit Gersten-fungiziden, welche die Wirkstoffe Mefentrifluconazol oder Prothioconazol enthalten.
	Ascra Xpro	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Avastel Pack = Pioli + Soratel	G	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	1,5 + 0,75 l	
	Balaya	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Delaro Forte	G	07, 08, 09	NW 15(10/10/5)m VA271	F	1,5 l	
	Elatus Era	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Flexure	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	F	1,25 l	
	Folpan 500 SC	G	07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,5 l	
	Input Classic	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G	05, 07, 08, 09	NW -(15/15/10)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Joust	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT850, VA271	35	0,6 l	

Infos zum Getreide
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ramularia-Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo-cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Navura	G	05, 07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	35	1,5 l	
	Revystar	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
	Skyway Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Soratel	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m NT140	F	0,8 l	
	Vastimo	G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Xenial	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT140	56	1,5 l	

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!