

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------|---|----|--------------|---|
| Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>) | Abran | WW,SW, DU,WR,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | Bekämpfungszeitraum Ende der Bestockung bis Spitzen des Fahnenblattes nach der Hauptinfektionsperiode. Infektionsgefahr bei längeren feuchtkühlen Witterungsperioden. Warndiensthinweise beachten. Ausbringung in Kombination mit Wachstumsreglern ist möglich. Die aufgeführten Präparate wirken zugleich gegen zahlreiche Blattkrankheitserreger. |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Ascra Xpro | W | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | | G | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,2 l | |
| | Aurelia | W,WR | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Avastel Pack = Pioli + Abran | WW,SW, DU,WR,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | Aviator Xpro | W | 05, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Fandango | W,R | 05, 07, 08, | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | | G | 05, 07, 08, | NW 5(5/*/*)m NW701 | F | 1,25 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----|-------------|-------------|
| Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>) | Flexity | W,G,R,T | 07 | | F | 0,5 l | |
| | Hint | WW,SW, DU,G,R,T, H | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, VA277 | 42 | 1,25 l | |
| | Input Classic | W,G,R | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Input Triple | W,G,T | 05, 07, 08, 09 | NW -(10/5/*)m NW706, NW800 | F | 1,25 l | |
| | Osiris MP = Caramba + Curbatur | W,R | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |
| | | G | 05, 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |
| | Proline, Curbatur | W,R | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Siltra Xpro | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | | DI,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|------------------------------------|-------------------------|---------------|---|----|----------------|-------------|
| Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>) | Tokyo | WW,SW, DU,R,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Traciafin | WW,SW, DU,WR,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | | G,H | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Unix | W,G,R,T | 09 | NW 15(10/5/5)m NW706 | F | 1,0 kg | |
| | Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC | WW,SW, DU,G,R, WT | 05, 07, 09 | NW 15(10/5/5)m NW706 | 35 | 0,5 kg + 0,5 l | |
| | Unix Top = Unix + Plexeo | W,G,R,T | 05, 07, 08 | NW 15(10/5/5)m NW706 | F | 0,5 kg + 1,0 l | |
| | Verben | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------|---|----|--------------------|--|
| Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>) | Abran | WW,SW, DU,WR,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | Im Frühjahr zu Epidemiebeginn bis spätestens zur Getreideblüte. |
| | | G,H | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Ascra Xpro | W,T | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | | G | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,2 l | |
| | Aurelia | W,WR | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Avastel Pack = Pioli + Abran | WW,SW, DU,WR,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | Aviator Xpro | W,G,R,T | 05, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l G: 1,0 l | |
| | Fandango | W,G,R | 05, 07, 08, | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l G: 1,25 l | |
| | Flexity | W,G,R,T | 07 | | F | 0,5 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--|--------------------------|-----------------------|---|-------|---------|--|
| Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>) | Hint | WW,SW, DU,G,R,T, H | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, VA277 | 42 | 1,25 l | Kantik mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023! |
| | Input Classic | W,G,R,T | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Jordi | W,G,R,T | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/10)m NW706 | F | 1,5 l | |
| | (Kantik) | W,R,T | 05, 07, 08, 09 | NW -(-/15/15)m NW706, NW712 VV214 | F | 2,0 l | |
| | Kayak | G | | NW 10(5/5/*)m NW706 | 49 | 1,5 l | Reine Schwefel-Präparate. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide. Reines Schwefel-Präparat. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide. |
| | Kumulus WG, Netzschwefel Stulln, Thiovit Jet | W,G,R | | | 35 | 6 kg | |
| | Microthiol WG | W,G,R,T,H | | | 35 | 7,5 kg | |
| | Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte | WW,SW, DU,WT | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,65 l | |
| | Pronto Plus | W,G,R | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, NT101 | F | 1,5 l | |
| | Property 180 SC | WW,G | 08, 09 | | F | 0,5 l | |
| Prosaro, Sympara | W,G,R,T | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--|-----------|---|------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>) | Protektor Pro = Property 180 SC + Patel 300 EC | WW | 05, 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,5 + 0,5 l | Reines Schwefel-Präparat in einer SC-Formulierung. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide. |
| | Revystar | W,G | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Revystar + Flexity | W,G,T | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 + 0,5 l | |
| | Siltra Xpro | W,G | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | | | DI,R,T,H | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | |
| | Soleil | W | 05, 07, 08, 09 | NW 5(*/*/*)m | 42 | 1,2 l | |
| | Skyway Xpro | W,R | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW705 | F | |
| | Talius | W,G,R,T | 05, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 0,25 l | |
| | Thiopron | W,G,R,T | 07 | | F | 7,5 l | |
| Tokyo | WW,SW, DU,R,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|----|-------------------|---|
| Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>) | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich) |
| | Traciafin | WW,SW, DU,WR,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | 35 | 0,8 l | |
| | | G,H | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Univoq | W,T | 05,07, 09 | NW -(15/10/5)m NW706 | F | 2,0 l T: 1,5 l | |
| | Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC | WW,SW, DU, WT | 05, 07, 09 | NW 15(10/5/5)m NW706 | 35 | 0,5 kg + 0,5 l | |
| | Vastimo | W,T | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 2,0 l | |
| | Vegas Plus | W,G,T | 05, 07, 08, 09 | NW 20(15/10/10)m VA271 | F | 0,8 l | |
| | Verben | W,G,WT | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--------------|---------------|--------------------|---|----|---------|---|
| Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer | Abran | WW,SW,DU,WR,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | Bei warmer Witterung schnelle Vermehrung möglich, daher in der Ährenphase auf langanhaltenden Fungizidschutz achten. Ampera mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023! |
| | | G,H | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Alonty | W,G,R,T | 07, 09 | NW 5(*/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Ambarac | W,G | 02, 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | Amistar Gold | W,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | |
| | (Ampera) | W,R,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Ascra Xpro | W,R | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | | G,H | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,2 l | |
| | Aurelia | W,WR | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--|-------------------|-------------------|---|------------|--------------------|-------------|
| Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer | Avastel Pack = Pioli + Abran | WW,SW, DU,WR,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | Aviator Xpro | W,G,R,T | 05, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l G: 1,0 l | |
| | Azbany, Azoxystar SC | W,G,R,T,H | 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |
| | Balaya | W,R,T | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC | W,G,R | 05, 07, 08 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | Chamane | W,G,R,T,H | 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 l | |
| | Comet | W,G,R,T | 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | F | 1,25 l | |
| | Domark 10 EC | W | | | F | 1,25 l | |
| | Elatus Era | W,G,R,T | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 42 G: F | 1,0 l | |
| | Elatus Era Folpan | W,G | 05, 07, 08, 09 | NW -(-/20/15)m NW706 | 42 | 1,0 + 1,5 l | |
| | Elatus Era Sympara | W,G,R,T | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m NW701 | 42 G: F | 1,0 + 0,33 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|---------------|--------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer | Elatus Plus | W,G,R,T | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 0,75 l | Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | Fandango | W,G,R,T | 05, 07, 08, | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l G: 1,25 l | |
| | Fezan | W | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW705 | F | 1,0 l | |
| | Folicur | W,G,R | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701, NT101 | F | 1,25 l W: 1,0 l | |
| | Greteg | W,R,T | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 0,5 l | |
| | Hint | WW,SW, DU,G,R,T, H | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, VA277 | 42 | 1,25 l | |
| | Input Classic | W,G,R,T | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Input Triple | R | 05, 07, 08, 09 | NW -(10/5/*)m NW706, NW800 | F | 1,25 l | |
| | Jordi | W,G,R,T | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/10)m NW706 | F | 1,5 l | |
| | (Kantik) | W,R | 05, 07, 08, 09 | NW -(-/15/15)m NW706, NW712 VV214 | F | 2,0 l | |
| | Magnello | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51). |
| Orius | W,G,R,T | 07, 08 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l W: 1,25 l | | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|---|----------------|-------------------|---|-------------|-------------|--|
| Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer | Osiris MP = Caramba + Curbatur | W,R | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | | G | 05, 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |
| | Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte | WW,SW, DU,R | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,65 l | |
| | Pioli | W,G,R,T | 07, 08, 09 | | F | 2,0 l | |
| | Priaxor | W,G,R,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Proline, Curbatur | W,R | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Pronto Plus | W,G,R | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, NT101 | F | 1,5 l | |
| | Prosaro, Sympara | W,G,R,T | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | Revystar | W,G,T | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| Revystar + Flexity | W,G,T | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 + 0,5 l | | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|------------------|---------------|----------------|---|----|--------------|-------------|
| Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer | Revytrex | W | 05, 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | | R,T | 05, 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,125 l | |
| | Revytrex + Comet | W,G | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 35 | 1,5 + 0,5 l | |
| | | R,T | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 35 | 1,1 + 0,35 l | |
| | Siltra Xpro | W,G | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | | DI,R,T,H | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | |
| | Sinstar | WW,SW,G | 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,0 l | |
| | Skyway Xpro | W,R,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW705 | F | 1,0 l | |
| | Soleil | W | 05, 07, 08, 09 | NW 5(*/*/*)m | 42 | 1,2 l | |
| | Tebucur 250 EW | W | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | Tokyo | WW,SW, DU,R,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | |
| | | G,H | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | |
| | Torero | W,G,R,T,H | 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|-----------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|----|-------------------|--|
| Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer | Traciafin | WW,SW,DU,WR,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | 35 | 0,8 l | Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich). |
| | | G,H | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Univoq | W,R | 05,07,09 | NW -(15/10/5)m NW706 | F | 2,0 l R: 1,5 l | |
| | Unix Top = Unix + Plexeo | W,G,R | 05, 07, 08 | NW 15(10/5/5)m NW706 | F | 0,5 kg + 1,0 l | |
| | Vastimo | W,T | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 2,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|---------------------------------|----------------|--------------------------|---|----|--------------|--|
| Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>) | Abran | WW,SW, DU,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | Bei feuchtkühler Witterung und anfälliger Sorte schnelle Vermehrung möglich, daher bei Befallsbeginn sofort handeln. |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Alonty | W,T | 07, 09 | NW 5(*/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Ambarac | W | 02, 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | Amistar Gold | W | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | |
| | Ascra Xpro | W | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Aurelia | W | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Avastel Pack = Pioli + Abran | WW,SW, DU,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | Aviator Xpro | W | 05, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Balaya | W | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--|-----------|----------------|---|----|--------------|--|
| Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>) | Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC | W | 05, 07, 08 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,5 l | Elatus Plus wird nicht solo vermarket. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | Chamane | W | 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 l | |
| | Comet | W | 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | F | 1,25 l | |
| | Domark 10 EC | W | | | F | 1,25 l | |
| | Elatus Era | W | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | F | 1,0 l | |
| | Elatus Era Folpan | W | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15)m NW706 | 42 | 1,0 + 1,5 l | |
| | Elatus Era Sympara | W | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m NW701 | F | 1,0 + 0,33 l | |
| | Elatus Plus | W | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 0,75 l | |
| | Fandango | W,T | 05, 07, 08, | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Greteg | W,T | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 0,5 l | |
| | Input Classic | W | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Osiris MP = Caramba + Curbatur | W | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--|--------------|-------------------|---|----|-------------|---|
| Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>) | Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte | WW,SW, DU | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,65 l | Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | Priaxor | W | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Proline, Curbatur | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Pronto Plus | W | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, NT101 | F | 1,5 l | |
| | Prosaro, Sympara | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | Protektor Pro = Property 180 SC + Patel 300 EC | WW | 05, 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,5 + 0,5 l | |
| | Revystar | W,T | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Revystar + Flexity | W,T | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 + 0,5 l | |
| | Revytrex | W | 05, 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Revytrex + Comet | W | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 35 | 1,5 + 0,5 l | |
| | Siltra Xpro | W,DI,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | |
| | Sinstar | W | 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,0 l | |
| | Skyway Xpro | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------|-------------------|--|
| Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>) | Soleil | W | 05, 07, 08, 09 | NW 5(*/*/*)m | 42 | 1,2 l | Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich). |
| | Tebucur 250 EW | W | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | Tokyo | WW,SW, DU,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | |
| | Torero | W | 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |
| | Traciafin | WW,SW, DU,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | 35 | 0,8 l | |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Univoq | W,T | 05,07, 09 | NW -(15/10/5)m NW706 | F | 2,0 l T: 1,5 l | |
| | Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC | WW,SW, DU | 05, 07, 09 | NW 15(10/5/5)m NW706 | 35 | 0,5 kg + 0,5 l | |
| | Unix Top = Unix + Plexeo | W | 05, 07, 08 | NW 15(10/5/5)m NW706 | F | 0,5 kg + 1,0 l | |
| | Vastimo | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 2,0 l | |
| Verben | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|---------------------------------|-----------|--------------------------|---|----|--------------|--|
| <i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>) | Abran | WR,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | Längere Nässeperioden fördern die Krankheitsausbreitung. Fungizideinsatz ab BBCH 31 je nach Temperatur 7 - 14 Tage nach Infektionsbeginn. Ampera mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023! |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Alonty | G,R | 07, 09 | NW 5(*/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Ambarac | G,R | 02, 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | (Ampera) | R | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Ascra Xpro | R | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | | G | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,2 l | |
| | Aurelia | WR | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Avastel Pack = Pioli + Abran | WR,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--|-----------|-------------------|---------------------------------|----|--------------------|--|
| <i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>) | Aviator Xpro | G,R | 05, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l G: 1,0 l | Elatus Plus wird nicht solo vermarket. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | Azbany, Azoxystar SC | G,R,T | 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |
| | Balaya | G,R | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC | G,R | 05, 07, 08 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | Comet | G,R | 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | F | 1,25 l | |
| | Elatus Era | G,R | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | F | 1,0 l | |
| | Elatus Era Folpan | G | 05, 07, 08, 09 | NW -(-/20/15)m NW706 | 42 | 1,0 + 1,5 l | |
| | Elatus Era Sympara | G,R | 05, 07, | NW 15(10/5/5)m NW701 | F | 1,0 + 0,33 l | |
| | Elatus Plus | G,R | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 0,75 l | |
| | Fandango | G,R | 05, 07, 08, | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l G: 1,25 l | |
| | Folicur | G,R | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701, NT101 | F | 1,25 l | |
| | Hint | G,R,T | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, VA277 | 42 | 1,25 l | |
| | Input Classic | G,R | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706 | F | 1,25 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|---|-----------|-------------------|---|-------|-------------|--|
| <i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>) | Input Triple | G,R | 05, 07, 08, 09 | NW -(10/5/*)m NW706,NW800 | F | 1,25 l | Mirage 45 EC mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023! |
| | Jordi | G,R | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/10)m NW706 | F | 1,5 l | |
| | (Mirage 45 EC) | R | 09 | NW 10(5/5/*)m NW705 | F | 1,2 l | |
| | Orius | G,R | 07, 08 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Osiris MP = Caramba + Curbatur | R | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |
| | | G | 05, 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |
| | Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte | G,R,WT | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,65 l | Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | Pioli | G,R | 07, 08, 09 | | F | 2,0 l | |
| Priaxor | G,R | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--------------------|-----------|-------------------|---|----|--------------|-------------|
| <i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>) | Proline, Curbatur | R | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Pronto Plus | G,R | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, NT101 | F | 1,5 l | |
| | Prosaro, Sympara | G,R | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | Revystar | G | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Revystar + Flexity | G | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 + 0,5 l | |
| | Revytrex | G | 05, 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | | R | 05, 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,125 l | |
| | Revytrex + Comet | G | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 35 | 1,5 + 0,5 l | |
| | | R | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 35 | 1,1 + 0,35 l | |
| | Siltra Xpro | G | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | | R | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | |
| | Sinstar | G | 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|------------------------------------|-----------|---------------|---|----|----------------|--|
| <i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>) | Skyway Xpro | R,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich). |
| | | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW705 | F | 1,0 l | |
| | Tokyo | R,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | |
| | Torero | G,R,T | 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |
| | Traciafin | WR,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | 35 | 0,8 l | |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Univoq | R | 05,07, 09 | NW -(15/10/5)m NW706 | F | 1,5 l | |
| | Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC | G | 05, 07, 09 | NW 15(10/5/5)m NW706 | 35 | 0,5 kg + 0,5 l | |
| | Unix Top = Unix + Plexeo | G | 05, 07, 08 | NW 15(10/5/5)m NW706 | F | 0,5 kg + 1,0 l | |
| | Vastimo | G,R | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 2,0 l | |
| | Verben | G,WR | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|---|--|-----------|--------------------------|---|----|--------------|---|
| Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>) | Abran | G | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | Zu Beginn der Befallsausbreitung bis Ende des Ährenschiebens. Ausbreitung durch feuchtwarme Witterung begünstigt. |
| | Alonty | G | 07, 09 | NW 5(*/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Ambarac | G | 02, 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | Ascra Xpro | G | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,2 l | |
| | Aurelia | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Avastel Pack = Pioli + Abran | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | Aviator Xpro | G | 05, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,0 l | |
| | Azbany, Azoxystar SC | G | 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |
| | Balaya | G | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC | G | 05, 07, 08 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | Chamane | G | 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 l | |
| | Comet | G | 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | F | 1,25 l | |
| | Elatus Era | G | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------|--|----|--------------|---|
| Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>) | Elatus Era Folpan | G | 05, 07, 08, 09 | NW -(-/20/15)m NW706 | 42 | 1,0 + 1,5 l | Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | Elatus Era Sympara | G | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m NW701 | F | 1,0 + 0,33 l | |
| | Elatus Plus | G | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 0,75 l | |
| | Fandango | G | 05, 07, 08, | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,25 l | |
| | Folicur | G | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701, NT101 | F | 1,25 l | |
| | Hint | G | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, VA277 | 42 | 1,25 l | |
| | Input Classic | G | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Input Triple | G | 05, 07, 08, 09 | NW -(10/5/*)m NW706, NW800 | F | 1,25 l | |
| | Jordi | G | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/10)m NW706 | F | 1,5 l | |
| | Kayak | G | | NW 10(5/5/*)m NW706 | 49 | 1,5 l | |
| | Orius | G | 07, 08 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Osiris MP = Caramba + Curbatur | G | 05, 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|---|--|-----------|----------------|-------------------------------------|----|-------------|--|
| Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>) | Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte | G | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,65 l | Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | Pioli | G,R | 07, 08, 09 | | F | 2,0 l | |
| | Priaxor | G | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Proline, Curbatur | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Prosaro, Sympara | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | Protektor Pro = Property 180 SC + Patel 300 EC | G | 05, 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,5 + 0,5 l | |
| | Revystar + Flexity | G | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 + 0,5 l | |
| | Revytrex | G | 05, 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Revytrex + Comet | G | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 35 | 1,5 + 0,5 l | |
| | Siltra Xpro | G | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | Sinstar | G | 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,0 l | |
| | Skyway Xpro | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW705 | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|---|------------------------------------|-----------|---------------|--|----|----------------|-------------|
| Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>) | Tokyo | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | |
| | Torero | G | 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |
| | Traciafin | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC | G | 05, 07, 09 | NW 15(10/5/5)m NW706 | 35 | 0,5 kg + 0,5 l | |
| | Unix Top = Unix + Plexeo | G | 05, 07, 08 | NW 15(10/5/5)m NW706 | F | 0,5 kg + 1,0 l | |
| | Vastimo | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 2,0 l | |
| | Verben | G | | NW 5(*/*/*)m | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|-----------------------------------|--------------|-------------------|---|----|--------------|---|
| DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>) | Abran | WW,SW, DU | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | Die Ausbreitung wird begünstigt durch warme, wechselfeuchte Witterungsabschnitte mit hoher Luftfeuchte. Besonders hohe Gefährdung bei Weizenvorfrucht mit Minimalbodenbestellung und anfälligen Sorten. |
| | Ascra Xpro | W | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Aurelia | W | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Avastel Pack = Pioli + Abran | WW,SW, DU | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | Aviator Xpro | W | 05, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Comet | W | 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | F | 1,25 l | |
| | Fandango | W | 05, 07, 08, | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Hint | WW,SW, DU | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, VA277 | 42 | 1,25 l | |
| | Input Classic | W | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Input Triple | W | 05, 07, 08, 09 | NW -(10/5/*)m NW706, NW800 | F | 1,25 l | |
| | Jordi | W | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/10)m NW706 | F | 1,5 l | |
| | Osiris MP = Caramba + Curbatur | W | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|---|---------------|-------------------|---|-------|-------------|---|
| DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>) | Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte | WW,SW, DU | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,65 l | Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | Priaxor | W | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Proline, Curbatur | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Prosaro, Sympara | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | Revytrex + Comet | W | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 35 | 1,5 + 0,5 l | |
| | Siltra Xpro | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | | DI,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | |
| | Skyway Xpro | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Tokyo | WW,SW, DU | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | |
| | Traciafin | WW,SW, DU | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | 35 | 0,8 l | |
| | Univoq | W | 05,07, 09 | NW -(15/10/5)m NW706 | F | 2,0 l | Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich). |
| Vastimo | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 2,0 l | | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--|------------|--------------------|--------------------------------------|----|--------------|---|
| Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>) | Abran | WW,SW,DU,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | Feuchtwarme Witterung begünstigt Infektionen durch <i>Septoria nodorum</i> , feuchtkühle die durch <i>Septoria tritici</i> . Folpan 500 SC ist ein reines Kontaktfungizid und hat nur eine vorbeugende Wirkung. Systemische Fungizide besitzen auch eine heilende Wirkung, d.h. sie erfassen auch noch wenige Tage alte <i>Septoria</i> -Infektionen. Azbany, Azoxystar SC, Azoxystar SC, Chamane und Sinstar sind in Weizen nur gegen <i>Septoria nodorum</i> zugelassen. Strobilurin-Solo-Präparate wie Azbany, Azoxystar SC, Azoxystar SC, Chamane, Comet, Sinstar oder Torero besitzen aufgrund weitverbreiteter Resistenz keine ausreichende Wirkung gegen <i>Septoria tritici</i> . |
| | Alonty | W,T | 07, 09 | NW 5(*/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Ambarac | W,T | 02, 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | Amistar Gold | W | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | |
| | Ascra Xpro | W,T | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Aurelia | W,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Avastel Pack = Pioli + Abran | WW,SW,DU,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | Aviator Xpro | W,T | 05, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Azbany, Azoxystar SC | W | 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |
| | Balaya | W,T | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC | W,T | 05, 07, 08 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | Chamane | W | 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--------------------|---------------|----------------|--|----|--------------|---|
| Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>) | Elatus Era | W,T | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | F | 1,0 l | Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | Elatus Era Folpan | W | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15)m NW706 | 42 | 1,0 + 1,5 l | |
| | Elatus Era Sympara | W,T | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m NW701 | F | 1,0 + 0,33 l | |
| | Elatus Plus | W,T | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 0,75 l | |
| | Fandango | W,T | 05, 07, 08 | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Folpan 500 SC | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | 42 | 1,5 l | |
| | Greteg | W,T | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 0,5 l | |
| | Hint | WW,SW, DU,R,T | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, VA277 | 42 | 1,25 l | |
| | Input Classic | W,T | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Input Triple | W,T | 05, 07, 08, 09 | NW -(10/5/*)m NW706, NW800 | F | 1,25 l | |
| | Jordi | W,T | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/10)m NW706 | F | 1,5 l | |
| | (Kantik) | W,T | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, NW712 VV214 | F | 2,0 l | |
| | Magnello | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51). |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|---|-----------------|-------------------|---|----|-------------|---|
| Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>) | (Mirage 45 EC) | W | 09 | NW 10(5/5/*)m NW705 | F | 1,2 l | Mirage 45 EC mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023! Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. |
| | Orius | T | 07, 08 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Osiris MP = Caramba + Curbatur | W | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |
| | | T | 05, 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |
| | Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte | WW,SW, DU,WT | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,65 l | |
| | Pioli | W,T | 07, 08, 09 | | F | 2,0 l | |
| | Priaxor | W,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Proline, Curbatur | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | | T | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | |
| | Prosaro, Sympara | W,T | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|--|-------------------------|-------------------|---|----|--------------|-------------|
| Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>) | Protektor Pro = Property 180 SC + Patel 300 EC | WW | 05, 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m | 35 | 0,5 + 0,5 l | |
| | Revystar + Flexity | W,T | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 + 0,5 l | |
| | Revytrex | W | 05, 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | | T | 05, 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,125 l | |
| | Revytrex + Comet | W | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 35 | 1,5 + 0,5 l | |
| | | T | 05, 07 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 35 | 1,1 + 0,35 l | |
| | Siltra Xpro | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | | DI,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | |
| | Sinstar | W | 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,0 l | |
| | Skyway Xpro | W,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Tokyo | WW,SW, DU,R,T | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | 0,8 l | |
| | Torero | W | 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |
| | Traciafin | WW,SW, DU,WR,T DU | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|----|-------------------|--|
| Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>) | Univoq | W,T | 05,07,09 | NW -(15/10/5)m NW706 | F | 2,0 l T: 1,5 l | Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich). |
| | Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC | WW,SW,DU | 05, 07, 09 | NW 15(10/5/5)m NW706 | 35 | 0,5 kg + 0,5 l | |
| | Unix Top = Unix + Plexeo | W,T | 05, 07, 08 | NW 15(10/5/5)m NW706 | F | 0,5 kg + 1,0 l | |
| | Vastimo | W,T | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 2,0 l | |
| | Verben | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|---|--|----------------|--------------------|---|----|--------------|--|
| <i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall) | Abran | WW,SW, DU | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | Hohe Infektionsgefahr nach Vorfrucht Mais, nicht-wendender Bodenbearbeitung, anfälligen Sorten und warmer Witterung mit einzelnen gewittrigen Niederschlägen Mitte des Ährenschiebens bis Ende der Blüte. Elatus Era, Pioli oder Skyway Xpro sollten zur Resistenzvermeidung in Spritzfolgen nur bei Vorbehandlung ohne Carboxamidpräparate (z.B. Alonty, Elatus Era, Elatus Plus, Pioli, Priaxor, Revytrex, Vastimo, Xpro- Produkte) eingesetzt werden. Ampera mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023! |
| | | G | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 0,8 l | |
| | Ambarac | W | 02, 05, 07, 08, | NW 10(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | (Ampera) | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | Aurelia | W | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 0,8 l | |
| | Avastel Pack = Pioli + Abran | WW,SW, DU | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena | W,T | 05, 07, 08 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,5 l | |
| | Elatus Era | W | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 42 | 1,0 l | |
| | Elatus Era Sympara | W | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m NW701 | 42 | 1,0 + 0,33 l | |
| | Fandango | W | 05, 07, 08 | NW 5(5/5/*)m NW701 | F | 1,5 l | |
| | Fezan | W (ohne DU) | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | |
| | Folicur | W (ohne DU) | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701, NT101 | F | 1,0 l | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|---|---|--------------------|-------------------|---|-------|-------------|--|
| <i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall) | Gigant | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m NG342-1 | F | 1,0 l | |
| | Hint | WW,SW, DU,G,R,T | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, VA277 | 42 | 1,25 l | |
| | Input Classic | W,T | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW701 | F | 1,25 l | |
| | Magnello | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 1,0 l | |
| | Osiris MP = Caramba + Curbatur | W | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 1,0 + 0,5 l | |
| | Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte | WW,SW, DU | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NT850 | 35 | 0,65 l | |
| | Polyversum | W,G | | | F | 0,1 kg | Polyversum ist ein biologisches Pflanzenschutzmittel (<i>Phytium oligandrum</i> M1) zur Stärkung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte. Die Anwendung ist vom Drei-Blatt-Stadium (BBCH 13) bis Mitte der Blüte (BBCH 65) insgesamt 2x (Gerste) oder 3x (Weizen) möglich. Wirkung stark schwankend bzw. wetterabhängig. |
| | Proline, Curbatur | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | F | 0,8 l | Präparat ist deshalb nur zur Befallsminderung bei schwachem |
| | Pronto Plus | W | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706, NT101 | F | 1,5 l | |
| Prosaro, Sympara | W | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,0 l | | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen | |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|---|----------------------|--|-------|
| <i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall) | Sirena Pro Pack = Sirena EC + Protendo Forte + VextaSil | WW,SW, DU | 05, 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NT850 | 35 | 1,0 + 0,5 + 0,2 l | VextaSil ist ein empfohlener Zusatzstoff | |
| | Siltra Xpro | W,DI,T | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m | F | 1,0 l | | |
| | Soleil | W | 05, 07, 08, 09 | NW 5(*/*/*)m | 42 | 1,2 l | | |
| | Skyway Xpro | W | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,25 l | | |
| | Tebucur 250 EW | W,T | 05, 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,25 l W: 1,0 l | | |
| | Tokyo | WW,SW, DU | G | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | | 0,8 l |
| | | | | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800 | 35 | | 0,8 l |
| | Traciafin | WW,SW, DU | G | 07, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | | 0,8 l |
| | | | | 07, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | | 0,8 l |
| | Univoq | W | 05,07, 09 | NW -(15/10/5)m NW706 | F | 2,0 l | Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich). | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|---|------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-------|--------------|--|
| <i>Ramularia</i> - Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo-cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken | Alonty | G | 07, 09 | NW 5(*/*/*)m | 35 | 1,5 l | Die typischen Sprenkelnekrosen erscheinen meist erst nach dem Ährenschieben, oft nach einem Witterungsumschwung von bewölkt und regnerisch (strahlungsarm) auf sonnig mit starkem Anstieg der Temperatur und der Globalstrahlung. Fungizide mindern den Schadensverlauf, wenn sie in den empfindlichen Entwicklungsstadien zwischen Fahnenblattstadium (BBCH 39) und Beginn der Blüte (BBCH 61) möglichst kurz vor oder kurz nach einem Witterungsumschwung zu einer Hochstrahlungsphase eingesetzt werden. Folpan 500 SC ist ein reines Kontaktfungizid zur Befallsminderung. Da <i>Ramularia collo-cygni</i> mittlerweile in ganz Bayern eine zunehmende Resistenz gegen wichtige Fungizidwirkstoffe zeigt, kann die Ergänzung von Folpan 500 SC die Wirkung gegen die Sprenkelkrankheit verbessern und zugleich die Ausbreitung der Resistenzen verzögern. Empfohlen wird eine Kombination mit Gerstenfungiziden, welche die Wirkstoffe Mefentrifluconazol oder Prothioconazol enthalten. |
| | Ascra Xpro | G | 05, 07, 09 | NW 5(5/5/*)m | F | 1,2 l | |
| | Avastel Pack = Pioli + Abran | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277 | F | 1,5 + 0,75 l | |
| | Aviator Xpro | G | 05, 09 | NW 10(5/5/*)m NW706 | F | 1,0 l | |
| | Balaya | G | 05, 07, 09 | NW 10(5/5/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Elatus Era | G | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | F | 1,0 l | |
| | Elatus Era Folpan | G | 05, 07, 08, 09 | NW -(/20/15)m NW706 | 42 | 1,0 + 1,5 l | |
| | Elatus Era Sympara | G | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m NW701 | F | 1,0 + 0,33 l | |
| | Folpan 500 SC | G | 07, 08, 09 | NW -(/20/15)m NW706 | 42 | 1,5 l | |
| | Input Classic | G | 07, 08, 09 | NW -(20/15/15)m NW706 | F | 1,25 l | |
| | Input Triple | G | 05, 07, 08, 09 | NW -(10/5/*)m NW706, NW800 | F | 1,25 l | |
| | Jordi | G | 05, 07, 08, 09 | NW -(20/15/10)m NW706 | F | 1,5 l | |
| | Revystar | G | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | |
| | Revystar + Flexity | G | 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,0 + 0,5 l | |
| Revytrex | G | 05, 07, 09 | NW 5(5/*/*)m | 35 | 1,5 l | | |

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

| Schaderreger | Präparate | Zulassung | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--|------------------|-----------|-------------------|------------------------|----|-------------|-------------|
| <i>Ramularia</i> - Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo- cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken | Revytrex + Comet | G | 05, 07, 08, 09 | NW 15(10/5/5)m | 35 | 1,5 + 0,5 l | |
| | Siltra Xpro | G | 07, 08, 09 | NW 10(5/5/*)m NW701 | F | 1,0 l | |
| | Skyway Xpro | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/5/*)m NW705 | F | 1,0 l | |
| | Vastimo | G | 07, 08, 09 | NW 5(5/*/*)m | F | 2,0 l | |

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!