Normale Mischverunkrautung, gewässerschonend

ohne Terbuthylazin-, S-Metolachlor- und Nicosulfuron-haltige Präparate

Stomp Aqua + Spectrum + MaisTer power (2,0 + 1,0 +1,0)

Stomp Aqua + MaisTer power (2,5 + 1,0)

Spectrum Plus + Task + FHS (3,0 + 0,3 + 0,2)

Spectrum Plus + Laudis (3,0 + 2,0)

Spectrum + Callisto (1,0 + 1,0)

Spectrum + Zingis + FHS (0,8 + 0,22 + 1,52)

(l,kg/ha)

MaisTer power (1,5)



Normale Mischverunkrautung

incl. Terbuthylazin und S-Metolachlor-haltige Präparate

Gardo Gold* + Callisto (2,0-3,0 + 0,5-0,75)

(= Zintan Gold Pack)

Laudis Aspect Pack (2,0 + 1,5)

MaisTer power Aspect Pack (1,0 + 1,0)

Successor T + Laudis (2,5-3,0 + 1,7-2,0)

(l,kg/ha)

***S-Metolachlor-Produkte dürfen 2024 letztmalig eingesetzt werden!**



Starker Hirsebesatz, incl. Ackerfuchsschwanz

ohne Terbuthylazin- und S-Metolachlor-haltige Präparate



Stomp Aqua + Spectrum + Motivell Forte [1)2)]
(2,0-2,5 + 1,0-1,25 + 0,5-0,6)

Stomp Aqua + Spectrum + MaisTer power
(2,0-2,5 + 1,0-1,25 + 1,0-1,25)

Spectrum Plus + Arigo[2)] + FHS
(2,5 - 3,0 + 0,25 - 0,3 + 0,25 - 0,3)

Spectrum + Elumis[2)] + Peak
(1,0 + 1,25 + 0,02)

(l,kg/ha)

1) oder vergleichbares Nicosulfuron-Präparat
2) Nicosulfuron nicht auf direkt an Gewässer angrenzende Flächen einsetzen



Spritzfolgen gegen starken Hirsebesatz

ohne Terbuthylazin und S-Metolachlor-haltige Präparate



Adengo (0,33) / Laudis (2,0)

Spectrum Plus (3,0) / Motivell Forte[1)2)] + Arrat + FHS (0,6 + 0,2 + 1,0)

(l,kg/ha)

Basisbehandlung im Keimblattstadium und Spritzfolgebehandlung nach Bedarf in NA 14-16

1) oder vergleichbares Nicosulfuron-Präparat
2) Nicosulfuron nicht auf direkt an Gewässer angrenzende Flächen einsetzen



Starker Hirsebesatz, incl. Ackerfuchsschwanz

incl. Terbuthylazin und S-Metolachlor-haltige Präparate



Gardo Gold* + Elumis[2)] + Peak (2,5 + 1,25 + 0,02)

Spectrum Gold + Callisto + Motivell Forte[1)2)] (2,0 + 0,8 + 0,5)

Spectrum Gold + Elumis[2)] + Peak (2,0 + 1,0 + 0,016)

Successor T + Elumis[2)] + Peak (2,5 + 1,25 + 0,02)

Dual Gold* + Elumis[2)] + Peak (1,25 + 1,25 + 0,02)

MaisTer power Aspect Pack (1,5 + 1,5)

1) oder vergleichbares Nicosulfuron-Präparat
2) Nicosulfuron nicht auf direkt an Gewässer angrenzende Flächen einsetzen

***S-Metolachlor-Produkte dürfen 2024 letztmalig eingesetzt werden!**



Sonderbehandlungen gegen Problemunkräuter

Arrat + Dash (0,2 + 1,0) z.B. Winden, Disteln, Lichtnelke, Stechapfel

Mais-Banvel WG (0,4 – 0,5) z.B. Winden, Winden-Knöterich, Gänsefuß

Harmony SX, Lupus SX (0,015 + Netzmittel) z.B. Ampfer

Daneva (2 x 0,75) z.B. Durchwuchs-Kartoffeln, Schachtelhalm

Effigo (0,35) z.B. Disteln, Kamille, Schwarzer Nachtschatten

Lontrel 720 SG bzw. 600 (0,16 bzw. 0,2) Acker-Kratzdistel

Tomigan 200 (0,9) gegen Winden (als Unterblattspritzung) (l,kg/ha)



Untersaat mit Deutschem und Welschem Weidelgras

l,kg/ha

Stomp Aqua 2,5-3,5
VA-NAK

oder l,kg/ha

Calaris 1,0
NA 11

und l,kg/ha

- Callisto 0,75-1,0
- Laudis 1,7
- Elumis 1,0[2)]
- Motivell Forte 0,35[1)2)]
+ Peak 0,02 od. Arrat 0,2

NA 12-13

Weidelgraseinsaat
mit 15-20 kg/ha bei 50-70 cm Maishöhe mit Pneumatikstreuer od. Gülleschleppschlauch

2 bis 3 Wochen Abstand

Unkrautkontrolle als Spritzfolgebehandlung im VA-NAK(NA-11) und NA-12/13

Bild: GWS-Nord

1) oder vergleichbares Nicosulfuron-Präparat
2) Nicosulfuron nicht auf direkt an Gewässer angrenzende Flächen einsetzen



Untersaat mit Rot- und Schafschwingel

Unkrautkontrolle als Einfachbehandlung im NA 12-14

l,kg/ha

Stomp Aqua 2,0-3,0

+

l,kg/ha

- Arrat 0,2
- Callisto 1,0
- Effigo 0,35
- Harmony SX 0,01-0,015
- Lontrel 600 0,15-0,2
- Onyx 0,75-1,5
- Peak 0,02

NA 12-14

Rotschwingel-Untersaat. Bild: Holtmann-Saaten

Schwingeleinsaat
mit 5-7 kg/ha vor, bei oder unmittelbar nach der Maissaat mit Drilltechnik