

Fungizide gegen Kraut- und Knollenfäule

Präparat	Wirkstoff		Aufwand- menge/ha	Anwen- dungen	Gewässerabstand bei abdrift- minderten Düsen von 0(50/75/90)%	Preis in €/ha
	Bezeichnung	g/kg bzw. l				
Kontaktmittel						
Carneol, Terminus	Fluazinam	500	0.4 l	8	NW 10(5/5/*)m	15
Gachinko, Leimay	Amisulbrom	200	0.5 l	6	NW 5(5/5/*)m	35
Ranman Top	Cyazofamid	160	0.5 l	6	NW 5(*/*/*)m	42
Shirlan, Nando 500 SC, Ohayo	Fluazinam	500	0.4 l	10	NW 10(5/5/*)m	17
lokalsystemische Mittel						
Carial Flex***	Cymoxanil + Mandipropamid	180 + 250	0.6 kg	3	NW>(*/*/*)	40
Curzate 60 WG	Cymoxanil	600	0.2 kg	6	NW(*/*/*)	14
Cymbal Flow	Cymoxanil	225	0.5 l	6	NW(*/*/*)	13
Grecale	Cymoxanil + Fluazinam	200 + 300	0.6 l	6	NW 15(10/5/5)m	?
Reboot	Cymoxanil + Zoxamide	330 + 330	0.45 kg	3	NW 5(5/5/*)m	39
Revus***	Mandipropamid	250	0.6 l	4	NW(*/*/*)	33
Revus Top***	Mandipropamid + Difenconazol	250 + 250	0.6 l	3	NW 5(5/5/*)m	45
Voyager***	Valifenalate + Fluazinam	150 + 200	1.0 l	3	NW 10(10/5/5)m	43
systemische Mittel						
Infinito	Propamocarb + Fluopicolide	625 + 62.5	1.6 l	4	NW 5(*/*/*)m	49
Omix Duo, Rival Duo	Cymoxanil + Propamocarb	50 + 400	2.5 l	1	NW(*/*/*)	?
Simpro	Cymoxanil + Propamocarb	50 + 400	2.5 l	4	NW(*/*/*)	?
Sporax	Propamocarb	722	1.4 l	6	NW(*/*/*)	?
Zorvec Entecta***	Oxathiapiprolin + Amisulbrom	48 + 240	0.25 l	3	NW5(5/*/*)	52
Mittel nur gegen Alternaria						
Belanty	Mefentrifluconazole	75	1.25 l	3	NW *(/*/*)m	28
Dagonis	Fluxapyroxad + Difenconazol	75 + 50	0.75 l	4	NW 5(*/*/*)m	52
Narita	Difenconazol	250	0.5 l	1	NW 5(5/*/*)m	22
Narita XL	Difenconazol	500	0.25	4	NW 10(5/5/*)m	22
Ortiva, Zaftra AZT 250 SC	Azoxystrobin	250	0.5 l	3/**	NW 5(5/*/*)m	13
Propulse	Prothioconazol + Fluopyram	125 + 125	0.5 l	3	NW 5(*/*/*)m	32
Signum	Pyraclostrobin + Boscalid	67 + 267	0.25 kg	4/**	NW 5(*/*/*)m	22

Preise inklusive Mehrwertsteuer; NW-Auflagen sind Auflagen zum Gewässerschutz.

Stand: März 2025

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt. Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!

* landesspezifische Regelungen und Vorgaben der Pflanzenschutzanwendungsverordnung zum Gewässerabstand beachten!; ** Gegen das Präparat besteht eine verbreitete Resistenz bei Alternaria-Arten, daher ist es möglichst nur 1x anzuwenden; *** Minderwirkung wegen Resistenzbildung möglich

