Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft

Fungizidstrategien in Getreide 2025

Stephan Weigand

Institut für Pflanzenschutz

(Stand: April 2025)

Fungizidstrategien in Winterweizen – Einmalbehandlung

bei geringem bis mittlerem Befallsdruck und wenig bis mittel anfälligen Sorten

BBCH 39 – 61[1)]
Septoria tritici, Braunrost, DTR, Mehltau, Gelbrost

1,5 l Ascra Xpro
1,0 l Elatus Era (+ 0,33 l Sympara)
1,0 l Elatus Era + 1,5 l Folpan 500 SC
1,5 l Pioli + 0,75 l Soratel
1,5 l Revytrex (+ 0,5 l Comet)
1,25 l Skyway Xpro
2,0 l Univoq [2)]
2,0 l Vastimo

1) Bei späteren Behandlungen ist eine Verminderung der Aufwandmengen um etwa 20 % möglich

2) ab BBCH 41 einsetzen. Bei erhöhtem Risiko für Braunrost-Spätbefall (Sorte, Lage) 2,0 l Univoq + 0,4 l Regoral / Azbany / Chamane o.a.



LfL

Fungizidstrategien in Winterweizen – Doppelbehandlung (ohne Fusariumrisiko)

bei mittlerem bis hohem Befallsdruck, bei mittel bis hoch anfälligen Sorten

1. Behandlung: BBCH 31 – 37

Mehltau [1], DTR, Septoria [2], Gelbrost [3] ,*Halmbruch

1,0 l Balaya
1,25 l *Xenial
1,0 l *Input Classic [4]
1,0 l *Input Triple
1,5 l *Delaro Forte
0,8 l *Verben
0,8 l *Aurelia / *Joust / *Tokyo u.a. [5]
0,5 kg *Unix + 0,5 l *Pecari 300 EC

2. Behandlung: BBCH 39 – 61 [6]

Septoria tritici, Braunrost, DTR, Mehltau, Gelbrost

1,2 l Ascra Xpro
0,8 l Elatus Era + 0,25 l Sympara
1,0 l Elatus Era (+ 1,5 l Folpan 500 SC)
1,2 l Pioli + 0,6 l Soratel
1,5 l Revytrex (+ 0,5 l Comet)
1,0 l Skyway Xpro
1,6 l Univoq [7]
1,6 l Vastimo

1) Bei starkem **Mehltau**-Befallsdruck Input Classic, Input Triple, Delaro Forte, Xenial oder 1,2 l Pronto Plus bevorzugen.

2) Bei starkem **Septoria**-Befallsdruck 1,5 l Folpan 500 SC zugeben

3) Bei **Gelb- oder Braunrost**befall und geringem Septoria-Risiko z.B. auch 1,0 l Folicur/Horizon, Tebucur 250 EW, 1,2 l Orius oder 1,2 l Pronto Plus

4) z.B. auch Cherokee Neo, Flexure oder Hint

5) z.B. auch Proline oder Traciafin

6) Bei später Erstbehandlung ab BBCH 33 lässt sich die Abfolge auch umdrehen: Start mit breitwirksamem SDHI- und Ährenbehandlung mit geeigneten Azolpräparat

7) ab BBCH 41 einsetzen. Bei erhöhtem Risiko für Braunrost-Spätbefall (Sorte, Lage) 1,5 l Univoq + 0,3 - 0,5 l Regoral / Azbany / Chamane u.a.

Zur Resistenzvermeidung ist eine Beschränkung der SDHI- und Picolinamid-Präparate auf eine Anwendung in der Vegetation ratsam, ebenso wie ein Wirkstoffwechsel innerhalb der Azole



LfL

Fungizidstrategien in Winterweizen - Doppelbehandlung (incl. Ährenfusarien)

insbesondere bei Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren (Vorfrucht Mais, reduzierte Bodenbearbeitung nach Mais oder Weizen, anfällige Sorte, Blattbehandlung mit Strobilurinen, für Fusarium günstige Witterung zur Blüte)

1. Behandlung: BBCH 33 – 39/49 [1]

Septoria tritici [2], Mehltau, Gelbrost ,DTR, (*Halmbruch)

1,2 - 1,5 l Ascra Xpro
0,8 - 1,0 l Elatus Era (+ 1,2 – 1,5 l Folpan 500 SC)
0,8 - 1,0 l Elatus Era (+ 0,25 – 0,33 l Sympara)
1,2 – 1,5 l Pioli + 0,6 – 0,75 l Soratel
1,2 - 1,5 l Revytrex (+ 0,4 - 0,5 l Comet)
1,6 – 2,0 l Univoq [3]
1,6 - 2,0 l Vastimo

Abschlussbehandlung: BBCH 59 – 69 [4]

Ährenfusarien (nach Witterung)
Septoria tritici, Braunrost, DTR, (Mehltau, Gelbrost)

1,0 l Prosaro
1,25 l Input Classic [5]
1,5 l Navura
1,0 l Sirena EC + 0,5 l Protendo Forte
1,0 l Verben

Bei geringem Fusarium-Risiko:
1,2 l Soleil
1,0 l Magnello
0,8 l Aurelia / Joust / Tokyo u.a. [6]
1,0 l Folicur / Horizon / Tebucur 250 EW

1) Volle Aufwandmengen für Behandlungen vor dem Fahnenblatt-Stadium (BBCH 39), für spätere Behandlungen genügen reduzierte Aufwandmengen
2) Bei starkem **Septoria**-Befallsdruck 1,5 l Folpan 500 SC zugeben
3) ab BBCH 41 einsetzen
4) Bei Trockenheit zur Blüte (ohne Fusarium-Risiko) reichen 70 bis 80 % der Aufwandmenge der erstgenannten Fusarienmittel zur Abschlussbehandlung
5) z.B. auch Cherokee Neo, Flexure oder Hint
6) z.B. auch Proline oder Traciafin

Zur Resistenzvermeidung ist eine Beschränkung der SDHI- und Picolinamid-Präparate auf eine Anwendung in der Vegetation ratsam, ebenso wie ein Wirkstoffwechsel innerhalb der Azole



LfL

Fungizidstrategien in Winterweizen – Einfachbehandlung oder Spritzfolgen

in Abhängigkeit des Schaderregers, von Beginn und Stärke des Befalls, der Sortenanfälligkeit und weiterer Risikofaktoren

Frühe Schossbehandlung BBCH 31- 33/37

Mehltau[1], DTR, Septoria[2], Gelbrost[3] , *Halmbruch

1,0 l Balaya
1,25 l *Xenial
1,0 l *Input Classic [4]
1,0 l *Input Triple
1,5 l *Delaro Forte
0,8 l *Verben
0,8 l *Aurelia / *Joust / *Tokyo u.a. [5]
0,5 kg *Unix + 0,5 l *Pecari 300 EC

Fahnenblatt-/Ährenbehandlung BBCH (33/) 39-61[6]

Septoria tritici, Braunrost, DTR, Mehltau, Gelbrost

1,2 - 1,5 l Ascra Xpro
0,8 - 1,0 l Elatus Era (+ 1,2 - 1,5 l Folpan 500 SC)
0,8 - 1,0 l Elatus Era (+ 0,25 - 0,33 l Sympara)
1,2 - 1,5 l Pioli + 0,6 - 0,75 l Soratel
1,2 - 1,5 l Revytrex (+ 0,4 - 0,5 l Comet)
1,6 – 2,0 l Univoq [7]
1,6 - 2,0 l Vastimo

Ähren- / Blütebehandlung BBCH 59-69 [8]

Ährenfusarien, Braurost, Septoria tritici, DTR

1,0 l Prosaro
1,25 l Input Classic [4]
1,5 l Navura
1,0 l Sirena EC + 0,5 l Protendo Forte
1,0 l Verben

Bei geringem Fusarium-Risiko:
1,2 l Soleil
1,0 l Magnello
0,8 l Aurelia / Joust / Tokyo u.a.[5]
1,0 l Folicur / Horizon / Tebucur 250 EW

1) Bei starkem **Mehltau**-Befallsdruck Input Classic, Input Triple, Delaro Forte, Xenial oder 1,2 l Pronto Plus bevorzugen

2) Bei starkem **Septoria**-Befallsdruck 1,5 l Folpan 500 SC zugeben

3) Bei **Gelb- oder Braunrost**befall und geringem Septoria-Risiko z.B. auch 1,0 l Folicur/Horizon, Tebucur 250 EW, 1,2 l Orius oder 1,2 l Pronto Plus

4) z.B. auch Cherokee Neo, Flexure oder Hint

5) z.B. auch Proline oder Traciafin

6) Volle Aufwandmengen für Einmalbehandlungen ab dem Fahnenblatt-Stadium (BBCH 39), für spätere Behandlungen sowie in Spritzfolgen genügen in der Regel reduzierte Aufwandmengen

7) ab BBCH 41 einsetzen. Als Abschlussbehandlung bei erhöhtem Risiko für Braunrost-Spätbefall (Sorte, Lage) 1,5 l Univoq + 0,3 - 0,5 l Regoral / Azbany / Chamane u.a.

8) Bei Trockenheit zur Blüte genügen 70 bis 80 % der Aufwandmenge der erstgenannten Mittel zur Abschlussbehandlung.

Zur Resistenzvermeidung ist eine Beschränkung der SDHI- und Picolinamid-Präparate auf eine Anwendung in der Vegetation ratsam, ebenso wie ein Wirkstoffwechsel innerhalb der Azole

Je nach Schaderreger und Befallsdruck:

1. Einmalbehandlung (SDHI/ Picolinamid-haltig)
2. Doppelbehandlung
   a.) Azol-Start/ SDHI oder Picolinamid-Abschluss
   b.) später SDHI-oder Picolinamid-Start/ Azol-Abschluss
3. Dreifachbehandlung (Sonderfall)
   früher Azol-Start/ SDHI oder Picolinamid/ Azol-Abschluss



LfL

Fungizidstrategien in Gerste - Einmalbehandlung

bei mittlerem Befallsdruck durch Pilzkrankheiten

BBCH 39 – 55 [1] - bei Umstellung auf strahlungsreiche Witterung
Ramularia-Sprenkelkrankheit, Netzflecken, Rhynchosporium, Zwergrost, (Mehltau)

1,2 l Ascra Xpro
1,5 l Balaya
1,0 l Elatus Era
1,5 l Jordi
1,5 l Pioli + 0,75 l Soratel
1,5 l Revytrex
1,5 l Navura
0,8 l Aurelia / Tokyo / Traciafin u.a.[2]

Für Gebiete mit regelmäßigem Ramularia-Auftreten [3]:
+ 1,5 l Folpan 500 SC
oder 1,5 l Amistar Max

Ohne Folpet-Zusatz [3] z. B. auch:
1,0 l Ascra Xpro + 0,25 l Aurelia / Tokyo / Traciafin u.a.[2]
1,2 l Balaya + 0,5 l Aurelia / Tokyo / Traciafin u.a. [2]



1) Bei späteren Behandlungen, in Gebieten ohne regelmäßigen Ramularia-Befall oder in Sommergerste sind auch um 20 % verminderte Aufwandmengen möglich

2) z.B. auch Proline

3) Statt Folpet ist, bei meist etwas geringerer und unsicherer Wirkung, auch der Zusatz von Schwefel als Kontaktmittel möglich, wie z.B. 4,0 l Thiopron oder 2,5 - 4,0 kg S über sonstige Schwefelpräparate

LfL

Fungizidstrategien in Gerste – Doppelbehandlung

bei sehr frühem Befallsdruck durch Pilzkrankheiten

1. Behandlung: BBCH 31 – 33

in Sommergerste auch um 20% verminderte Aufwandmengen möglich

Mehltau, Rhynchosporium, Netzflecken, Zwergrost (*Halmbruch)

0,8 l *Input Classic[1)] / *Input Triple
1,5 l *Delaro Forte
0,6 l *Verben
1,25 l *Xenial

Netzflecken, Zwergrost, Rhynchosporium, (*Halmbruch)

1,0 l Balaya
1,0 l *Fandango
0,5 kg *Unix + 0,5 l *Pecari 300 EC
1,0 l *Kayak + 0,5 l Orius
0,6 l *Aurelia / *Tokyo / *Traciafin u.a.[2)]

Mehltau, Zwergrost

1,2 l Pronto Plus

Mehltau

0,8 l Vegas Plus

[1)] z.B. auch Cherokee Neo, Flexure oder Hint

[2)] z.B. auch Proline

Zur Resistenzvermeidung ist in Spritzfolgen eine Beschränkung von Strobilurin-Präparaten (wie Balaya, Comet, Delaro Forte, Fandango oder Xenial), vor allem aber von SDHI-Präparaten (wie Elatus Era, Jordi, Pioli, Revytrex und alle Xpro-Mittel) auf je eine Anwendung in der Vegetation ratsam.

2. Behandlung: BBCH 39 – 55 [3)]

- bei Umstellung auf strahlungsreiche Witterung

Ramularia-Sprenkelkrankheit, Netzflecken, Zwergrost, Rhynchosporium

1,2 l Ascra Xpro
1,5 l Balaya
1,0 l Elatus Era
1,5 l Jordi
1,5 l Pioli + 0,75 l Soratel
1,5 l Revytrex
1,5 l Navura
0,8 l Aurelia / / Tokyo / Traciafin u.a.[1)]

Für Gebiete mit regelmäßigem Ramularia-Auftreten [4)]:
+ 1,5 l Folpan 500 SC
oder 1,5 l Amistar Max

[4)] Statt Folpet ist, bei meist etwas geringerer und unsicherer Wirkung, auch der Zusatz von Schwefel als Kontaktmittel möglich, wie z.B. 4,0 l Thiopron oder 2,5 - 4,0 kg S über sonstige Schwefelpräparate

Ohne Folpet-Zusatz [4)] z. B. auch:

1,0 l Ascra Xpro + 0,25 l Aurelia / Tokyo / Traciafin u.a.[1)]
1,2 l Balaya + 0,5 l Aurelia / Tokyo / Traciafin u.a.[1)]

[3)] Bei späteren Behandlungen, in Gebieten ohne regelmäßigen Ramularia-Befall oder in Sommergerste sind auch um 20 % verminderte Aufwandmengen möglich



LfL

Fungizidstrategien in Gerste – Einfach- oder Doppelbehandlung

Schossbehandlung: BBCH 31 – 33

- **nur bei frühem Befallsdruck nötig**

in Sommergerste auch um 20% verminderte Aufwandmengen möglich

Mehltau, Rhynchosporium, Netzflecken, Zwergrost (*Halmbruch)

0,8 l *Input Classic[1)] / *Input Triple
1,5 l *Delaro Forte
0,6 l *Verben
1,25 l *Xenial

Netzflecken, Zwergrost, Rhynchosporium, (*Halmbruch)

1,0 l Balaya
1,0 l *Fandango
0,5 kg *Unix + 0,5 l *Pecari 300 EC
1,0 l *Kayak + 0,5 l Orius
0,6 l *Aurelia / *Tokyo / *Traciafin u.a.[2)]

Mehltau, Zwergrost

1,2 l Pronto Plus

Mehltau

0,8 l Vegas Plus

[1)] z.B. auch Cherokee Neo, Flexure oder Hint

[2)] z.B. auch Proline

Zur Resistenzvermeidung ist in Spritzfolgen eine Beschränkung von Strobilurin-Präparaten (wie Balaya, Comet, Delaro Forte, Fandango oder Xenial), vor allem aber von SDHI-Präparaten (wie Elatus Era, Jordi, Pioli, Revytrex und alle Xpro-Mittel) auf je eine Anwendung in der Vegetation ratsam.

Fahnenblatt- /Ährenbehandlung: BBCH 39 – 55 [3)]

- bei Umstellung auf strahlungsreiche Witterung

Ramularia-Sprenkelkrankheit, Netzflecken, Zwergrost, Rhynchosporium

1,2 l Ascra Xpro
1,5 l Balaya
1,0 l Elatus Era
1,5 l Jordi
1,5 l Pioli + 0,75 l Soratel
1,5 l Revytrex
1,5 l Navura
0,8 l Aurelia / / Tokyo / Traciafin u.a.[1)]

Für Gebiete mit regelmäßigem Ramularia-Auftreten [4)]:
+ 1,5 l Folpan 500 SC
oder 1,5 l Amistar Max

[4)] Statt Folpet ist, bei meist etwas geringerer und unsicherer Wirkung, auch der Zusatz von Schwefel als Kontaktmittel möglich, wie z.B. 4,0 l Thiopron oder 2,5 - 4,0 kg S über sonstige Schwefelpräparate

Ohne Folpet-Zusatz [4)] z. B. auch:

1,0 l Ascra Xpro + 0,25 l Aurelia / Tokyo / Traciafin u.a.[1)]
1,2 l Balaya + 0,5 l Aurelia / Tokyo / Traciafin u.a.[1)]

[3)] Bei späteren Behandlungen, in Gebieten ohne regelmäßigen Ramularia-Befall oder in Sommergerste sind auch um 20 % verminderte Aufwandmengen möglich



LfL

Fungizidstrategien in Winterroggen - Einmalbehandlung

bei mittlerem, spätem Befallsdruck

BBCH 39 – 55 [1) 2)]
Braunrost, (Rhynchosporium)

1,0 l Elatus Era
1,5 l Balaya
1,1 l Revytrex + 0,35 l Comet
1,5 l Pioli + 0,75 l Soratel
1,25 l Skyway Xpro
1,5 l Univoq + 0,5 l Azbany / Chamane / LS Azoxy u.a.
2,0 l Vastimo
1,5 l Delaro Forte
0,8 l Chamane u.a.[3)] + 0,8 l Folicur/Horizon oder + 1,0 l Orius

1) Bei sehr geringem, späten Befallsdruck eignen sich zur Braunrostsabsicherung auch reine Azolpräparate, wie z. B. 1,0 l Folicur/Horizon, 1,2 l Orius, oder 1,0 l Prosaro

2) Mit etwa 20 % verringerter Aufwandmenge eignen sich die unter 1) genannten Azolpräparate auch für eine Nachbehandlung bei erneutem spätem Braunrostbefall in BBCH 61-69

3) z.B. auch Azbany oder LS Azoxy



Fungizidstrategien in Winterroggen - Doppelbehandlung

nur bei sehr frühem Befallsdruck durch Halmbruch, Mehltau oder Rhynchosporium-Blattflecken und spätem Befall durch Braunrost

1. Behandlung: BBCH 31 – 37
***Halmbruch, Rhynchosporium, (Mehltau)**

1,0 l *Input Classic [1)]
1,0 l *Input Triple
0,8 l *Verben
0,5 kg *Unix + 0,5 l *Pecari 300 EC
1,2 l Pronto Plus

2. Behandlung: BBCH 49 – 55 [2) 3)]
Braunrost

0,8 l Elatus Era
1,2 l Balaya
1,1 l Revytrex + 0,35 l Comet
1,2 l Pioli + 0,6 l Soratel
1,0 l Skyway Xpro
1,5 l Univoq + 0,5 l Azbany / Chamane / LS Azoxy u.a.
1,6 l Vastimo
1,5 l Delaro Forte
0,8 l Chamane u.a.[4)] + 0,8 l Folicur/Horizon oder + 1,0 l Orius

1) z.B. auch Cherokee Neo, Flexure oder Hint

2) Bei sehr geringem, späten Befallsdruck eignen sich zur Braunrostsabsicherung auch reine Azolpräparate, wie z. B. 1,0 l Folicur/Horizon, 1,2 l Orius, oder 1,0 l Prosaro.

3) Mit etwa 20 % verringerter Aufwandmenge eignen sich die unter 1) genannten Azolpräparate auch für eine Nachbehandlung bei erneutem spätem Braunrostbefall in BBCH 61-69

4) z.B. auch Azbany oder LS Azoxy



LfL

Fungizidstrategien in Winterroggen – Einmal- oder Doppelbehandlung

Erstbehandlung nur bei sehr frühem Befallsdruck durch Halmbruch, Mehltau oder Rhynchosporium-Blattflecken

Behandlung: BBCH 31 – 37
***Halmbruch, Rhynchosporium, (Mehltau)**

1,0 l *Input Classic [1)]
1,0 l *Input Triple
0,8 l *Verben
0,5 kg *Unix + 0,5 l *Pecari 300 EC
1,2 l Pronto Plus

bei mittlerem, späten Befallsdruck als Einmalbehandlung bzw. nach früher Erstbehandlung als Zweitbehandlung

Behandlung: BBCH 39 – 55 [2) 3)]
Braunrost

0,8 - 1,0 l Elatus Era
1,2 - 1,5 l Balaya
1,1 l Revytrex + 0,35 l Comet
1,2 - 1,5 l Pioli + 0,6 - 0,75 l Soratel
1,0 - 1,25 l Skyway Xpro
1,5 l Univoq + 0,5 l Azbany / Chamane / LS Azoxy u.a.
1,6 – 2,0 l Vastimo
1,5 l Delaro Forte
0,8 l Chamane u.a.[4)] + 0,8 l Folicur/Horizon oder + 1,0 l Orius

1) z.B. auch Cherokee Neo, Flexure oder Hint

2) Bei sehr geringem, späten Befallsdruck eignen sich zur Braunrostsabsicherung auch reine Azolpräparate, wie z. B. 1,0 l Folicur/Horizon, 1,2 l Orius, oder 1,0 l Prosaro.

3) Mit etwa 20 % verringerter Aufwandmenge eignen sich die unter 1) genannten Azolpräparate auch für eine Nachbehandlung bei erneutem spätem Braunrostbefall in BBCH 61-69

4) z.B. auch Azbany oder LS Azoxy



LfL

Fungizidstrategien in Triticale - Einmalbehandlung

bei mittlerem Befallsdruck
(bei geringem Befallsdruck und gesunden Sorten sind Fungizidbehandlungen meist unwirtschaftlich)

BBCH 39 – 61 (69) [1) 2)]
Mehltau[3)], Gelbrost, Septoria tritici, Septoria nodorum, DTR, Braunrost, *Ährenfusarien (BBCH 61 – 69)

0,8 - 1,0 l *Elatus Era
1,2 – 1,5 l Balaya
1,25 - 1,5 l Jordi
1,2 – 1,5 l Pioli + 0,6 – 0,75 l *Soratel
1,1 l Revytrex + 0,35 l Comet
1,0 - 1,25 l *Skyway Xpro
1,5 l *Univoq [4)]
1,5 l Delaro Forte
0,8 l Chamane u.a.[5)] + 0,75 l Input Classic [6)] oder + 0,75 l Input Triple oder + 0,6 l Verben oder + 1,0 l Jordi
1,5 l *Navura
1,0 - 1,25 l *Input Classic [6)]
1,0 l *Prosaro

1) Ab dem Ährenschieben ist bei geringem Befallsdruck eine Verminderung der Aufwandmengen um 20 % möglich

2) Behandlungen gegen Ährenfusarien sollten dagegen insbesondere bei Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren (Vorfrucht Mais, reduzierte Bodenbearbeitung nach Mais oder Weizen, anfällige Sorte, für Fusarium günstige Witterung zur Blüte) mit den höheren Aufwandmengen erfolgen

3) Bei stärkerem Mehltaubefall Jordi, Input Classic oder Input Triple bevorzugen oder als Mehltau-Ergänzung z.B. 0,8 l Vegas Plus zumischen

4) ab BBCH 41 einsetzen. Bei erhöhtem Risiko für Braunrost-Spätbefall (Sorte, Lage) 0,5 l Azbany / Chamane u.a. zumischen

5) z.B. auch Azbany oder LS Azoxy

6) z.B. auch Cherokee Neo, Flexure oder Hint



Fungizidstrategien in Triticale - Doppelbehandlung

bei hohem Befallsdruck

1. Behandlung: BBCH 31 – 37 [1)]

Mehltau, Halmbruch, Rost
1,0 l Input Classic [2)]
1,0 l Input Triple
0,8 l Verben
1,25 l Xenial
0,5 kg Unix + 0,5 l Pecari 300 EC

Rost
1,2 l Orius
1,0 l Tebucur 250 EW

2. Behandlung: BBCH 39 – 61 (69) [3) 4)]

Mehltau, Gelbrost, Septoria tritici, Septoria nodorum, DTR, Braunrost, *Ährenfusarien (BBCH 61 – 69)
0,8 - 1,0 l *Elatus Era
1,2 l Balaya
1,25 l Jordi
1,2 l Pioli + 0,6 l *Soratel
1,1 l Revytrex + 0,35 l Comet
1,0 - 1,25 l *Skyway Xpro
1,5 l *Univoq [5)]
1,5 l Delaro Forte
0,8 l Chamane u.a. [6)] + 0,75 l Input Classic oder + 0,75 l Input Triple oder + 0,6 l Verben oder + 1,0 l Jordi
1,5 l *Navura
1,0 - 1,25 l *Input Classic
1,0 l *Prosaro



1) Bei frühem Befallsdruck und geplanter Fusariumbehandlung eignen sich ab BBCH 33 auch die unter BBCH 39-61 aufgeführten Carboxamid- und Strobilurin-Mischungen mit etwa 20 % reduzierter Aufwandmenge

2) z.B. auch Cherokee Neo, Flexure oder Hint

3) Ab dem Ährenschieben ist bei geringem Befallsdruck eine Verminderung der Aufwandmengen um 20 % möglich

4) Behandlungen gegen Ährenfusarien sollten dagegen insbesondere bei Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren (Vorfrucht Mais, reduzierte Bodenbearbeitung nach Mais oder Weizen, anfällige Sorte, für Fusarium günstige Witterung zur Blüte) mit den höheren Aufwandmengen erfolgen

5) ab BBCH 41 einsetzen. Bei erhöhtem Risiko für Braunrost-Spätbefall (Sorte, Lage) 0,5 l Azbany / Chamane u.a. zumischen

6) z.B. auch Azbany oder LS Azoxy

LfL

Fungizidstrategien in Triticale – Einfach- oder Doppelbehandlung

Erstbehandlung bei frühem Befallsdruck

Behandlung: BBCH 31 – 37 [1)]

Mehltau, Halmbruch, Rost
1,0 l Input Classic [2)]
1,0 l Input Triple
0,8 l Verben
1,25 l Xenial
0,5 kg Unix + 0,5 l Pecari 300 EC

Rost
1,2 l Orius
1,0 l Tebucur 250 EW

bei mittlerem, späten Befallsdruck als Einmalbehandlung
bzw. nach früher Erstbehandlung als Zweitbehandlung

Behandlung: BBCH 39 – 61 (69) [3) 4)]

Mehltau, Gelbrost, Septoria tritici, Septoria nodorum, DTR, Braunrost, *Ährenfusarien (BBCH 61 – 69)
0,8 - 1,0 l *Elatus Era
1,2 l Balaya
1,25 l Jordi
1,2 l Pioli + 0,6 l *Soratel
1,1 l Revytrex + 0,35 l Comet
1,0 - 1,25 l *Skyway Xpro
1,5 l *Univoq [5)]
1,5 l Delaro Forte
0,8 l Chamane u.a. [6)]
- + 0,75 l Input Classic [2)] oder
- + 0,75 l Input Triple oder
- + 0,6 l Verben oder
- + 1,0 l Jordi

1,5 l *Navura
1,0 - 1,25 l *Input Classic
1,0 l *Prosaro



1) Bei frühem Befallsdruck und geplanter Fusariumbehandlung eignen sich ab BBCH 33 auch die unter BBCH 39-61 aufgeführten Carboxamid- und Strobilurin-Mischungen mit etwa 20 % reduzierter Aufwandmenge

2) z.B. auch Cherokee Neo, Flexure oder Hint

3) Ab dem Ährenschieben ist bei geringem Befallsdruck eine Verminderung der Aufwandmengen um 20 % möglich

4) Behandlungen gegen Ährenfusarien sollten dagegen insbesondere bei Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren (Vorfrucht Mais, reduzierte Bodenbearbeitung nach Mais oder Weizen, anfällige Sorte, für Fusarium günstige Witterung zur Blüte) mit den höheren Aufwandmengen erfolgen

5) ab BBCH 41 einsetzen. Bei erhöhtem Risiko für Braunrost-Spätbefall (Sorte, Lage) 0,5 l Azbany / Chamane u.a. zumischen

6) z.B. auch Azbany oder LS Azoxy

LfL