

**Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen  
ausgewählter Getreideherbizide für die Unkrautbehandlung Herbst 2020**

Präparat	Gewässerabstand [m]					Nicht-Zielflächen Abstand <sup>3)</sup> [m]								Sonstige Auflagen <sup>4)</sup>
	Hang- auflage <sup>1)</sup>	Abdrift <sup>2)</sup> je nach Risikokategorie bzw. Abdriftklasse				Abdriftminderungsklasse je nach Düsentechnik								
		Standard	0%	D / 50%	C / 75%	B / 90%	0%		50%		75%		90%	
	Randstreifen [m]	Abstand [m]				Anteil an Kleinstrukturen ausreichend ?								
						NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	
Axial 50	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Franzi, Fence	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sword	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Traxos	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tribun 75 WG	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cadou SC - bis 0,24 l / ha	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cadou SC - bis 0,5 l / ha	10	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Cleanshot	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Axial Komplett	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Pointer SX, Trimmer SX	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Trimmer WG						20	0	20	0	20	0	0	0	
Niantic - 0,15 kg/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Niantic - 0,3 kg/ha	-	*	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	5 - 0#	0	5 - 0#	0	NW800
Niantic - 0,4 kg/ha	-	*	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5 - 0#	0	NW800
Saracen	-	*	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5 - 0#	0	
Zypar	20	5	5	5	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Saracen Delta	5	5	5	5	*	25-20#	20	25-20#	20	5 - 0#	0	5 - 0#	0	
BeFlex	10	10	5	5	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sunfire	20	10	5	5	*	20	0	0	0	0	0	0	0	NW800
Lentipur 700, UP CTU	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG405, NG414, NG337
Carmina 640 - 2,5 l/ha	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG405, NG414, NG337
Carmina 640 - 3,5 l/ha	20	15	10	5	5	20	0	20	0	20	0	0	0	NG405, NG414, NG337
Toluron 700 SC, CTU 700 SC	20	15	10	5	5	20	0	20	0	20	0	0	0	NG405, NG414, NG337
Alliance	10	20	10	5	5	20	0	0	0	0	0	0	0	
Herold SC, Mertil	20		15	10	5	20	0	20	0	0	0	0	0	
Diflanil 500 SC, Sempra	20			20	10	25-20#	20	25-20#	20	5 - 0#	0	5 - 0#	0	NW800
Boxer	-				*							0	0	NT 145,146,170
Addition, Agolin	20				5							0	0	NT 145,146,170, NW800
Jura	20				5							0	0	NT 145,146,170, NW800
Trinity	20				5							0	0	NT 145,146,170 NG337, NW800
Picon	-				5							5 - 0#	0	NT 145,146,170
Malibu	10				5							5 - 0#	0	NT 145,146,170
Stomp Aqua - NA bis 3,5 l/ha	5				5							5 - 0#	0	NT 145,146,170
Activus SC	5				10							0	0	NT 145,146,170
Battle Delta - bis 0,425 l/ha	20				10	20	0	0	0	0	0	0	0	
Battle Delta - bis 0,6 l/ha	20				15	20	0	0	0	0	0	0	0	
Carpatus SC, Broadcast	20				15	20	0	20	0	20	0	0	0	

■ = keine Anwendung möglich.

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand beachten!

#) verringerter Abstand zu Hecken auf ehemals landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen.

(...) Zulassung ausgelaufen, Ablauffrist beachten.

Weitere Erläuterungen zu den Auflagen siehe nächste Seite!

1) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat.

2) Auflagen-Code siehe: 'www.lfl.bayern.de/ips/pflanzenschutzmittel'

3) Abstände sind nicht erforderlich:

- bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
- bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3 m breit sind, oder
- bei der Anwendungen mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten.
- in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulisse siehe '<https://www.julius-kuehn.de/sf/ab/raeumliche-analysen-und-modellierung/verzeichnis-der-regionalisierten-kleinstrukturanteile/>' .

4) NG337: Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Chlortoluron nur einmal pro Jahr auf derselben Fläche.

NG405: ganzjährig keine Anwendung auf drainierten Flächen.

NG410: keine Anwendung auf Böden mit einem mittleren Tongehalt von 30 %.

NG411: keine Anwendung auf den Bodenarten reiner Sand, schwach schluffiger Sand und schwach toniger Sand mit einem Corg-Anteil kleiner als 1%.

NG414: Keine Anwendung auf den Bodenarten reiner Sand, schwach schluffiger Sand und schwach toniger Sand mit einem organischen Kohlenstoffgehalt (Corg.) kleiner als 1,5 %.

NT145: Ausbringung mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha und 90 % Abdriftminderung.

NT146: Ausbringung mit höchstens 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit.

NT170: Ausbringung bei Windgeschwindigkeit von höchstens 3 m/s.

NW800: Keine Anwendung auf gedrahten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.

*Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt,  
für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.  
Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!*



Bayerische Landesanstalt  
für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

Herbologie / © K. Gehring, S. Thyssen  
Stand: Juli 2020