Herbizidempfehlung zur Herbstbehandlung in Wintergerste

Windhalm-Standorte

Im frühen Nachauflauf (Mittel; l,kg/ha)

- Flufenacet-haltiges Breitbandmittel[1)]
- Boxer[2)] + Alliance 3,0 + 0,06
- Boxer[2)] + Beflex 2,5 + 0,3
- Carmina 640 + Alliance 1,5 + 0,06
- Carmina 640 + Beflex 1,5 + 0,3
- Jura Max, Boxer Evo 3,0
- Mateno Duo + Boxer[2)] 0,35 + 1,5
- Trinity 2,0

1) Flufenacet-haltige Mitteln dürfen im Herbst 2026 letztmalig eingesetzt werden, Aufbrauchfrist bis 10.12.2026!

2) Oder anderes Prosulfocarb-Mittel.

3) Bei Stomp Aqua mit neuer Zulassung muss die Menge auf 2,4 l/ha begrenzt werden!

Ackerfuchsschwanz -Standorte

Hoher Ackerfuchsschwanz-Besatz

Spritzfolge im Herbst (Mittel; l,kg/ha)

VA-NAK

- Flufenacet-Breitbandmittel[1)]
- Stomp Aqua + Boxer[2)] 2,0 + 2,0
- Stomp Aqua + Lentipur 2,0 + 2,0

NAH

- Axial 50 0,9

Im Nachauflauf (Mittel; l,kg/ha)

- Flufenacet-haltiges Breitbandmittel[1)] + Axial 50 0,5 + 0,9
- Boxer[2)] + Axial 50 2,5 + 0,9
- Lentipur + Axial 50 3,0+ 0,9
- Stomp Aqua[3)] + Axial 50 2,5 + 0,9

NAK

NAH



Entwicklungsstadien nach BBCH-Code