

Herbizidempfehlung zur Herbstbehandlung in Wintergerste

Windhalm-Standorte

Ackerfuchsschwanz - Standorte

Hoher Ackerfuchsschwanz-Besatz

Herbst-/Frühjahr-Spritzfolge

rierbst / i runjam spritzioige		
NAK	- Herold SC	0,6
	- Malibu	4,0
	- Quirinus Forte Set	0,5 + 0,5
	- Boxer + Battle Delta	3,0 + 0,4
NAF	- Axial 50	1,2

Im truhen Nachautlaut	(Mittel; l,kg/ha)
➤ Herold SC	0,3 - 0,4
Dattle Delta I Defley	02.02

▶ Battle Delta + Beflex 0,3 + 0,3
▶ Malibu 2,5 - 3,0

➤ Pontos 0,5

> Jura 3,5 − 4,0

➤ Boxer + Alliance 3,0 + 0,06

 \triangleright Boxer + Beflex 2,5 + 0,3

> Carmina 640 + Alliance 1,5 + 0,06

➤ Carmina 640 + Beflex 1,5 + 0,3


> Trinity 2,0

Im Nachauflauf (Mittel; I,kg/ha)

→ Herold SC + Axial 50
→ Malibu + Axial 50
0,5 + 0,9
2,5 + 0,9

➤ Stomp Aqua + Axial 50 2,5 + 0,9

NAH



NAK