



Herbizidempfehlung zur Herbstbehandlung in Weizen, Roggen und Triticale (kulturspezifische Aufwandmengen beachten)

Windhalm-Standorte

Im frühen Nachauflauf (Mittel; l,kg/ha)

➤ Herold SC	0,3 - 0,4
➤ Battle Delta + Beflex	0,3 + 0,3
➤ Malibu	2,5 - 3,0
➤ Jura	3,5 - 4,0
➤ Boxer + Alliance	3,0 + 0,06
➤ Boxer + Beflex	2,5 + 0,3
➤ Carmina 640 + Alliance	1,5 + 0,06
➤ Carmina 640 + Beflex	1,5 + 0,3
➤ Trinity	2,0

Ackerfuchsschwanz-Standorte

Im frühen Nachauflauf (Mittel; l,kg/ha)

➤ Herold SC	0,6
➤ Malibu	3,5 - 4,0
➤ Boxer + Herold SC	2,0 + 0,5
➤ Boxer + Battle Delta	3,0 + 0,4

Bei Bedarf Folgebehandlung im Frühjahr:

Atlantis Flex + FHS	0,2 + 0,6
---------------------	-----------

Im Nachauflauf

➤ Herold SC + Traxos	0,5 + 0,9
----------------------	-----------

NAK

NAH



0

09

10

12

13

21

25

29

30

Entwicklungsstadien nach BBCH-Code