Herbizidempfehlung zur Herbstbehandlung in Weizen, Roggen und Triticale (kulturspezifische Aufwandmengen beachten)

Windhalm-Standorte

Im frühen Nachauflauf (Mittel; l,kg/ha)

- Flufenacet-haltiges Breitbandmittel [1)]
- Jura Max, Boxer Evo 3,0
- Boxer[2)] + Alliance 3,0 + 0,06
- Boxer[2)] + Beflex 2,5 + 0,3
- Carmina 640 + Alliance 1,5 + 0,06
- Carmina 640 + Beflex 1,5 + 0,3
- Mateno Duo + Boxer[2)] 0,35 + 1,5
- Trinity 2,0

Ackerfuchsschwanz-Standorte

- Flufenacet-haltiges Breitbandmittel [1)]
- Stomp Aqua[3)] + Boxer[2)] 2,5 + 2,5-3,0
- Stomp Aqua[3)] + Lentipur 2,5 + 3,0
- Trinity + Boxer[2)] 2,0 + 2,5-3,0
- Jura Max + Beflex 3,0 + 0,5
- Mateno Duo + Boxer[2)] 0,35 + 3,0

1) Flufenacet-haltige Mittel dürfen im Herbst 2026 letztmalig eingesetzt werden, Aufbrauchfrist bis 10.12.2026!

2) Oder anderes Prosulfocarb-Mittel.

3) Bei Stomp Aqua mit neuer Zulassung muss die Menge auf 2,4 l/ha begrenzt werden!

Bei Bedarf Folgebehandlung im Frühjahr:
Atlantis Flex + FHS
0,2 - 0,33 + 0,6 - 1,0

NAK



Entwicklungsstadien nach BBCH-Code