

**Infos zu Kartoffeln**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Kraut- und Knollenfäule ( <i>Phytophthora infestans</i> )	<b>Kontaktmittel</b>					
	Grifon SC	09	NW -(-/-/20)m NW706 NT620-2	7	3,1 l max. 3x	Bei den Kupfer-Präparaten (Grifon SC, Coprantol Duo, Cuprozin progress, Funguran progress) ist die maximal zulässige Kupferaufwandmenge pro Jahr und im Fünfjahreszeitraum zu beachten! Amtlichen Warndienst beachten!  Um Resistenzbildungen vorzubeugen, spätestens nach zwei Anwendungen hintereinander einen Wechsel mit einem Mittel aus einer anderen Wirkstoffgruppe vornehmen.
	Coprantol Duo	07 09	NW -(-/-/20)m NW706 NT620-2	14	3 kg max. 3x	
	Cuprozin progress	05 07 09	NW 5(5/*/*)m NT620-1	14	2,0 l max. 6x	
	Funguran progress	07 09	NW 5(5/*/*)m NT620	14	2,0 kg max. 4x	
	Carneol	08 09	NW 10(5/5/*)m	7	0,4 l max. 8x	
	Gachinko/Leimay	07 08 09	NW 5(5/5/*)m	7	0,5 l max. 6x	
	Nando 500 SC	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT101	7	0,4 l max. 10x	
	Ranman Top	09	NW 5(*/*/*)m NW705	7	0,5 l max. 6x	
	Shirlan	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NW701	7	0,4 l max. 10x	
Terminus	07 08 09	NW 10(5/5/*)m	7	0,4 l max. 8x		

**Infos zu Kartoffeln**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Kraut- und Knollenfäule ( <i>Phytophthora infestans</i> )	<b><i>lokalsystemische Fungizide</i></b>					
	(Banjo forte)	08 09	NW 10(5/5/*)m	7	1,0 l max. 4x	Die Aufbrauchfrist von Banjo forte und Presidium endet am 20. Mai 2025.  Bei starkem Krautfäuledruck in Spritzfolge einbauen. Ab Gelbwerden der unteren Blätter nicht mehr einsetzen. Wegen Resistenzbildung gegenüber zahlreichen Fungiziden bei jeder Anwendung auf Wirkstoffwechsel achten!  Amtlichen Warndienst beachten!
	Carial Flex	07 08 09		7	0,6 kg max. 3x	
	Curzate 60WG	07 08 09		1	0,2 kg max. 6x	
	(Presidium)	07 09	NW 5(5/5/*)m	7	1,0 l max. 5x	
	Reboot	07 08 09	NW 5(5/5/*)m NW706	7	0,45 kg max. 3x	
	Revus	09		7	0,6 l max. 4x	
	Revus Top	08 09	NW 5(5/5/*)m	3	0,6 l max. 3x	
	Terminus Extra	07 08 09	NW 15(10/5/5)m	7	0,6 l max. 6x	
Voyager	07 08 09	NW 10(10/5/5)m NW701 VA275	7	1,0 l max. 3x		

**Infos zu Kartoffeln**
**Pilzkrankheiten**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Kraut- und Knollenfäule ( <i>Phytophthora infestans</i> )	<b>systemische Fungizide</b>					
	Infinito	05 07 08 09	NG324-2, NG325 NW 5(*/*/*)m	14	1,6 l max. 4x	Bei starkem Befallsdruck zu Beginn der Spritzfolge einsetzen. Warndienst beachten! Um Resistenzbildungen vorzubeugen, muss spätestens nach zwei Anwendungen hintereinander ein Wechsel mit einem Fungizid aus einer anderen Wirkstoffgruppe vorgenommen werden.
	Simpro	05 07 08 09	NG402	14	2,5 l max. 4x	
	Zorvec Entecta	08 09	NW 5(5/*/*)m	7	0,25 l max. 3x	
Dürrfleckenkrankheit ( <i>Alternaria solani</i> )	Belanty	07 09		3	1,25 l max. 3x	Bei anhaltender Alternaria-Gefahr Behandlung wiederholen. Gegen Ortiva und Signum besteht in den bayerischen Kartoffelanbaugebieten verbreitete Resistenz. Amtlichen Warndienst beachten!
	Narita XL	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT140	14	0,25 l max. 4x	
	Ortiva	07 09	NW 5(*/*/*)m	7	0,5 l max. 3x	
	Propulse	08 09	NW 5(*/*/*)m	21	0,5 l max. 3x	
	Revus Top	08 09	NW 5(5/5/*)m	3	0,6 l max. 3x	
	Signum	09	NW 5(*/*/*)m	3	0,25 kg max. 4x	

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!