

Infos zu Sonnenblumen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Sclerotinia</i> -Stängelfäule, <i>Diaporthe helianthi</i> , Braunfleckenkrankheit, Wurzelhals- und Stängelfäule	Cantus Ultra	07 09	NW -(-/20/10)m	F	0,8 l max. 1x	
<i>Sclerotinia</i> -Stängelfäule, <i>Diaporthe helianthi</i> , Braunfleckenkrankheit, Wurzelhals- und Stängelfäule, Rost, <i>Septoria</i> -Blattflecken, Standfestigkeit	Architect	07 09	NW -(-/-/10)m	F	1,2 l EC 31-39 2,0 l EC 51-59	Anwendung zusammen mit Turbo im Verhältnis 2:1.
Nacktschnecken	Sluxx HP		NT116 NT870	F	7 kg max. 4x	Kontrolle mittels Schneckenfolie oder nassem Jutesack. Bei mehr als 1-2 Schnecken im Durchschnitt der Kontrollstelle ist eine Behandlung erforderlich.
	Arinex 30	08	NT116 NT870	F	6 kg max. 2x	
Beißende und saugende Insekten	Karate Zeon	08 09	NB6623, NN410 NW -(-/10/5)m NT109	21	75 ml max. 2x	
Unkräuter	Boxer, ...u.a.	07 08 09	NT145,146,170	F	3,0 - 5,0 l	Im Voraufbau gegen Weißen Gänsefuß, Vogelmiere und Klettenlabkraut. Anwendung in Tankmischung sinnvoll. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

Infos zu Sonnenblumen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Jura Max	05 07 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103-1	F	3,2 l	Im Voraufschlag, BBCH 01-09, gegen Gänsefuß, Winden- und Ampferknöterich.
	Stomp Aqua	07 09	NW -(-/-/5)m NT112 NT145,146,170	F	2,6 l	Vor dem Auflaufen gegen Unkräuter, ausgenommen Klettenlabkraut und Kamille. Anwendung in Tankmischung sinnvoll. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
Unkräuter, ausgenommen Kletten-Labkraut und Ehrenpreis	Pointer SX		NT103	F	60 g oder 2x 30 g	Nach dem Auflaufen von BBCH 12-16 gegen Unkräuter ausgenommen Kletten-Labkraut und Ehrenpreis-Arten als Einmalbehandlung oder im Splitting im Abstand von 7-14 Tagen. Anwendung nur in Tribenuron-resistenten Sorten (ExpressSun) möglich!
Unkräuter und Hirse	Spectrum	07 09	NW 10(5/5/*)m NT101	F	0,8 l	Im Voraufschlag bei einer Mindestsaattiefe von 3-4 cm gegen Hühnerhirse, Hundspetersilie, Storchschnabel und Schwarzen Nachtschatten. Aufwandmenge je nach Bodenart. Anwendung in Tankmischung mit z.B. Stomp Aqua sinnvoll.
			NW 20(10/5/5)m NT101	F	1,2 l	
	Spectrum Plus	07 08 09	NW -(-/-/5)m NG405, NW706 NT112,145,146, 170	F	4,0 l	Im Voraufschlag gegen Unkräuter und Ungräser, einschließlich Schadhirsens. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
Unkräuter, Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Jährige Rispe	Bandur	08 09	NW -(15/10/5)m NT108 NW800,701	F	3,5 - 4,0 l	Vor dem Auflaufen. Auf leichten Böden 3,5 l ausreichend.

Infos zu Sonnenblumen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Einjährige Ungräser und Ausfallgetreide, ausgenommen Jährige Rispe	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT101	F	1,0 - 1,5 l + 1,0 l	Nach dem Auflaufen in BBCH 13-39 der Kultur. Optimal im 2-4-Blattstadium der Ungräser.
	Fusilade MAX	07 08 09	NT101	F	0,75 - 1,0 l	
	Agil-S	07 08 09		F	0,75 l	
Einjährige Ungräser und Ausfallgetreide, incl. Jährige Rispe	Brixton	07 08 09	NT103	F	0,7 l	Nach dem Auflaufen in BBCH 13-33 der Kultur. Optimal im 2-4-Blattstadium der Ungräser.
Ungräser	Brixton	07 08 09	NT108	F	1,0 l	
Quecke	Agil-S	07 08 09	NW 5(*/*/*)m	90	1,5 l	Nach dem Auflaufen von BBCH 12-39 gegen Quecke.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT102	F	2,5 + 1,0 l	Nach dem Auflaufen ab 15-20 cm Wuchshöhe der Quecke.

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!