

## Infos zu Kleinkulturen

## Grassamenbau

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Ariane C	07 08 09	NT103	F	1,5 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter und Acker-Kratzdistel.
	Duplosan DP	05 07	NW 5(*/*/*)m NW701,NT103	28	1,3 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Unkräuter.
	Fox	09	NW 5(5/*/*)m NT101,NW701	F	1,0 - 1,5 l	Nach dem Auflaufen im Herbst oder Frühjahr von BBCH 13-29 in Kulturgräsern gegen Taubnessel-Arten und Acker-Stiefmütterchen. Aufwandmenge bis 1,0 l/ha im Herbst und 1,5 l/ha im Frühjahr.
	Primus Perfect	09	NW 5(*/*/*)m NT103	F	0,2 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr in BBCH 13-37 gegen Unkräuter außer Ehrenpreis, Stiefmütterchen, Taubnessel, Gänsefuß.
	Saracen	09	NT109	F	0,075 - 0,1 l	Nach dem Auflaufen im Spätsommer bis Herbst mit 0,075 l/ha oder im Frühjahr mit 0,1 l/ha in BBCH 13-29 gegen Ausfallraps, Kamille, Klettenlabkraut und Klatsch-Mohn.
	Stomp Aqua	07 09	NW -(-/-/5)m NT112,VV207 NT145,146,170	F	2,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 12-21 der Kultur. Kombination mit Ergänzungspräparat empfehlenswert. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Oblix 500	09	NT101	F	1,2 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 13-29 in Gräsern zur Saatguterzeugung, ausgenommen Poa-Arten, gegen Klettenlabkraut, Vogelmiere und Gemeine Rispe. Frühe Anwendung in Kombination mit z.B. Stomp Aqua wird empfohlen. Keine Folgebehandlung mit Oblix im Frühjahr!

## Infos zu Kleinkulturen

## Grassamenbau

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Oblix	09	NW -(*/*/*)m NT102	F	2,0 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 12-29 in Kulturgräsern, ausgenommen Poa-Arten, gegen Ungräser und Unkräuter.
Windhalm und Unkräuter	Picon	09	NW -(-/-/5)m NT112, NT145,146,170	F	2,5 - 3,0 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 11-13 in Gräsern, ausgenommen Straussgras-Arten. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
Ungräser, Ausfallgetreide und Quecke, außer Jährige Risppe	Fusilade MAX	07 08 09	NT101, bzw. NT103 VV211	F	0,75 - 2,0 l	<b>Nur in Rot- und Schafschwingel</b> , als Untersaat nach dem Räumen der Deckfrucht. Aufwand je nach Art der Ungräser. NT-Auflage je nach Aufwandmenge. Kulturschäden bei ungünstigen Anwendungsbedingungen möglich!
Ungräser und Ausfallgetreide	Select 240 EC + Radiamix	07 08 09	NW 15(10/5/5)m NW706, NG405, NT102, VV207	F	0,5 + 1,0 l	<b>Nur in Rot- und Schafschwingel</b> im Nachauflauf ab BBCH 13 gegen Ungräser von BBCH 12-29. Kulturschäden bei ungünstigen Anwendungsbedingungen möglich!
Unkräuter und Ungräser	Roundup Powerflex #)	09	NG352	14	33 %ige Streichlösung	Anwendung als gezielte Einzelpflanzenbehandlung mit Dochtstreichgerät. Bereinigung von Fremdbesatz oder Problemunkräutern. Abtropfen der Streichlösung auf die Kulturpflanzen muss vermieden werden. Maximaler Mittelaufwand pro Jahr 3,75 l/ha. Anwendung auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Keine Behandlung von blühenden Trachtpflanzen für Honigbienen!

## Infos zu Kleinkulturen

## Grassamenbau

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmfestigung	Countdown NT	07	VV207	F	0,4 - 0,8 l max. 1x	In der Schossphase BBCH 31-37. Aufwandmenge je nach Grasart und standortspezifischen Bedarf. Anwendung in der frühen Schoßphase empfehlenswert.
	Medax Top	07		F	0,5 - 1,0 l max. 1x	
	Moddus	02 07 08		F	0,4 - 0,8 l max. 1x	
	Moxa	07 09		F	0,4 - 0,8 l max. 1x	
Pilzliche Blattfleckerreger und Rostpilze	Folicur	05 07 08 09	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,0 l	Ab dem Frühjahr gegen Rostpilze und pilzliche Blattfleckerreger bei Befallsbeginn bzw. nach Auftreten erster Krankheitssymptome bis spätestens zum Beginn der Blüte.
	Ortiva	09	NW 5(*/*/*)m, NW 701	F	1,0 l	
	Revytrex	05 07 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
Saugende und beißende Insekten, Fritfliege	Kaiso Sorbie, Hunter WG	07 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108, VV212	14	150 g max. 1x	Nach dem Auflaufen bis zum Ende der Blüte nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf. Einsatz möglichst erst in den Abendstunden nach dem Bienenflug. Erntegut nicht verfüttern.
	Karate Zeon	07 08 09	NB6623, NN410, NW -(10/5/5)m NT108, VV207	F	75 ml max. 2x	

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand beachten!

#) Generelle Anwendungsverbote auf Basis von privatrechtlichen Vereinbarungen (Pacht-, Lieferverträge) beachten.