

Infos zu Kleinkulturen

Lein

Schaderreger	Präparate	GS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Auflaufkrankheiten	TMTD 98% SATEC	Xn		F	2 g/kg	Saatgutbehandlung
Erdfloh	Chinook	Xn		F	3 ml/kg	Zur Saatgutbehandlung auf gefährdeten Standorten. Kombination mit TMTD 98% Satec zum Schutz vor Auflaufkrankheiten möglich.
Beißende und saugende Insekten	Karate Zeon	Xn	NW -(10/5/5)m NT108, NN410	35	75 ml max. 2x	Auch in Leindotter zugelassen. Wartezeit dort "F".
Samenunkräuter und -gräser	Ciral		NW 5(0/0/0)m NT103	F	25 g	Gegen Ungräser und Unkräuter im Nachauflauf von BBCH 12-29 bzw. von 2-10 cm Wuchshöhe.
Samenunkräuter und Hühnerhirse	Callisto	Xi	NW 5(0/0/0)m NT103	F	1,0 - 1,5 l	Voraufaufanwendung in Faserlein gegen Hühnerhirse, Fingerhirse und Unkräuter.
Ungräser	(Fusilade MAX)	Xn	NT101	90	1,0 l	Im Nachauflauf bei Faserlein bis zum Sichtbarwerden der Blütenanlagen; gegen Ungräser außer Jähriger Rispe bis 1 l/ha, gegen Quecke bis 2 l/ha.
Quecke	(Fusilade MAX)	Xn	NT102	90	2,0 l	
Unkräuter und Ungräser zur Sikkation	Barclay Gallup Biograde 360/450*		NT101	14	3,2 - 4,0 l	Spätbehandlung bei Vollreife (BBCH 89) bis 14 Tage vor der Ernte. Aufwandmenge je nach Wirkstoffkonzentration.
Ernteerleichterung	Reglone	T+	NW 20(10/5/5)m NT102	F	3,0 l	Mit Beginn der Vollreife als Spätbehandlung zur Abreifesteuerung.

*) bei alternativen Glyphosat-Präparaten sind ggf. veränderte Anwendungsbestimmungen zu beachten.