

**Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Centium 36 CS, ...u.a.	Ackerbohne, Futtererbse, Gelbe Lupine, Weiße Lupine	09	NT102,127,149	F	0,25 l	Gegen Unkräuter im Voraufbau, bis 5 Tage nach der Saat. Nicht in Beständen zur Saatguterzeugung. Einsatz in Gelber und Weißer Lupine nur zur Lebensmittelproduktion.
	Lentagran WP	Gelbe Lupine	07 08 09	NT103	F	2,0 kg	Nach dem Auflaufen gegen Unkräuter; optimal im 2- bis 4-Blattstadium der Unkräuter. Kultur sollte gute Wachsschicht ausgebildet haben.
	Stomp Aqua	Ackerbohne, Futtererbse	07 08 09	NW -(-/-10)m NT112,145,146,170	F	4,4 l	Im Voraufbau in Ackerbohnen und Erbsen gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut. In Erbsen auch mit 2,5-3,0 l/ha im Nachaufbau möglich. In Lupinen mit 2,6 l/ha im Voraufbau. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
		Ackerbohne, Futtererbse		NW -(-/-5)m NW705, NT112,145,146,170	F	3,5 l	
		Futtererbse		NW -(-/-5)m NT112,145,146,170	F	3,0 l	
	Lupine-Arten	NW -(-/-5)m NT112,145,146,170		F	2,6 l		
Bandur	Ackerbohnen, Futtererbsen	08 09	NW -(15/10/5)m NT108 NW 800 NW 701	F	3,5 - 4,0 l	Im Voraufbau in Ackerbohnen und Futtererbsen gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Auf leichten Böden 3,5 l ausreichend.	

**Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Boxer, ...u.a.	Ackerbohne, Futtererbse, Lupine	07 08 09	NT145,146,170	F	4,0 - 5,0 l	Im Vorauf bis 5 Tage nach der Saat gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Wirkungsverbreiterung durch Boxer 3,0 l/ha + Stomp Aqua 2,0 l/ha möglich. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Novitron DamTec	Ackerbohne, Futtererbse	07 08 09	NW -(20/15/5)m NW701, NT108, NT127, NT149	F	2,4 kg	Im Vorauf gegen Unkräuter und Jährige Rispe.
	Spectrum Plus	Ackerbohne, Futtererbse, Lupine	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW706, NT112,145,146,170, Nur im VA: NG405	F	4,0 l	In Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen im Vorauf, in Futtererbsen auch im frühen Nachauf bis zum 2. Laubblatt der Unkräuter, gegen Hirsen, Jährige Rispe und Unkräuter, außer Klettenlabkraut. Gute Bodenfeuchtigkeit notwendig. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

**Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Samenungräser	Agil-S	Ackerbohne, Futtererbse	07 08 09		F	0,75 l	Gegen Ungräser, ausgenommen Jährige Rispe, nach dem Auflaufen in BBCH 13-39 der Kultur. Optimal im 2-4-Blattstadium der Ungräser.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	Ackerbohne, Futtererbsen	05 07 08 09	NT101	56	1,0 - 1,5 l + 1,0 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-29 gegen Ungräser, ausgenommen Jährige Rispe.
	Fusilade MAX	Ackerbohne, Futtererbsen, Lupine	07 08 09	NT101	F	0,75 - 1,0 l	Gegen Ungräser. In Ackerbohnen und Futtererbsen ab dem 2-4-Blattstadium der Ungräser. Einsparung bei früher Anwendung und wüchsiger Witterung möglich. Ausfallgetreide wird mit erfasst.
	Select 240 EC + Radiamix	Futtererbse zur Saatgut- erzeugung, Lupine	07 08 09	NT108	F	0,5 l + 1,0 l	Im Nachauflauf gegen Ungräser ab dem 2-Blattstadium. Jährige Rispe wird mit erfasst.
	Targa Super	Ackerbohne, Futtererbse	05 07 08 09	NT101	49	0,75 - 1,5 l	Im Nachauflauf von BBCH 11-39 gegen Ungräser ab dem 2-Blattstadium ausgenommen Jähriger Rispe.

**Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen**
**Unkräuter und Ungräser**

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Quecke und Jährige Rispe	Select 240 EC + Radiamix	Ackerbohne zur Saatguterzeugung	07 08 09	NT109	F	1,0 + 1,0 l	Nach dem Auflaufen gegen Quecke und Jährige Rispe.
Quecke	Agil-S	Ackerbohne, Futtererbsen	07 08 09	NW -(-/-5)m		1,5 l	Im Nachauflauf von BBCH 13-39 gegen Quecke bei 15-20 cm Wuchshöhe.
	Fusilade MAX	Futtererbsen, Lupine	07 08 09	NT103	F	2,0 l	Gegen Quecke im Nachauflauf in Ackerbohnen und Futtererbsen bei 15-20 cm Wuchshöhe. Optimale Wachstumsbedingungen ermöglichen Mittelreduzierung.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	Ackerbohne, Futtererbsen	05 07 08 09	NT102	56	2,5 l + 1,0 l	Im Nachauflauf gegen Quecke bis 25 cm Wuchshöhe.
	Targa Super	Ackerbohne, Futtererbsen	05 07 08 09	NT102	49	2,0 - 2,5	Im Nachauflauf von BBCH 11-39 gegen Quecke bei 15-20 cm Wuchshöhe.

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!