

Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	(Basagran)	Ackerbohne	07	NG315,407,413,711	F	1,0 - 2,0 l	Nach dem Auflaufen bis 5 cm Wuchshöhe gegen Unkräuter. Bei hoher Sonneneinstrahlung und Netzmittelzusatz Aufwandmengenreduzierung möglich. Kein Einsatz auf flachgründigen Karst- und Kiesböden, auf grundwassernahen Böden sowie in Wasserschutz- und
		Futtererbse		NG315,402,407,711, NT101	40		
	Centium 36 CS	Ackerbohne, Futtererbse	09	NT102,127,149	F	0,25 l	Gegen Unkräuter im Voraufbau, bis 5 Tage nach der Saat. Nicht in Beständen zur Saatguterzeugung.
	Lentagran WP	Gelbe Lupine	07 09	NT103	F	2,0 kg	Nach dem Auflaufen gegen Unkräuter; optimal im 2- bis 4-Blattstadium der Unkräuter. Kultur sollte gute Wachsschicht ausgebildet haben.
	Stallion SyncTec	Ackerbohne, Futtererbse	09	NW -(-/-/5)m NT112,127,145,146,149,170	F	3,0 l/ha	Im Voraufbau in Ackerbohnen und Erbsen gegen Unkräuter. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Stomp Aqua	Ackerbohne, Futtererbse	09	NW -(-/-/10)m NT112,145,146,170	F	4,4 l	Im Voraufbau in Ackerbohnen und Erbsen gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut. In Erbsen auch mit 2,5-3,0 l/ha im Nachaufbau möglich. In Lupinen mit 2,6 l/ha im Voraufbau.
Ackerbohne, Futtererbse		NW -(-/-/5)m NW705, NT112,145,146,170		F	3,5 l		
Futtererbse		NW -(-/-/5)m NT112,145,146,170		42	3,0 l	Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.	
Lupine-Arten		NW -(-/-/5)m NT112,145,146,170		F	2,6 l		

Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter und Ungräser	Bandur	Ackerbohnen, Futtererbsen	08 09	NW -(15/10/5)m NT108 NW 800 NW 701	F	3,5 - 4,0 l	Im Voraufschlag in Ackerbohnen und Futtererbsen gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Auf leichten Böden 3,5 l ausreichend.
	Boxer	Ackerbohne, Futtererbse, Lupine	07 08 09	NW -(-/-/0)m NT145, 146, 170	F	4,0 - 5,0 l	Im Voraufschlag bis 5 Tage nach der Saat gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Wirkungsverbreiterung durch Boxer + Stomp Aqua 3,0 + 2,0 möglich. Abdrift und mögliche Beeinträchtigung benachbarter Kulturen sicher vermeiden!
	Gardo Gold	Lupine-Arten	07 08 09	NW 5(0/0/0)m NG402 NT102	F	3,0 - 4,0 l	Im Voraufschlag gegen Hirsen, Jährige Rispe und Unkräuter. Auf leichten bis mittleren Böden sind 3,0 l/ha ausreichend. Stark durchlässige, sorptionsschwache Böden sind von der Behandlung ausgenommen. Unter ungünstigen Witterungsbedingungen sind Schäden, auch an Folgekulturen, insbesondere Wintergetreide, möglich.
	Novitron	Ackerbohne, Futtererbse	08 09	NW -(20/15/5)m NW701, NT108, NT127, NT149	F	2,4 kg	Im Voraufschlag gegen Unkräuter und Jährige Rispe.

Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Samenungräser	Agil-S	Ackerbohne, Futtererbse	05 09		F	0,75 l	Gegen Ungräser, ausgenommen Jährige Rispe, nach dem Auflaufen in BBCH 13-39 der Kultur. Optimal im 2-4-Blattstadium der Ungräser.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	Ackerbohne, Futtererbsen	05 07 08 09	NT101	56	1,0 - 1,5 l + 1,0 - 1,5 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-29 gegen Ungräser, ausgenommen Jährige Rispe. Wartezeit bei Ackerbohnen unbd Futtererbsen 56 Tage, bei Erbsen 35 Tage.
	Fusilade MAX	Ackerbohne, Futtererbsen, Lupine	07 08 09	NT101	F	0,75-1,0 l	Gegen Ungräser. In Ackerbohnen und Futtererbsen ab dem 2-4-Blattstadium der Ungräser. Einsparung bei früher Anwendung und wüchsiger Witterung möglich. Ausfallgetreide wird mit erfasst.
	Gallant Super	Ackerbohne, Futtererbse	05 07 09	NG345	F	0,4 - 0,5 l	Gegen Ungräser im Nachauflauf. Optimal im 2-4-Blattstadium der Ungräser. Ausfallgetreide wird mit erfaßt.
	Select 240 EC + Radiamix	Futtererbse zur Saatgut- erzeugung, Lupine	07 08 09	NT108	F	0,5 l + 1,0 l	Im Nachauflauf gegen Ungräser ab dem 2-Blattstadium. Jährige Rispe wird mit erfaßt.
Quecke und Jährige Rispe	Select 240 EC + Radiamix	Ackerbohne	07 08 09	NT109	F	1,0 l	Nach dem Auflaufen gegen Quecke und Jährige Rispe.

Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Quecke	Fusilade MAX	Futtererbsen, Lupine	07 08 09	NT103	F	2,0 l	Gegen Quecke im Nachauflauf in Ackerbohnen und Futtererbsen bei 15-20 cm Wuchshöhe. Optimale Wachstumsbedingungen ermöglichen Mittelreduzierung.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	Ackerbohne, Futtererbsen	05 07 08 09	NT101	56	2,5 l + 2,5 l	Im Nachauflauf gegen Quecke bis 25 cm Wuchshöhe. Wartezeit bei Ackerbohnen und Futtererbsen 56 Tage, bei Erbsen 35 Tage.
Sikkation zur Herstellung der Erntefähigkeit	Reglone, Mission SL 200	Ackerbohne, Futtererbse, Futterlegu- minosen zur Saatgut- erzeugung	05 06 08 07	NW 20(10/5/5)m NT102, VV207	5	3,0 l	Spätbehandlung vor der Ernte in vollreifen Beständen. Einsatz nur bei starken Unkrautdurchwuchs und Zwiewuchs sinnvoll. Anwenderschutz beachten - Lebensgefahr bei Einatmen!
	Roundup PowerFlex	Ackerbohne, Futtererbse		NG351, NT102	7	3,0 l	Spätbehandlung ab 50 % der Hülsen abgereift gegen Unkräuter, Ungräser und zur Sikkation. Kein Einsatz bei Saatgutproduktion. Einsatz auf Fälle mit starken Unkrautdurchwuchs und Zwiewuchs begrenzen.

(...) Zulassung ausgelaufen - Aufbrauchfrist beachten!