

Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Centium 36 CS	Ackerbohne, Futtererbse	09	NT102,127,149	F	0,25 l	Gegen Unkräuter im Voraufbau, bis 5 Tage nach der Saat. Nicht in Beständen zur Saatguterzeugung.
	Lentagran WP	Gelbe Lupine	07 08 09	NT103	F	2,0 kg	Nach dem Auflaufen gegen Unkräuter; optimal im 2- bis 4-Blattstadium der Unkräuter. Kultur sollte gute Wachsschicht ausgebildet haben.
	Stomp Aqua	Ackerbohne, Futtererbse	09	NW -(-/-/10)m NT112,145,146,170	F	4,4 l	Im Voraufbau in Ackerbohnen und Erbsen gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut. In Erbsen auch mit 2,5-3,0 l/ha im Nachaufbau möglich. In Lupinen mit 2,6 l/ha im Voraufbau. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
				NW -(-/-/5)m NW705, NT112,145,146,170	F	3,5 l	
		Futtererbse	NW -(-/-/5)m NT112,145,146,170	F	3,0 l		
		Lupine-Arten	NW -(-/-/5)m NT112,145,146,170	F	2,6 l		
	Bandur	Ackerbohnen, Futtererbsen	08 09	NW -(15/10/5)m NT108 NW 800 NW 701	F	3,5 - 4,0 l	Im Voraufbau in Ackerbohnen und Futtererbsen gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Auf leichten Böden 3,5 l ausreichend.
Boxer	Ackerbohne, Futtererbse, Lupine	07 08 09	NW -(-/-/0)m NT145, 146, 170	F	4,0 - 5,0 l	Im Voraufbau bis 5 Tage nach der Saat gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Wirkungsverbreiterung durch Boxer + Stomp Aqua 3,0 + 2,0 möglich. Abdrift und mögliche Beeinträchtigung benachbarter Kulturen sicher vermeiden!	

Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Gardo Gold	Lupine-Arten	07 08 09	NW 5(0/0/0)m NG402 NT102	F	3,0 - 4,0 l	Im Voraufschlag gegen Hirsen, Jährige Rispel und Unkräuter. Auf leichten bis mittleren Böden sind 3,0 l/ha ausreichend. Stark durchlässige, sorptionsschwache Böden sind von der Behandlung ausgenommen. Unter ungünstigen Witterungsbedingungen sind Schäden, auch an Folgekulturen, insbesondere Wintergetreide, möglich.
	Novitron	Ackerbohne, Futtererbse	08 09	NW -(20/15/5)m NW701, NT108, NT127, NT149	F	2,4 kg	Im Voraufschlag gegen Unkräuter und Jährige Rispel.
	Spectrum Plus	Ackerbohne, Futtererbse, Lupine	07 08 09	NW -(-/-/5)m NG405, NW706 NT112,145,146,170	F	4,0 l	In Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen im Voraufschlag, in Futtererbsen auch im frühen Nachaufschlag bis zum 2. Laubblatt der Unkräuter, gegen Hirsen, Jährige Rispel und Unkräuter, außer Klettenlabkraut. Gute Bodenfeuchtigkeit notwendig. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Samenungräser	Agil-S	Ackerbohne, Futtererbse	05 07 09		F	0,75 l	Gegen Ungräser, ausgenommen Jährige Rispe, nach dem Auflaufen in BBCH 13-39 der Kultur. Optimal im 2-4-Blattstadium der Ungräser.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	Ackerbohne, Futtererbsen	05 07 08 09	NT101	56	1,0 - 1,5 l + 1,0 - 1,5 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-29 gegen Ungräser, ausgenommen Jährige Rispe. Wartezeit bei Ackerbohnen und Futtererbsen 56 Tage, bei Erbsen 35 Tage.
	Fusilade MAX	Ackerbohne, Futtererbsen, Lupine	07 08 09	NT101	F	0,75-1,0 l	Gegen Ungräser. In Ackerbohnen und Futtererbsen ab dem 2-4-Blattstadium der Ungräser. Einsparung bei früher Anwendung und wüchsiger Witterung möglich. Ausfallgetreide wird mit erfasst.
	Gallant Super	Ackerbohne, Futtererbse	07 09	NG345-3	F	0,4 - 0,5 l	Gegen Ungräser im Nachauflauf. Optimal im 2-4-Blattstadium der Ungräser. Ausfallgetreide wird mit erfasst.
	Select 240 EC + Radiamix	Futtererbse zur Saatgut- erzeugung, Lupine	07 08 09	NT108	F	0,5 l + 1,0 l	Im Nachauflauf gegen Ungräser ab dem 2-Blattstadium. Jährige Rispe wird mit erfasst.

Infos zu Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Quecke und Jährige Rispe	Select 240 EC + Radiamix	Ackerbohne zur Saatguterzeugung	07 08 09	NT109	F	1,0 + 1,0 l	Nach dem Auflaufen gegen Quecke und Jährige Rispe.
Quecke	Fusilade MAX	Futtererbsen, Lupine	07 08 09	NT103	F	2,0 l	Gegen Quecke im Nachauflauf in Ackerbohnen und Futtererbsen bei 15-20 cm Wuchshöhe. Optimale Wachstumsbedingungen ermöglichen Mittelreduzierung.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	Ackerbohne, Futtererbsen	05 07 08 09	NT101	56	2,5 l + 2,5 l	Im Nachauflauf gegen Quecke bis 25 cm Wuchshöhe. Wartezeit bei Ackerbohnen und Futtererbsen 56 Tage, bei Erbsen 35 Tage.
Sikkation zur Herstellung der Erntefähigkeit	Reglone, Mission SL 200	Ackerbohne, Futtererbse, Futterleguminosen zur Saatguterzeugung	05 06 08 07	NW 20(10/5/5)m NT102, VV207	5	3,0 l	Spätbehandlung vor der Ernte in vollreifen Beständen. Einsatz nur bei starken Unkrautdurchwuchs und Zwiewuchs sinnvoll. Anwenderschutz beachten - Lebensgefahr bei Einatmen!