

**Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen
ausgewählter Mais-Herbizid-Packs für die Frühjahrsbehandlung 2024**

Präparat	Hang- auflage ¹⁾	Gewässerabstand [m]				Nicht-Zielflächen-Abstand ²⁾ [m]								Sonstige Auflagen ³⁾
		Abdriftminderungsklasse je nach Düsenteknik				Abdriftminderungsklasse je nach Düsenteknik								
		0 %	50%	75%	90%	0%	50%	75%	90%	Anteil an Kleinstrukturen ausreichend ?				
	Pufferzone [m]	Abstand [m]				NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	
Callisto P Pack Callisto + Peak	10	5	*	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5 - 0 #	0	5 - 0 #	0	
(Callisto P Dual Pack) (Gardo Gold) + Callisto + Peak	10	5	*	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5 - 0 #	0	5 - 0 #	0	NG300, NG301-1
Laudis Plus Laudis + Delion	-	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
(Elumis Gold Pack) (Gardo Gold) + Elumis	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG300, NG301-1, NG326-1, NG327, NG362
Elumis P Pack Elumis + Peak	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327
(Elumis P Dual Pack) (Dual Gold) + Elumis + Peak	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG300, NG301-1, NG326-1, NG327
Elumis Triumph Pack Elumis + Successor T	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327, NG362
Laudis Aspect Pack Aspect + Laudis	10	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG362
MaisTer power Aspect Pack Aspect + MaisTer Power	20	10	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5 - 0 #	0	NG362
Principal S Pack Successor T + Principal	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327, NG362
Successor Flex Successor 600 + Haldis 100 SC	20	10	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	20	0	5 - 0 #	0	NG405
Successor Top 4.0 Successor T + Haldis 100 SC	20	10	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	20	0	5 - 0 #	0	NG362
Tanika Mais Combo = Tandus + Ikanos + Kideka	20	15	10	5	5	25-20 #	20	25-20 #	20	5 - 0 #	0	5 - 0 #	0	NG326-1, NG327
(Zintan Gold Pack) = (Gardo Gold) + Callisto	10	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG300, NG301-1, NG362

■ = keine Anwendung möglich.

*) landesspezifische Regelungen und Vorgaben der Pflanzenschutz-
anwendungsverordnung zum Gewässerabstand beachten!

*) verringert Abstand zu Hecken auf ehemals
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten
Flächen.

(...) = Zulassung abgelaufen, letzter Einsatz 2024!

1) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat.

2) Abstände sind nicht erforderlich:

- bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
- bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3 m breit sind, oder
- bei der Anwendungen mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten.
- in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulisse siehe 'www.julius-kuehn.de'.

3) NG300: Verbot der Anwendung in Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten und sonstigen Grundwasserschutzgebieten.

NG301-1: Keine Anwendung in vom BVL ausgewiesenen Wasserschutzgebieten und Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen.

NG326-1: es dürfen max. 45 g/ha Nicosulfuron auf derselben Fläche ausgebracht werden.

NG327: Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Nicosulfuron.

NG362: auf derselben Fläche darf innerhalb von drei Jahren nur eine Behandlung mit einem Terbutylazin-haltigen Mittel mit max. 850 g/ha Terbutylazin erfolgen.

NG405: Keine Anwendung auf drainierten Flächen.

NT145: Ausbringung mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha und 90 % Abdriftminderung.

NT146: Ausbringung mit höchstens 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit.

NT170: Ausbringung bei Windgeschwindigkeit von höchstens 3 m/s.



LfL

Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt, für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!

Herbologie / © K. Gehring, S. Thyssen
Stand: März 2024