

Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen ausgewählter Herbizide für den Einsatz in Sojabohnen für die Saison 2020

Präparat	Hang- auflage ¹⁾	Gewässerabstand [m]				Nicht-Zielflächen Abstand ³⁾ [m]								Sonstige Auflagen ⁴⁾	
		Abdrift ²⁾ variabel je nach Düsentchnik				Abdriftminderungsklasse je nach Düsentchnik									
		Standard 0%	50%	75%	90%	0%		50%		75%		90%			
Pufferzone [m]	Abstand [m]				NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	Anteil an Kleinstrukturen ausreichend ?		
Präparate gegen Unkräuter und Ungräser															
Harmony SX	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centium 36 CS	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	0	NT127, 149
Clearfield Clentiga	-	*	*	*	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	0	NG343, NG354
Sencor Liquid	10	5	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Artist	20	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	0	
Spectrum, bis 0,8 l/ha auf leichten Böden	10	5	5	5	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spectrum, bis 1,4 l/ha auf mittleren und schweren Böden	20	10	5	5	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quantum	20			5	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	NG405, VA269
Stomp Aqua	-				5								5-0 #	0	NT145, 146, 170
Spectrum Plus	20				5								5-0 #	0	NT145, 146, 170 NG405
Präparate ausschließlich gegen Ungräser															
Focus Ultra, bis 2,5 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Focus Ultra, bis 5,0 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	0	
Fusilade Max, bis 1,0 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fusilade Max, bis 2,0 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	0	

■ = keine Anwendung möglich.

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand beachten!

#) verringerter Abstand zu Hecken auf ehemals landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen.

(...) Zulassung ausgelaufen, Aufbrauchsfrist beachten.

1) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat.

2) Auflagen-Code siehe: 'www.lfl.bayern.de/ips/pflanzenschutzmittel'

3) Abstände sind nicht erforderlich:

- bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
- bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3 m breit sind, oder
- bei der Anwendungen mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten.
- in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulisse siehe 'www.julius-kuehn.de'.

4) NG343: max. Aufwandmenge von 250 g Quinmerac/ha und Jahr beachten.

NG354: max. Aufwandmenge von 12,5 g/ha Imazamox innerhalb von 3 Jahren.

NG405: Kein Einsatz auf drainierten Flächen.

NT127: bei Temperaturen > 20 °C Anwendung nur zwischen 18 h und 9 h, bei Temperaturen > 25 °C keine Anwendung.

NT145: Ausbringung mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha und 90 % Abdriftminderung.

NT146: Ausbringung mit höchstens 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit.

NT149: Innerhalb von vier Wochen nach der Anwendung Schadenskontrollen und Meldung erforderlich.

NT170: Ausbringung bei Windgeschwindigkeit von höchstens 3 m/s.

VA269: Ausbringung mit einem verlustmindernden Gerät mit mind. 75%

Abdriftminderung

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt,
für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.
Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!



Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft

Institut für
Pflanzenschutz

Herbologie / © K. Gehring, S. Thyssen
Stand: Februar 2020