

Zuckerrübe: Notfallzulassungen zur Bekämpfung der Schilf-Glasflügelzikade							
	Mospilan SG	Danjiri	Carnadine 200	Karate Zeon	Kaiso Sorbie	Decis forte	Sivanto prime
Zulassungszeitraum	31.03. - 28.07.25	01.04. - 29.07.25	31.03 - 28.07.25	01.04. - 29.07.25	01.04. - 29.07.25	01.04. - 29.07.25	15.04.-12.08.25
Anwendungszeitraum	EC 19-49	EC 19-49	EC12-39	ab EC 19	EC 31-49	EC 12-39	EC 12-19
Aufwandmenge	0,25 kg/ha	0,25 kg/ha	0,25 l/ha	75 ml/ha	150 g/ha	75 ml/ha	0,25 l/ha
max. zugel. Anwendungshäufigkeit zur Zikadenbekämpfung	1x	2x	1x	2x	1x	1x	1x
max. zugel. Anwendungshäufigkeit in Zuckerrüben	2x	2x	2x	2x	1x	2x	1x
zeitlicher Abstand zwischen zwei Behandlungen				14 Tage		14 Tage	
Wartezeit	28 Tage	35 Tage	28 Tage	28 Tage	28 Tage	90 Tage	F
keine Anwendung auf Flächen, auf denen in den vorausgegangenen zwei Kalenderjahren Acetamiprid eingesetzt wurde			x				
keine Anwendung auf drainierten Flächen			x		x	x	x
Abstand Gewässer	NW -(15/10/5)m	NW -(15/10/5)m	NW -(15/10/5)m	NW -(15/5)m	NW -(15/50) m	NW -(15/50)m	NW 20(10/5/5)m
Auflagen Hangneigung	NW706	NW706	NW706	NW uncodiert	NW uncodiert	NW uncodiert	NW uncodiert
Auflagen Saumstruktur	NT103-1	NT103-1	NT108-1	NT108-1	NT108-1	NT108-1	
keine Anwendung in Kombination mit Netzmitteln	x	x					
Einstufung Bienen bei Solobehandlung	B4	B4	B2	B4	B4	B2	B1
In Mischung mit Azol-haltigen Fungiziden	B1	B1	B1	B2	B2		
In Mischung mit zur Zikadenbekämpfung zugelassenen Pyrethroiden	B1	B1	B1				
In Mischung mit zur Zikadenbekämpfung zugelassenen Insektizide				B1	B1	B1	
NW uncodiert:							
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeäten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben							