



## **Informationen zur Schilf-Glasflügelzikade - Amtlicher Warndienstaufruf zur Bekämpfung der Schilf-Glasflügelzikade für den Landkreis Bad Kissingen**

Dieser amtliche Warndienstaufruf ist Voraussetzung, um Insektizide zur Zikadenbekämpfung in Zuckerrüben, Kartoffeln und einzelnen Sonderkulturen (Blumenkohl, Kopfkohl, Möhren und Rote Bete) einsetzen zu können. Genauere Informationen zur Strategie, den Auflagen und Anwendungsbestimmungen entnehmen Sie bitte den Faxen 11, 12 und 13.

In Übergangsregionen (AB und kreisfreie Stadt Aschaffenburg, KG, HAS, MSP, MIL) soll eine Bekämpfung der Schilf-Glasflügelzikade nach amtlichem Warndienstaufruf nur dann erfolgen, wenn für Sie eines der folgenden Kriterien zutrifft:

- Im letzten Jahr kam es bei Ihnen durch das Auftreten der Zikade zu Ertragseinbußen in Zuckerrüben oder Kartoffeln.
- Im letzten Jahr kam es bei Ihnen durch das Auftreten der Zikade zu verringerten Zuckergehalten im Rübenanbau.
- Im letzten Jahr kam es bei Ihnen durch das Auftreten der Zikade zum Symptom der Gummiknollen bzw. Gummirüben.
- Im letzten Jahr hatten Sie Flächen, auf denen viele Pflanzen (10 – 50 %) auffällige Symptome von SBR bzw. Stolbur zeigten.

Auch sollte auf der zu behandelnden Fläche Zikadenaktivität festgestellt werden bevor eine Maßnahme durchgeführt wird. Behandlungen bei sonnigen Bedingungen (aber keinesfalls bei Temperaturen über 25°C) lassen die höchsten Wirkungsgrade erwarten, da dann auch die Zikadenaktivität am höchsten ist. Behandeln Sie außerdem aufgrund der möglichen Abdrift nicht bei Wind oder starker Thermik.

**Spezielle Hinweise zum Bienenschutz:** Kontrollieren Sie vor einer Behandlung, ob der Bestand von Bienen befliegen wird, z.B. aufgrund von blühenden Beikräutern oder starker Honigtaubildung durch Blattläuse (v.a. in Kartoffeln relevant). Ist dies der Fall, ist der Wirkstoff Acetamiprid solo auszubringen. Beachten Sie, dass sich die Bienengefährlichkeits-Einstufung der Acetamiprid-haltigen Insektizide je nach Produkt unterscheidet: Während Mospilan SG und Danjiri B4 (= bienenungefährlich) ist, hat Carnadine 200 eine B2-Einstufung. B2 bedeutet bienengefährlich, ausgenommen bei Anwendung nach dem Ende des täglichen Bienenflugs bis 23.00 Uhr. B2 Mittel wie Carnadine 200 lassen sich daher auf Flächen, die von Bienen befliegen werden, nur nach dem Ende des Bienenfluges bis 23.00 Uhr einsetzen.